


RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS

RESUMO 2013



São José do Rio Preto | SP

REMUME– RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS –2013

I - MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE	6
ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS	6
ANTI-INFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA.....	6
ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES	6
ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES	6
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA	6
ANTIMICROBIANOS	6
PENICILINAS.....	6
CEFALOSPORINAS.....	6
GLICOPEPTÍDEOS	6
SULFONAMIDAS E ANTI-SÉPTICOS URINÁRIOS.....	6
MACROLÍDEOS.....	6
QUINOLONAS	6
LINCOSAMIDAS	7
TETRACICLINAS	7
ANTIFÚNGICOS SISTÊMICOS.....	7
ANTIFÚNGICOS TÓPICOS	7
OFTALMOLÓGICOS	7
ANTIVIRAIS.....	7
ANTIINFECTANTES TÓPICOS	7
ANTIPARASITÁRIOS.....	7
ESCABICIDA E PEDICULICIDA	7
ANTI-HELMÍNTICOS.....	7
ANTI-PROTOZOÁRIOS	7
ANTI-PROTOZOÁRIOS TÓPICOS.....	7
ANTIALÉRGICO	7
CORREÇÃO DE ELETRÓLITOS	7
SUPLEMENTOS MINERAIS	7
REIDRATAÇÃO ORAL	7
NUTRIÇÃO	8
VITAMINAS	8
FITOTERÁPICOS	8

ANSIOLÍTICO	8
MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA REPRODUTOR	9
HORMÔNIOS SEXUAIS	9
CONTRACEPTIVO DE BARREIRA.....	9
CONTRACEPTIVO DE USO TÓPICO	9
MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA DIGESTIVO.....	10
ANTIÁCIDOS	10
ANTISECRETORES	10
TRATAMENTO H. PYLORI.....	10
ANTIEMÉTICOS E AGENTES PRÓCINÉTICOS.....	10
ANTIESPASMÓDICO.....	10
MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA CARDIOVASCULAR	8
ANTI-HIPERTENSIVOS.....	8
MEDICAMENTOS ANTI-ARRÍTMICOS	8
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO/ PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE	9
MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA RESPIRATÓRIO	9
ANTIASMÁTICOS.....	9
EXPECTORANTE E BRONCODILATADOR.....	9
PREPARAÇÕES NASAIS	9
MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA ENDÓCRINO	9
HORMÔNIOS TIREOIDIANOS	9
MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA NERVOSO	10
ANTICONVULSIVANTE	10
ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZANTES DO HUMOR	10
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA.....	8
HIPOLIPEMIANTE	8
MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SANGUE.....	8
ANTIANÊMICOS	8
ANTITROMBÓTICOS	8
ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS	8
INSULINAS E HIPOGLICEMIANTE ORAIS	9
ANTIPSICÓTICOS E ADJUVANTES.....	10
ANSIOLÍTICOS E HIPOSEDATIVOS	10
MEDICAMENTOS TÓPICOS USADOS NA PELE, MUCOSA E FÂNEROS	11

DERMOPROTETOR	11
ANTINFECTANTES	11
DESINFETANTES PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	11
II - MEDICAMENTOS VINCULADOS AOS AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES.....	12
ANTIVIRAIS.....	12
ANTI-RETROVIRAIS	12
CEFALOSPORINA 3ª GERAÇÃO	12
ANTIDIARRÊICO SINTOMÁTICO.....	13
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA DOENÇA DE PARKINSON	13
ESTIMULANTE SISTEMA NERVOSO CENTRAL	13
ANTAGONISTA OPIÓIDE	13
TRATAMENTO	13
ANTIFLATULANTES.....	14
III – MEDICAMENTOS DE USO NAS UPAs E PAs	15
ANALGÉSICO E ANTIPIRÉTICO	15
ANALGÉSICO OPIÓIDE	15
NÃO-ESTERÓIDES.....	15
CORTICÓIDE DE USO SISTÊMICO	15
ANTI-HISTAMÍNICO SISTÊMICO	15
ANTIMICROBIANOS	15
PENICILINAS.....	15
CEFALOSPORINA 3ª GERAÇÃO	15
ANESTÉSICO LOCAL.....	15
RELAXANTE MUSCULAR	16
VITAMINAS	16
MEDICAMENTOS PARA INALAÇÃO	16
ANTIPSICÓTICO	16
ANSIOLÍTICO	16
ANTIEPILEPTICO.....	16
HIPNÓTICO	16
USADOS EM CHOQUE	16
DIURÉTICO	16
ANTI-ARRÍTIMICO.....	16
VASODILATADOR	16

VASODILATADOR – USO ORAL	16
GLICOSÍDEO CARDÍACO.....	16
ANESTÉSICO LOCAL	17
CICATRIZANTE	17
NÃO ESPECÍFICOS	17
ESPECÍFICOS	17
ANTIEMÉTICO	17
ANTISECRETORES	17
ANTIESPASMÓDICO	17
LAXATIVO	17
IV – MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO EXCLUSIVO NA SALA DE CURATIVO DAS UNIDADES DE SAÚDE E DAS UPAs	18
CICATRIZANTE	18
EMOLIENTE E PROTETOR.....	18
ENZIMAS	18
ANTIBIÓTICO USO TÓPICO	18
ANTISSÉPTICO/DESINFETANTES	18
ANESTÉSICO DE USO TÓPICO	18
V – MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE.....	18
ANESTÉSICO	18
ANTISSÉPTICO E ANTIMICROBIANO	18
MEDICAMENTOS EM ORDEM ALFABÉTICA.....	20
USO DE ANTIMICROBIANOS EM INFECÇÕES EM ADULTOS	39
TRATAMENTO DAS INFECÇÕES REPIRATÓRIAS ALTAS.....	39
TRATAMENTO DAS INFECÇÕES URINÁRIAS	40
TRATAMENTO DAS INFECÇÕES DE PELE	41
USO DE ANTIMICROBIANOS EM INFECÇÕES PEDIÁTRICAS.....	42
USO DE ANTIMICROBIANOS EM PARASITOSES INTESTINAIS	44
USO DE ANTIMICROBIANOS EM CORRIMENTOS VAGINAIS	46

REMUME – RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS –2013

I - MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE

ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS		
medicamento	apresentação	condição
dipirona	solução oral 500 mg/ml	
paracetamol	comprimido 500 mg solução oral 200 mg/ml	
ANTI-INFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA		
ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES		
diclofenaco	comprimido 50 mg	R ¹
ibuprofeno	solução oral 50 mg/ml gotas	
ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES		
dexametasona	creme 0,1%	
prednisolona	solução oral 3 mg/ml	
prednisona	comprimido 5 comprimido 20 mg	
acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona	suspensão injetável 3 mg + 3 mg/ml	R ²
R ¹ - Uso não recomendado para crianças menores 12 anos. R ² – Uso restrito para gestantes em situação de risco.		
medicamento	apresentação	condição
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA		
alopurinol	comprimido 100 comprimido 300 mg	
ANTIMICROBIANOS		
PENICILINAS		
amoxicilina	cápsula ou comprimido 500 mg suspensão oral 50 mg/ml	
amoxicilina + ácido clavulânico	comprimido 500 mg + 125 mg suspensão oral 50 mg + 12,5 mg/ml	R ³
benzilpenicilina benzatina	pó para suspensão injetável 600.000 UI pó para suspensão injetável 1.200.000 UI	
benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina benzatina	pó para suspensão injetável 300.000 UI + 100.000 UI	
CEFALOSPORINAS		
cefalexina	cápsula ou comprimido 500 mg suspensão oral 50 mg/ml	
R ³ - Dispensação mediante prescrição em formulário próprio (Portaria SMS 06/2010) + receita em duas vias. R ⁴ – Uso para continuação de tratamento de osteomielite. Dispensação mediante prescrição em formulário próprio + receita em duas vias.		
medicamento	apresentação	condição
GLICOPEPTÍDEOS		
vancomicina	pó para solução injetável 500 mg	R ⁴
SULFONAMIDAS E ANTI-SÉPTICOS URINÁRIOS		
sulfametoxazol + trimetoprima	comprimido 400 mg + 80 mg supensão oral 200 mg + 40 mg/5ml	
nitrofurantoína	comprimido 100 mg solução oral 5 mg/ml	
MACROLÍDEOS		
azitromicina	comprimido 500 mg	R ⁵ , R ⁶
eritromicina	suspensão oral 25 mg/ml	
QUINOLONAS		
ácido nalidíxico	suspensão oral 250 mg/5 ml	
ciprofloxacino	cápsula ou comprimido 500 mg	R ⁵ , R ⁷
levofloxacino	comprimido de 500 mg	R ⁶
norfloxacino	comprimido 400 mg	
R ⁵ – Uso em DST. Necessário notificação e prescrição em duas vias R ⁶ - Uso em pneumonia adquirida na comunidade dispensação mediante prescrição em formulário próprio + receita em duas vias. R ⁷ – Uso em pé diabético (Portaria SMS 07/2011). Dispensação mediante prescrição em formulário próprio + receita em duas vias.		

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUME

medicamento	apresentação	condição
LINCOSAMIDAS		
clindamicina	cápsula 300 mg	R ⁵ , R ⁷
TETRACICLINAS		
doxiciclina	comprimido 100 mg	
ANTIFÚNGICOS SISTÊMICOS		
itraconazol	comprimido 100 mg	
ANTIFÚNGICOS TÓPICOS		
nistatina	suspensão oral 100.000 UI/ml	
miconazol	creme dermatológico 20mg/g	R ⁸
miconazol	creme vaginal 2%	R ⁹
OFTALMOLÓGICOS		
gentamicina	colírio 5 mg/ml	
ANTIVIRAIS		
oseltamivir	comprimido 30 mg, comprimido 45 mg, comprimido 75 mg	
aciclovir	comprimido 200 mg	
ANTIINFECTANTES TÓPICOS		
neomicina + bacitracina	pomada 5 mg + 250 UI/g	
permanganato de potássio	comprimido 100 mg	
R ⁸ - Uso restrito para lactentes e crianças até 10 anos. R ⁹ - Uso restrito pela via de aplicação vaginal.		
ANTIPARASITÁRIOS		
medicamento	apresentação	condição
ESCABICIDA E PEDICULICIDA		
ivermectina	comprimido 6 mg	
permetrina	loção 1 % e 5 %	
ANTI-HELMÍNTICOS		
albendazol	comprimido mastigável 400 mg suspensão oral 40 mg/ml	
ivermectina	comprimido 6 mg	
ANTI-PROTOZOÁRIOS		
AMEBICIDA, GIARDICIDA E TRICOMONICIDA		
metronidazol	comprimido 250 mg suspensão oral 40 mg/ml	
tinidazol	comprimido 500 mg	
MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE E ADJUVANTES		
ácido fólico	comprimido 15 mg	
clindamicina	cápsula 300 mg	
pirimetamina	comprimido 25 mg	
sulfadiazina	comprimido 500 mg	
ANTI-PROTOZOÁRIOS TÓPICOS		
metronidazol	geléia vaginal 500 mg/5 g	R ⁸
ANTIALÉRGICO		
medicamento	apresentação	condição
loratadina	comprimido 10 mg solução oral 1 mg/ml	
ANTIVERTIGINOSO		
cinarizina	comprimido 75 mg	
CORREÇÃO DE ELETRÓLITOS		
cloreto de potássio	xarope 6%	
SUPLEMENTOS MINERAIS		
REIDRATAÇÃO ORAL		
sais para reidratação oral	pó para preparo de solução oral (composição por litro após preparo): - cloreto de sódio 2,6 g (75 mmol de sódio) - glicose anidra 13,5 g (75 mmol de glicose) - cloreto de potássio 1,5 g (20 mmol de potássio e 65 mmol de cloreto) - citrato de sódio diidratado 2,9 g (10 mmol de citrato)	

NUTRIÇÃO		
medicamento	apresentação	condição
VITAMINAS		
tiamina	comprimido 300 mg	R ¹⁰
polivitamínico	gotas orais, cada ml contém: -Acetato de retinol (Vitamina A) 6.250 UI -Colecalciferol (Vitamina D3) 1.000 UI -Cloridrato de tiamina (Vitamina B1) 5 mg -Riboflavina 5-fosfato sódica (Vitamina B2) 2 mg -Nicotinamida 15 mg -Ácido ascórbico (Vitamina C) 75 mg	R ¹¹
FITOTERÁPICOS		
EXPECTORANTE E BRONCODILATADOR		
<i>Mikania glomerata</i> (guaco)	xarope	
ANSIOLÍTICO		
<i>Valeriana officinalis</i>	comprimido 40 mg	
R ¹⁰ – Prevenção e tratamento de deficiência da tiamina. R ¹¹ – Uso restrito para lactentes e crianças até 10 anos. Os valores estão de acordo com as dosagens diárias recomendadas pela RDC/ANVISA nº. 269/05.		
MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA CARDIOVASCULAR		
medicamento	apresentação	condição
ANTI-HIPERTENSIVOS		
DIURÉTICOS		
furosemida	comprimido 40 mg	
hidroclorotiazida	comprimido 25 mg	
BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS		
atenolol	comprimido 25 mg comprimido 50 mg	
metildopa	comprimido 250 mg	
propranolol	comprimido 40 mg	
BLOQUEADOR DE CANAIS DE CÁLCIO		
anlodipino	comprimido 5 mg	
nifedipino	comprimido retard 20 mg	
ANTAGONISTAS DE RECEPTORES DE ANGIOTENSINA		
losartana potássica	comprimido 50 mg	
INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA		
captopril	comprimido 25 mg	
enalapril	comprimido 5 mg e 20mg	
VASODILATADOR		
hidralazina	comprimido 25 mg	
MEDICAMENTOS ANTI-ARRÍTIMICOS		
amiodarona	comprimido 200 mg	
R ¹² – Uso restrito em Insuficiência Cardíaca Congestiva. Receita em duas vias.		
medicamento	apresentação	condição
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA		
carvedilol	comprimido 3,125 mg comprimido 12,5 mg comprimido 25 mg	R ¹²
digoxina	comprimido 0,25 mg	
espironolactona	comprimido 25mg comprimido 100 mg	
HIPOLIPEMIANTES		
sinvastatina	comprimido 20 mg comprimido 40 mg	R ¹³
MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SANGUE		
ANTIANÊMICOS		
ácido fólico	comprimido 5 mg	
sulfato ferroso	comprimido 40 mg ferro elementar	
sulfato ferroso	gotas orais 25 mg ferro elementar	
ANTITROMBÓTICOS		
enoxaparina	20mg/0,2 ml – seringa preenchida subcutâneo	
varfarina sódica	comprimido 5 mg	
ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS		
ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg	
clopidogrel	comprimido 75 mg	R ¹⁴
R ¹³ – Dispensação mediante apresentação de formulário próprio (Portaria SMS/17/2010). R ¹⁴ – Dispensação mediante apresentação de formulário próprio e receita em duas vias (Portaria SMS 07/2012).		

MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA REPRODUTOR		
medicamento	apresentação	condição
HORMÔNIOS SEXUAIS		
REPOSIÇÃO HORMONAL		
estriol	creme vaginal 1mg/g	
estradiol	comprimido 1 mg	
medroxiprogesterona	comprimido 10 mg	R ¹⁵
noretisterona + estradiol	comprimido 0,5 mg + 1 mg	
INIBIDOR DA PROLACTINA		
cabergolina	comprimido 0,5 mg	R ¹⁶
CONTRACEPTIVOS HORMONAIS ORAIS		
etinilestradiol + gestodeno	comprimido 20 mcg + 75 mcg	
etinilestradiol + levonorgestrel	comprimido 30 mcg + 150 mcg	
levonorgestrel	ccomprimido 0,75 mg	R ¹⁷
noretisterona	comprimido 0,35 mg	
CONTRACEPTIVOS HORMONAIS INJETÁVEIS		
medroxiprogesterona	solução injetável 150 mg/ml	
noretisterona, enantato + estradiol, valerato	solução injetável 50 mg + 5 mg/ml	
CONTRACEPTIVO DE BARREIRA		
preservativo masculino	unidade 52 mm	
Diafragma de silicone + nonoxinol	unidade	
CONTRACEPTIVO DE USO TÓPICO		
DIU (dispositivo intra-uterino)	unidade	R ¹⁸
R ¹⁵ – Uso restrito para teste de dosagem de progesterona.		
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO/ PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE		
medicamento	apresentação	condição
alendronato de sódio	comprimido 70 mg	
carbonato de cálcio + Vitamina D	comprimido 500 mg cálcio elementar + 400 UI	
MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA RESPIRATÓRIO		
ANTIASMÁTICOS		
aminofilina	comprimido de 100 mg	
beclometasona, dipropionato	aerosol oral 50 e 250 mcg/dose	
salbutamol	aerosol 100 mcg/dose	
EXPECTORANTE E BRONCODILATADOR		
guaco (<i>Mikania glomerata</i>)	xarope	
PREPARAÇÕES NASAIS		
cloreto de sódio	solução nasal 0,9%	
MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA ENDÓCRINO		
HORMÔNIOS TIREOIDIANOS		
levotiroxina	comprimido 25 mcg, 50 mcg e 100 mcg	
R ¹⁶ - Uso restrito para lactantes HIV positivas e outros casos especiais. Receita em duas vias. Dispensação no SAE-DST/Aids.		
medicamento	apresentação	condição
INSULINAS E HIPOGLICEMIANTE ORAIS		
glibenclamida	comprimido 5 mg	
gliclazida	comprimido ação prolongada 30 mg	
insulina humana NPH	suspensão injetável 100 UI/ml	
insulina humana regular	solução injetável 100 UI/ml	
metformina	comprimido 500 mg e 850 mg	
OUTROS PRODUTOS AUXILIARES NÃO TERAPÊUTICOS		
INSUMOS PARA AUTOMONITORAMENTO DE GLICEMIA		
tiras para determinação de glicose	unidade	R ¹⁹
lancetas + lancetador	unidade	R ¹⁹
seringa	para insulina	R ¹⁹
glicosímetro	unidade	R ¹⁹
INSUMOS PARA OXIGENOTERAPIA		
água para injeção	frasco 500 ml	R ²⁰
R ¹⁷ - Uso restrito para contracepção de emergência. R ¹⁸ – Procedimento realizado em Unidade de Saúde. R ¹⁹ – Uso restrito aos pacientes que utilizam insulina, cadastrados no programa “Doce é a Vida”. Dispensação mediante assinatura do contrato de fornecimento dos insumos. R ²⁰ – Uso restrito em máscaras de oxigênio.		

MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA DIGESTIVO			MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA NERVOSO			medicamento		
medicamento	apresentação	condição	medicamento	apresentação	condição	apresentação	condição	
ANTIÁCIDOS			ANTICONSULSIVANTE			ANTIPICÓTICOS E ADJUVANTES		
hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio	suspensão oral 60 + 40 mg/ml		ácido valproico ou valproato de sódio	cápsula ou comprimido 288 mg (equivalente a 250 mg ácido valproico) solução oral ou xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg ácido valproico/mL)	R ²²	biperideno	comprimido 2 mg	R ²²
ANTISECRETÓRIOS			carbamazepina	comprimido 200 mg suspensão oral 100 mg/5 ml	R ²²	clorpromazina	comprimido 25 e 100 mg	R ²²
omeprazol	comprimido ou cápsula 20 mg		fenitoína	comprimido 100 mg	R ²²	haloperidol, decanoato	solução injetável 50 mg/ml	R ²²
TRATAMENTO H. PYLORI			fenobarbital	comprimido 100 mg gotas orais 40 mg/ml	R ²²	haloperidol	comprimido 5 mg solução oral 2 mg/ml	R ²²
amoxicilina + claritromicina + omeprazol	comprimido ou cápsula 500 mg	R ²¹	ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZANTES DO HUMOR			levomepromazina	gotas orais 40 mg/ml	R ²²
	comprimido ou cápsula 500 mg	R ²¹	ácido valproico ou valproato de sódio	cápsula ou comprimido 288 mg (equivalente a 250 mg ácido valproico) solução oral ou xarope 57,624 mg/ml (equivalente a 50 mg ácido valproico/mL)	R ²²	ANSIOLÍTICOS E HIPOSEDATIVOS		
	comprimido 20 mg	R ²¹	amitriptilina	comprimido 25 mg	R ²²	clonazepam	comprimido 2 mg	R ²³
ANTIEMÉTICOS E AGENTES PRÓCINÉTICOS			carbamazepina	comprimido 200 mg suspensão oral 100 mg/5 ml	R ²²	diazepam	comprimido 5 mg	R ²³
bromoprida	gotas orais 4 mg/ml					nitrazepam	comprimido 5 mg	R ²³
dimenidrinato + piridoxina	gotas orais 25 mg + 5 mg/ml					prometazina	comprimido 25 mg	
metoclopramida	comprimido 10 mg,					Valeriana officinalis	comprimido 40 mg	
ANTIESPASMÓDICO								
Escopolamina	comprimido 10 mg							
R ²¹ – Uso em pacientes com diagnóstico de H. Pylori.			R ²² - Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.			R ²³ - Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita		

MEDICAMENTOS TÓPICOS USADOS NA PELE, MUCOSA E FÂNEROS				
medicamento	apresentação	condição		
DERMOPROTETOR				
óxido de zinco + vitamina A + vitamina D	pomada 66 mg + 5.000 UI + 100 UI	R ⁹		
ANTINFECTANTES				
permanganato de potássio	comprimido 100 mg			
DESINFETANTES PARA TRATAMENTO DE ÁGUA				
hipoclorito de sódio	solução 2,5 %			
R ⁹ - Uso restrito para lactentes e crianças até 10 anos				

II - MEDICAMENTOS VINCULADOS AOS AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES

PROGRAMA DST/AIDS

ANTIVIRAIS

ANTIVIRAIS

medicamento	apresentação	condição
aciclovir	comprimido 200 mg	
ganciclovir sódico	pó para solução injetável 546 mg (equivalente a 500 mg ganciclovir)	R ²⁴

ANTI-RETROVIRAIS

INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA
ANÁLOGA DE NUCLEOSÍDEO

abacavir	comprimido 300 mg solução oral 20 mg/mL	R ²⁵
didanosina (DDI)	cápsula de liberação entérica 250 mg e 400 mg solução oral 10mg/ml	R ²⁵
estavudina	comprimido 30 mg, solução oral 1 mg/ml	R ²⁵
etravirina	comprimido 100 mg	R ²⁵
lamivudina	comprimido 150 mg, solução oral 10 mg/mL	R ²⁵

R⁵ – Uso em DST. Necessário notificação e prescrição em duas vias

R⁶ - Uso em pneumonia adquirida na comunidade dispensação mediante prescrição em formulário próprio + receita em duas vias.

R²⁴ - Uso restrito para tratamento de infecções causadas por citomegalovírus. Dispensação no SAE DST/Aids.

medicamento	apresentação	condição
zidovudina	cápsula 100 mg solução oral 10 mg/mL solução injetável 10 mg/mL	R ²⁶
zidovudina + lamivudina	comprimido 300 mg + 150 mg	R ²⁶

INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA
NÃO-ANÁLOGOS DE NUCLEOSÍDEO

efavirenz	comprimido 600 mg solução oral 30 mg/mL	R ²⁵
nevirapina	comprimido 200 mg suspensão oral 10 mg/ml	R ²⁵

INIBIDORES DE PROTEASE

atazanavir	cápsula 200 mg e 300 mg	R ²⁵
fosamprenavir	comprimido 700 mg	R ²⁵
indinavir	comprimido 400 mg	R ²⁵
lopinavir + ritonavir	comprimido 100 mg + 25 mg comprimido 200 mg + 50 mg solução oral 80 mg + 20 mg/ ml	R ²⁵
ritonavir	cápsula 100 mg	R ²⁵
saquinavir	cápsula 200 mg cápsula retard 200mg	R ²⁵

INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA
ANÁLOGA DE NUCLEOTÍDEO

tenofovir	comprimido 300 mg	R ²⁵
-----------	-------------------	-----------------

R²⁵ - Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.

medicamento	apresentação	condição
INIBIDORES DE INTEGRASE		
raltegravir	comprimido 400 mg	R ²⁵
INIBIDORES DE FUSÃO		
enfuvirtida	frasco-ampola 90 mg/mL	R ²⁵

CEFALOSPORINA 3ª GERAÇÃO

ceftriaxona	Pó para solução injetável IM 500 mg	R ⁵
-------------	--	----------------

ANTI-INFECCIOSO/ANTI-FÚNGICO E
ADJUVANTES

ácido folínico	comprimido 15 mg	
azitromicina	comprimido 500 mg	R ⁵ , R ⁶
ciprofloxacino	comprimido 500 mg	R ⁵
claritromicina	cápsula ou comprimido 500 mg	R ²¹ , R ²⁶
clindamicina	cápsula 300 mg	
fluconazol	comprimido 150 mg	
itraconazol	comprimido 100 mg	
pentamidina	pó para solução injetável 300 mg	
pirimetamina	comprimido 25 mg	
sulfadiazina	comprimido 500 mg	

R²¹ – Uso em pacientes com diagnóstico de H. Pylori.

R²⁶ – Uso restrito para tratamento de micobactérias atípicas.

MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA DIGESTIVO			PROGRAMA TUBERCULOSE			PROGRAMA HANSENÍASE		
medicamento	apresentação	condição	MEDICAMENTOS USADOS NA TUBERCULOSE			medicamento	apresentação	condição
ANTIDIARRÊICO SINTOMÁTICO			medicamento	apresentação	condição	TRATAMENTO		
loperamida	comprimido 2 mg		claritromicina	cápsula ou comprimido 500 mg	R ²⁶	dapsona	comprimido 100 mg	
NEUROLOGIA, GERIATRIA E PSIQUIATRIA			etambutol	comprimido 400 mg		ofloxacino	comprimido 400 mg	R ³⁰
MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL			estreptomicina	pó para injeção 1 g		talidomida	comprimido 100 mg	R ³¹
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA DOENÇA DE PARKINSON			etionamida	comprimido 250 mg		tratamento multibacilar – clofazimina + clofazimina + rifampicina + dapsona	comprimido 50 mg + 100 mg + 300 mg + 100 mg	
biperideno	comprimido 2 mg	R ²²	isoniazida	comprimido 100 mg		tratamento paucibacilar – dapsona + rifampicina	comprimido 100 mg + 300 mg	
levodopa + carbidopa	comprimido 250 mg + 25 mg	R ²⁷	isoniazida + rifampicina	comprimido 100 mg + 150 mg comprimido 200 mg + 300 mg		COADJUVANTES		
levodopa + benserazida	comprimido dispersível e comprimidos liberação prolongada 100 mg + 25 mg	R ²⁷	pirazinamida	comprimido 500 mg		hipromelose + dextrano	colírio 3 mg + 1 mg/ml	
ESTIMULANTE SISTEMA NERVOSO CENTRAL			rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol	comprimido 150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg		creme hidratante	uréia 100 mg/g – pote 60 g e 100 g	R ³²
metilfenidato	comprimido 10 mg	R ²⁸	rifampicina	comprimido 300 mg, solução oral 50 mg/ml		filtro protetor solar	creme ou loção - fator 45	R ³² , R ³³
ANTAGONISTA OPIÓIDE								
naltrexona	comprimido 50 mg	R ²⁹						
R²² - Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. R²⁶ – Uso restrito para tratamento de micobactérias atípicas.			R²⁷ – Dispensação mediante apresentação de formulário próprio (Portaria SMS 18/2010). R²⁸ - Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita A (amarela) + receita. R²⁹ – Uso restrito aos pacientes do CAPS –AD e Ambulatório de Saúde Mental.			R³⁰ - Uso restrito no tratamento da hanseníase. R³¹ - Medicamento sujeito a controle especial; Lista C3 (Portaria SVS 344/98). Dispensação na UBS Central. Notificação de receita de talidomida + receita em duas vias + termo consentimento. R³² - Uso restrito no tratamento da hanseníase. Dispensação em farmácia autorizada mediante receita em duas vias carimbada pelo ambulatório de hanseníase. R³³ - Uso restrito para tratamento de lúpus. Dispensação em farmácia autorizada mediante receita em duas vias prescrita por especialista do ambulatório de especialidades – ARE.		

GASTROPEDIATRIA E PNEUMOPEDIATRIA			MEDICAMENTOS DE USO EXCLUSIVO EM DIAGNÓSTICOS		
ranitidina	solução oral 150 mg/10ml	R ³⁴	medicamento	apresentação	condição
domperidona	suspensão oral 1mg/ml	R ³⁴	ANTIPLATULANTES		
UROLOGIA			dimeticona	gotas orais 75 mg/ml	R ³⁶
			bisacodil	comprimido 5 mg	R ³⁶
medicamento	apresentação	condição	solução fosfatada	enema	R ³⁶
doxazosina	comprimido 4 mg		manitol	solução 20%	R ³⁶
NEFROLOGIA			HOMEOPATIA		
VITAMINAS			medicamento	apresentação	condição
vitamina C (ácido ascórbico)	comprimido 500 mg	R ³⁵	medicamentos homeopáticos	glóbulos ou gotas até 2000 CH	R ³⁷
vitaminas do complexo B	cada drágea contém: - tiamina (B ¹) - riboflavina (B ²) - pantoteno (B ⁵) - piridoxina (B ⁶)	R ³⁵	R³⁴ – Uso pediátrico. Dispensação mediante prescrição por especialistas em gastro e pneumopediatria. Dispensação na UBS Central. R³⁵ – Uso por pacientes em hemodiálise. R³⁶ – Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador. R³⁷ – Dispensação nas farmácias contratadas pelo município mediante prescrição de médicos cadastrados na DAF.		

III – MEDICAMENTOS DE USO NAS UPAs E PAs

ANALGÉSICOS			ANTIMICROBIANOS			SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO		
medicamento	apresentação	condição	medicamento	apresentação	condição	medicamento	Apresentação	condição
ANALGÉSICO E ANTIPIRÉTICO			PENICILINAS			água para injeção	ampola 10 ml frasco 500 ml	
dipirona	solução injetável 500 mg/ml		benzilpenicilina procaína + potássica	pó para suspensão injetável 300.000 + 100.000 UI		bicarbonato de sódio	solução injetável 1 mEq/ml (8,4%)	
ANALGÉSICO OPIÓIDE			benzilpenicilina benzatina	pó para suspensão injetável 600.000 UI pó para suspensão injetável 1.200.000 UI		cloreto de potássio	solução injetável 19,1% (2,56 mEq/ml)	
codeína	comprimido 30 mg	R ²²	CEFALOSPORINA 3ª GERAÇÃO			cloreto de sódio	solução injetável 20 % (3,4 mEq/ml) solução injetável 0,9 % (0,154 mEq/ml)	
morfina	solução injetável 1 mg/ml e 10 mg/ml	R ²⁸	ceftriaxona	pó para solução injetável EV 1 g	R ³⁹	gliconato de cálcio	solução injetável 10 % (0,45 mEq/ml)	
fentanila	solução injetável 50 mcg/ml	R ²⁸ , R ³⁸	ANESTÉSICO			solução ringer + lactato	solução injetável – composição por litro: - cloreto 109 mEq - sódio 130 mEq - potássio 4 mEq - cálcio 2,7 mEq - lactato 27,7 mEq	
ANTIINFLAMATÓRIO			ANESTÉSICO LOCAL			sulfato de magnésio	solução injetável 10 %	R ⁴⁰
NÃO-ESTERÓIDES			lidocaína	gel 2% aerossol 10% solução injetável 2%		NUTRIÇÃO PARENTERAL		
CORTICÓIDE DE USO SISTÊMICO			lidocaína + epinefrina	solução injetável 20 mg + 0,005 mg/ml		glicose	solução injetável 50 mg/ml (5%) – solução injetável 250 mg/ml (25%) – solução injetável 500 mg/ml (50%)	
diclofenaco sódico	solução injetável 25 mg/ml		ANTI-HISTAMÍNICO SISTÊMICO					
dexametasona	solução injetável 2 mg/ml e 4 mg/ml		prometazina	solução injetável 25 mg/ml				
hidrocortisona	pó para solução injetável 100 mg e 500 mg							
ANTIALÉRGICO								

R²² - Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98).
R²⁸ - Uso restrito na UPA e SAMU.
R³⁸ - Uso em pneumonia na UPA e PA. Uso em Sepse na UPA.
R³⁹ - Também indicado para casos de pré-eclampsia e eclampsia.
R⁴⁰ - Também indicado para casos de pré-eclampsia e eclampsia.

<table> <tr> <th>medicamento</th><th>apresentação</th><th>condição</th></tr> <tr> <td>Glicofisiológico, soro (glicose + sódio)</td><td>solução injetável 5% + 0,9%</td><td></td></tr> </table>	medicamento	apresentação	condição	Glicofisiológico, soro (glicose + sódio)	solução injetável 5% + 0,9%		<table> <tr> <th colspan="3">MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA RESPIRATÓRIO</th></tr> <tr> <th>medicamento</th><th>apresentação</th><th>condição</th></tr> <tr> <td>aminofilina</td><td>solução injetável 24 mg/ml</td><td></td></tr> <tr> <td>terbutalino</td><td>solução injetável 0,5 mg/ml</td><td></td></tr> </table>	MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA RESPIRATÓRIO			medicamento	apresentação	condição	aminofilina	solução injetável 24 mg/ml		terbutalino	solução injetável 0,5 mg/ml		<table> <tr> <th colspan="3">MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA CARDIOVASCULAR</th></tr> <tr> <th>medicamento</th><th>apresentação</th><th>condição</th></tr> <tr> <td colspan="3">USADOS EM CHOQUE</td></tr> <tr> <td>adrenalina</td><td>solução injetável 1 mg/mL</td><td></td></tr> <tr> <td>dopamina</td><td>solução injetável 5 mg/ml</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">DIURÉTICO</td></tr> <tr> <td>furosemida</td><td>solução injetável 10 mg/ml</td><td></td></tr> <tr> <td>manitol</td><td>solução a 20%</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">ANTI-ARRÍTMICO</td></tr> <tr> <td>amiodarona</td><td>solução injetável 50 mg/ml</td><td></td></tr> <tr> <td>metoprolol</td><td>solução injetável seringa pré-carregada 5 mg</td><td></td></tr> <tr> <td>adenosina</td><td>solução injetável 3 mg/ml</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">VASODILATADOR</td></tr> <tr> <td>nitroprusseto de sódio</td><td>pó para solução injetável 50 mg</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">VASODILATADOR – USO ORAL</td></tr> <tr> <td>dinitrato de isossorbida</td><td>comprimido sublingual 5 mg</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">GLICOSÍDEO CARDÍACO</td></tr> <tr> <td>deslanosídeo</td><td>Solução injetável 0,2mg/ml</td><td></td></tr> </table>	MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA CARDIOVASCULAR			medicamento	apresentação	condição	USADOS EM CHOQUE			adrenalina	solução injetável 1 mg/mL		dopamina	solução injetável 5 mg/ml		DIURÉTICO			furosemida	solução injetável 10 mg/ml		manitol	solução a 20%		ANTI-ARRÍTMICO			amiodarona	solução injetável 50 mg/ml		metoprolol	solução injetável seringa pré-carregada 5 mg		adenosina	solução injetável 3 mg/ml		VASODILATADOR			nitroprusseto de sódio	pó para solução injetável 50 mg		VASODILATADOR – USO ORAL			dinitrato de isossorbida	comprimido sublingual 5 mg		GLICOSÍDEO CARDÍACO			deslanosídeo	Solução injetável 0,2mg/ml	
medicamento	apresentação	condição																																																																								
Glicofisiológico, soro (glicose + sódio)	solução injetável 5% + 0,9%																																																																									
MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA RESPIRATÓRIO																																																																										
medicamento	apresentação	condição																																																																								
aminofilina	solução injetável 24 mg/ml																																																																									
terbutalino	solução injetável 0,5 mg/ml																																																																									
MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA CARDIOVASCULAR																																																																										
medicamento	apresentação	condição																																																																								
USADOS EM CHOQUE																																																																										
adrenalina	solução injetável 1 mg/mL																																																																									
dopamina	solução injetável 5 mg/ml																																																																									
DIURÉTICO																																																																										
furosemida	solução injetável 10 mg/ml																																																																									
manitol	solução a 20%																																																																									
ANTI-ARRÍTMICO																																																																										
amiodarona	solução injetável 50 mg/ml																																																																									
metoprolol	solução injetável seringa pré-carregada 5 mg																																																																									
adenosina	solução injetável 3 mg/ml																																																																									
VASODILATADOR																																																																										
nitroprusseto de sódio	pó para solução injetável 50 mg																																																																									
VASODILATADOR – USO ORAL																																																																										
dinitrato de isossorbida	comprimido sublingual 5 mg																																																																									
GLICOSÍDEO CARDÍACO																																																																										
deslanosídeo	Solução injetável 0,2mg/ml																																																																									
<table> <tr> <th colspan="3">BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR</th></tr> <tr> <td colspan="3">RELAXANTE MUSCULAR</td></tr> <tr> <td>suxametônio</td><td>pó para solução injetável 500 mg</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="3">NUTRIÇÃO</th></tr> <tr> <td colspan="3">VITAMINAS</td></tr> <tr> <td>tiamina</td><td>solução injetável 100.000 UI/ml (100 mg/ml)</td><td>R¹⁰</td></tr> <tr> <th colspan="3">HEMOSTÁTICOS</th></tr> <tr> <td>fitomenadiona (vit. K1)</td><td>solução injetável 10 mg/ml – EV e IM</td><td></td></tr> <tr> <th colspan="3">MEDICAMENTOS PARA INALAÇÃO</th></tr> <tr> <td>fenoterol</td><td>gotas para inalação 5mg/ml</td><td></td></tr> <tr> <td>ipratrópio, brometo</td><td>gotas para inalação 0,25 mg/ml</td><td></td></tr> </table>	BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR			RELAXANTE MUSCULAR			suxametônio	pó para solução injetável 500 mg		NUTRIÇÃO			VITAMINAS			tiamina	solução injetável 100.000 UI/ml (100 mg/ml)	R ¹⁰	HEMOSTÁTICOS			fitomenadiona (vit. K1)	solução injetável 10 mg/ml – EV e IM		MEDICAMENTOS PARA INALAÇÃO			fenoterol	gotas para inalação 5mg/ml		ipratrópio, brometo	gotas para inalação 0,25 mg/ml		<table> <tr> <th colspan="3">PSICOTRÓPICOS</th></tr> <tr> <td colspan="3">ANTIPSICÓTICO</td></tr> <tr> <td>biperideno</td><td>solução injetável 5 mg/ml</td><td>R²²</td></tr> <tr> <td>clorpromazina</td><td>solução injetável 5 mg/ml</td><td>R²²</td></tr> <tr> <td>haloperidol</td><td>solução injetável 5 mg/ml</td><td>R²²</td></tr> <tr> <td colspan="3">ANSIOLÍTICO</td></tr> <tr> <td>diazepam</td><td>solução injetável 5 mg/ml</td><td>R²³</td></tr> <tr> <td colspan="3">ANTIEPILÉPTICO</td></tr> <tr> <td>fenitoína</td><td>solução injetável 50 mg/ml</td><td>R²²</td></tr> <tr> <td>fenobarbital</td><td>solução injetável 100 mg/ml</td><td>R²²</td></tr> <tr> <td colspan="3">HIPNÓTICO</td></tr> <tr> <td>etomidato</td><td>solução injetável 2 mg/ml</td><td>R²²</td></tr> </table>	PSICOTRÓPICOS			ANTIPSICÓTICO			biperideno	solução injetável 5 mg/ml	R ²²	clorpromazina	solução injetável 5 mg/ml	R ²²	haloperidol	solução injetável 5 mg/ml	R ²²	ANSIOLÍTICO			diazepam	solução injetável 5 mg/ml	R ²³	ANTIEPILÉPTICO			fenitoína	solução injetável 50 mg/ml	R ²²	fenobarbital	solução injetável 100 mg/ml	R ²²	HIPNÓTICO			etomidato	solução injetável 2 mg/ml	R ²²	R²² - Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. R²³ - Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.			
BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR																																																																										
RELAXANTE MUSCULAR																																																																										
suxametônio	pó para solução injetável 500 mg																																																																									
NUTRIÇÃO																																																																										
VITAMINAS																																																																										
tiamina	solução injetável 100.000 UI/ml (100 mg/ml)	R ¹⁰																																																																								
HEMOSTÁTICOS																																																																										
fitomenadiona (vit. K1)	solução injetável 10 mg/ml – EV e IM																																																																									
MEDICAMENTOS PARA INALAÇÃO																																																																										
fenoterol	gotas para inalação 5mg/ml																																																																									
ipratrópio, brometo	gotas para inalação 0,25 mg/ml																																																																									
PSICOTRÓPICOS																																																																										
ANTIPSICÓTICO																																																																										
biperideno	solução injetável 5 mg/ml	R ²²																																																																								
clorpromazina	solução injetável 5 mg/ml	R ²²																																																																								
haloperidol	solução injetável 5 mg/ml	R ²²																																																																								
ANSIOLÍTICO																																																																										
diazepam	solução injetável 5 mg/ml	R ²³																																																																								
ANTIEPILÉPTICO																																																																										
fenitoína	solução injetável 50 mg/ml	R ²²																																																																								
fenobarbital	solução injetável 100 mg/ml	R ²²																																																																								
HIPNÓTICO																																																																										
etomidato	solução injetável 2 mg/ml	R ²²																																																																								
R¹⁰ – Prevenção e tratamento de deficiência da tiamina.																																																																										

MEDICAMENTOS USADOS EM OFTALMOLOGIA	MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA DIGESTIVO																															
<table> <tr> <th>medicamento</th><th>apresentação</th><th>condição</th></tr> <tr> <td colspan="3">ANESTÉSICO LOCAL</td></tr> <tr> <td>tetracaína + fenilefrina</td><td>colírio 10 mg + 1 mg/ml</td><td>R¹⁹</td></tr> <tr> <td colspan="3">CICATRIZANTE</td></tr> <tr> <td>retinol, acetato + aminoácidos + metionina + cloranfenicol</td><td>pomada oftalmológica 10.000 UI + 25 mg + 5 mg + 5 Mg/g</td><td></td></tr> </table>	medicamento	apresentação	condição	ANESTÉSICO LOCAL			tetracaína + fenilefrina	colírio 10 mg + 1 mg/ml	R ¹⁹	CICATRIZANTE			retinol, acetato + aminoácidos + metionina + cloranfenicol	pomada oftalmológica 10.000 UI + 25 mg + 5 mg + 5 Mg/g		<table> <tr> <th>medicamento</th><th>apresentação</th><th>condição</th></tr> <tr> <td colspan="3">ANTIEMÉTICO</td></tr> <tr> <td>bromoprida</td><td>solução injetável 5 mg/ml</td><td></td></tr> <tr> <td>dimenidrinato + piridoxina</td><td>solução injetável 50 mg + 50 mg/ml</td><td></td></tr> <tr> <td>metoclopramida</td><td>solução injetável 5 mg/ml</td><td></td></tr> </table>	medicamento	apresentação	condição	ANTIEMÉTICO			bromoprida	solução injetável 5 mg/ml		dimenidrinato + piridoxina	solução injetável 50 mg + 50 mg/ml		metoclopramida	solução injetável 5 mg/ml		
medicamento	apresentação	condição																														
ANESTÉSICO LOCAL																																
tetracaína + fenilefrina	colírio 10 mg + 1 mg/ml	R ¹⁹																														
CICATRIZANTE																																
retinol, acetato + aminoácidos + metionina + cloranfenicol	pomada oftalmológica 10.000 UI + 25 mg + 5 mg + 5 Mg/g																															
medicamento	apresentação	condição																														
ANTIEMÉTICO																																
bromoprida	solução injetável 5 mg/ml																															
dimenidrinato + piridoxina	solução injetável 50 mg + 50 mg/ml																															
metoclopramida	solução injetável 5 mg/ml																															
MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS USADOS EM INTOXICAÇÕES EXÓGENAS	<table> <tr> <td colspan="3">ANTISECRETORES</td></tr> <tr> <td>ranitidina</td><td>solução injetável 25 mg/ml</td><td></td></tr> </table>	ANTISECRETORES			ranitidina	solução injetável 25 mg/ml																										
ANTISECRETORES																																
ranitidina	solução injetável 25 mg/ml																															
<table> <tr> <td colspan="3">NÃO ESPECÍFICOS</td></tr> <tr> <td>bicarbonato de sódio</td><td>solução injetável 1 mEq/mL (8,4%)</td><td></td></tr> <tr> <td>carvão vegetal ativado</td><td>pó para uso oral</td><td></td></tr> </table>	NÃO ESPECÍFICOS			bicarbonato de sódio	solução injetável 1 mEq/mL (8,4%)		carvão vegetal ativado	pó para uso oral		<table> <tr> <td colspan="3">ANTIESPASMÓDICO</td></tr> <tr> <td>escopolamina</td><td>solução injetável 20 mg/ml</td><td></td></tr> </table>	ANTIESPASMÓDICO			escopolamina	solução injetável 20 mg/ml																	
NÃO ESPECÍFICOS																																
bicarbonato de sódio	solução injetável 1 mEq/mL (8,4%)																															
carvão vegetal ativado	pó para uso oral																															
ANTIESPASMÓDICO																																
escopolamina	solução injetável 20 mg/ml																															
<table> <tr> <td colspan="3">ESPECÍFICOS</td></tr> <tr> <td>atropina</td><td>solução injetável 0,25 mg/ml</td><td></td></tr> <tr> <td>flumazenil</td><td>solução injetável 0,1 mg/ml</td><td>R²⁰</td></tr> <tr> <td>sulfato de sódio</td><td>envelope 20 mg</td><td></td></tr> </table>	ESPECÍFICOS			atropina	solução injetável 0,25 mg/ml		flumazenil	solução injetável 0,1 mg/ml	R ²⁰	sulfato de sódio	envelope 20 mg		<table> <tr> <td colspan="3">LAXATIVO</td></tr> <tr> <td>glicerina para clister</td><td>solução 12%</td><td></td></tr> <tr> <td>solução fosfatada</td><td>enema</td><td></td></tr> </table>	LAXATIVO			glicerina para clister	solução 12%		solução fosfatada	enema											
ESPECÍFICOS																																
atropina	solução injetável 0,25 mg/ml																															
flumazenil	solução injetável 0,1 mg/ml	R ²⁰																														
sulfato de sódio	envelope 20 mg																															
LAXATIVO																																
glicerina para clister	solução 12%																															
solução fosfatada	enema																															
R¹⁹- Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias. R²⁰ - Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita																																

IV – MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO EXCLUSIVO NA SALA DE CURATIVO DAS UNIDADES DE SAÚDE E DAS UPAs

USO EM CURATIVO

medicamento	apresentação	condição
CICATRIZANTE		
Óleo cicatrizante com ácidos graxos e vitaminas A e E	emulsão	
colagenase + cloranfenicol	pomada 0,6 UI + 0,01 g/g	

EMOLIENTE E PROTETOR

vaselina	sólida e líquida	
----------	------------------	--

ENZIMAS

papaína	gel 3% gel 10%	
---------	-------------------	--

ANTIBIÓTICO USO TÓPICO

sulfadiazina de prata	creme 1%	
-----------------------	----------	--

ANTISSÉPTICO/DESINFETANTES

Iodopovidona (PVPI)	solução alcoólica 10 % (1 % iodo ativo) solução aquosa 10 % (1 % iodo ativo) solução degermante 10% (1 % iodo ativo)	
Água oxigenada 10 volumes	solução tópica	

medicamento	apresentação	condição
ANESTÉSICO DE USO TÓPICO		
lidocaína	gel 2%	

V – MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE

ANTI-SÉPTICOS E DESINFECTANTES

ácido peracético	pH 3 a 5 solução e pH 5,5 a 8 pó para solução	
álcool etílico	solução 70% e gel 70%	

PROGRAMA SAÚDE DA MULHER – CONSULTÓRIO DE GINECOLOGIA

ácido acético	solução 2%	
ácido tricloroacético	solução 80%	
hidróxido de potássio Shiller	solução 10%	
	solução 2%	

PROGRAMA SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA

ANESTÉSICO		
prilocaína + felipressina	solução injetável 30 mg + 0,03 UI/ml	

ANTISSÉPTICO E ANTIMICROBIANO

medicamento	apresentação	condição
polimixina B + neomicina + hidrocortisona	solução otológica 10.000 UI + 5 mg + 10 mg/ml	

CONSULTÓRIO DE OFTALMOLOGIA

MEDICAMENTOS USADOS NO SISTEMA OCULAR

tetracaína + fenilefrina	colírio 10 mg + 1 mg/ml	R ²²
ciclopentolato	colírio 10 mg/ml	
fenilefrina	colírio 100 mg/ml	
tropicamida	colírio 1%	
fluoresceína	colírio 1%	

CENTRO CIRÚRGICO (PEQUENAS CIRURGIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS)

hidrato de cloral	solução oral	R ²²
midazolam	comprimido 7,5 mg solução injetável 5 mg/ml	R ²³
petidina	solução injetável 50 mg/ml	R ²²

R²² - Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.

R²³ - Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUME

medicamento	apresentação	condição
reagente para detecção de <i>Helicobacter pylori</i>	tubo teste	
lidocaína + prilocaína	gel 2,5% + 2,5%	

MEDICAMENTOS EM ORDEM ALFABÉTICA

Abreviaturas do uso: US – uso nas unidades de saúde; D – dispensação para os pacientes; AE – dispensação em Ambulatório Especializado.

Medicamento	Forma Farmacêutica	Uso	Restrição
Abacavir 300 mg	Comprimido	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Abacavir 20 mg/ml	Solução oral	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Aciclovir 200mg	Comprimido	D	Receita em duas vias.
Ácido acético 2%	Solução tópica	US	
Ácido acetilsalicílico 100 mg	Comprimido	D	
Ácido fólico 5 mg	Comprimido	D	
Ácido fólico 15 mg	Comprimido	D	
Ácido nalidíxico 250 mg/5 ml	Suspensão oral	D	Receita em duas vias.
Ácido peracético pH 3 a 5 (máscaras de inalação)	Solução	US	
Ácido peracético pH 5,5 a 8 (equipamentos corrosivos)	Pó para preparo de solução	US	
Ácido tricloroacético 80%	Solução tópica	US	
Ácido Valpróico ou Valproato de Sódio 288 mg (equivalente a 250 mg de ácido valpróico)	Cápsula ou comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Ácido Valpróico ou Valproato de Sódio 57,624 mg/ml (equivalente a 50 mg de ácido valpróico/ml)	Solução oral ou xarope	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Adenosina 3 mg/ml	Solução injetável	US	
Adrenalina 1 mg/ml	Solução injetável	US	
Água Oxigenada 10 volumes	Solução tópica	US	
Água para injeção	N.a. Ampola 10 ml	US	
Água para injeção	N.a. Frasco 500 ml	D	Uso restrito em máscaras de oxigênio.
Albendazol 400 mg,	Comprimido mastigável	D	

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUME

Medicamento	Forma Farmacêutica	Uso	Restrição
Albendazol 40 mg/ml	Suspensão oral	D	
Álcool etílico 70%	Solução	US	
Álcool etílico 70%	Gel	US	
Alendronato de sódio 70 mg	Comprimido	D	
Alopurinol 100 mg	Comprimido	D	
Alopurinol 300 mg	Comprimido	D	
Aminofilina 100 mg	Comprimido	D	
Aminofilina 24 mg/ml	Solução injetável	US	
Amiodarona 200 mg	Comprimido	D	
Amiodarona 50 mg/ml	Solução injetável	D	
Amitriptilina 25 mg	Comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Amoxicilina 500mg	Cápsula ou comprimido	D	Receita em duas vias.
Amoxicilina 50 mg/ml	Suspensão oral	D	Receita em duas vias.
Amoxicilina + ácido clavulânico 500 mg + 125 mg,	Comprimido	D	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio (Portaria SMS 06/2010) + receita em duas vias.
Amoxicilina + ácido clavulânico 50mg + 12,5 mg/ml	Suspensão oral	D	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio + receita em duas vias.
Anlodipino 5 mg	Comprimido	D	
Atazanavir 200 mg	Cápsula	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Atazanavir 300 mg	Cápsula	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Atenolol 25 mg	Comprimido	D	
Atenolol 50 mg	Comprimido	D	
Atropina 0,25 mg/ml	Solução injetável	US	

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF

Medicamento	Forma Farmacêutica	Uso	Restrição
Azitromicina 500 mg	Comprimido	D	Uso em pneumonia adquirida na comunidade dispensação mediante prescrição em formulário próprio + receita em duas vias. Uso em DST. Necessário notificação e prescrição em duas vias.
Beclometasona, dipropionato 50 mcg/dose	Aerosol oral	D	
Beclometasona, dipropionato 250 mcg/dose	Aerosol oral	D	
Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI	Pó para suspensão injetável	US	Receita em duas vias.
Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI	Pó para suspensão injetável	US	Receita em duas vias.
Benzilpenicilina procaína 300.000UI + potássica 100.000 UI	Pó para suspensão injetável	US	Receita em duas vias.
Bicarbonato de sódio 1 mEq/ml (8,4%)	Solução injetável	US	
Betametasona , acetato 3 mg + betametasona, fosfato dissódico 3mg/ml	Suspensão injetável	US	Uso restrito para gestantes em situação de risco.
Biperideno 2 mg	Comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Biperideno 5mg/ml	Solução injetável	US	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Bisacodil 5 mg	Comprimido	D	Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.
Bromoprida 4 mg/ml	Gotas orais	D	
Bromoprida 5 mg/ml	Solução injetável	US	
Cabergolina 0,5 mg	Comprimido	D	Uso restrito para lactantes HIV positivas e outros casos especiais. Receita em duas vias. Dispensação no SAE-DST/Aids.
Captopril 25 mg	Comprimido	D	
Carbamazepina 200 mg	Comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Carbamazepina 100 mg/5 ml	Suspensão oral	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUME

Medicamento	Forma Farmacêutica	Uso	Restrição
Carbonato de cálcio 500 mg de cálcio elementar + vitamina D 400 UI	Comprimido	D	
Carbonato de lítio 300 mg	Comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Carvão vegetal ativado	Pó para uso oral	US	
Carvedilol 3,125 mg	Comprimido	D	Uso restrito em Insuficiência Cardíaca Congestiva. Receita em duas vias.
Carvedilol 12,5 mg	Comprimido	D	Uso restrito em Insuficiência Cardíaca Congestiva. Receita em duas vias.
Carvedilol 25 mg	Comprimido	D	Uso restrito em Insuficiência Cardíaca Congestiva. Receita em duas vias.
Cefalexina 500 mg	Cápsula ou comprimido	D	Receita em duas vias.
Cefalexina 50 mg/ml	Suspensão oral	D	Receita em duas vias.
Ceftriaxona 500 mg	Pó para solução injetável IM	US	Uso em DST. Necessário notificação e prescrição em duas vias.
Ceftriaxona 1g	Pó para solução injetável EV	US	Uso em pneumonia na UPA e PA. Uso em Sepse na UPA.
Ciclopentolato 10 mg/ml	Colírio	US	
Cinarizina 75 mg	Comprimido	D	
Ciprofloxacino 500 mg	Cápsula ou comprimido	D	Uso em pé diabético (Portaria SMS 07/2011). Dispensação mediante prescrição em formulário próprio + receita em duas vias. Uso em DST – Necessário notificação e prescrição em duas vias.
Clarithromicina 500 mg	Cápsula ou comprimido	D	Uso restrito para tratamento de micobactérias atípicas. Uso no tratamento do <i>H. pilory</i> , receita em duas vias.
Clindamicina 300 mg	Cápsula	D	Uso em pé diabético (Portaria SMS 07/2011). Dispensação mediante prescrição em formulário próprio + receita em duas vias. Uso em DST. Necessário notificação e prescrição em duas vias.

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF

Medicamento	Forma Farmacêutica	Uso	Restrição
Clomipramina 25 mg	Comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Clonazepam 2 mg	Comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.
Clopidogrel 75 mg	Comprimido	D	Dispensação mediante apresentação de formulário próprio e receita em duas vias (Portaria SMS 07/2012).
Cloreto de potássio 6%	Xarope	D	
Cloreto de potássio 19,1% (2,56 mEq/ml)	Solução injetável	US	
Cloreto de sódio 0,9%	Solução nasal	D	
Cloreto de sódio 20 % (3,4 mEq/ml)	Solução injetável	US	
Cloreto de sódio 0,9 % (0,154 mEq/ml)	Solução injetável	US	
Clorpromazina 25	Comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Clorpromazina 100 mg	Comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Clorpromazina 5mg/ml	Solução injetável	US	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Codeína 30 mg	Comprimido	US	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Colagenase 0,6 UI + cloranfenicol 0,01g/g	Pomada	US	
Creme hidratante - Uréia 100 mg/g	Creme	D	Uso restrito no tratamento da hanseníase. Dispensação em farmácia autorizada mediante receita em duas vias carimbada pelo ambulatório de hanseníase.
Dapsona 100 mg	Comprimido	D	
Deslanosídeo 0,2mg/ml	Solução injetável	US	
Dexametasona 0,1%	Creme	D	
Dexametasona 2 mg/ml	Solução injetável	US	
Dexametasona 4 mg/ml	Solução injetável	US	

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUME

Medicamento	Forma Farmacêutica	Uso	Restrição
Diafragma de silicone + nonoxinol	Unidade	US	
Diazepam 5 mg	Comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.
Diazepam 5mg/ml	Solução injetável	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.
Diclofenaco 50 mg	Comprimido	D	Uso não recomendado para crianças menores 12 anos.
Diclofenaco sódico 25 mg/ml	Solução injetável	US	
Didanosina (DDI) 250 mg	Cápsula de liberação entérica	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Didanosina (DDI) 400 mg	Cápsula de liberação entérica	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Didanosina (DDI) 10 mg/ml	Solução oral	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Digoxina 0,25 mg	Comprimido	D	
Dimenidrinato 50 mg + piridoxina 50 mg/ml	Solução injetável	US	
Dimenidrinato 25mg + piridoxina 5mg/ml	Gotas orais	D	
Dimeticona 75 mg/ml	Gotas orais	D	Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.
Dinitrato de isossorbida 5 mg	Comprimido sublingual	US	
Dipirona 500 mg/ml	Solução oral	D	
Dipirona 500 mg/ml	Solução injetável	US	
DIU (dispositivo intra-uterino)	Unidade	US	Procedimento realizado em Unidade de Saúde.
Domperidona 1 mg/ml	Suspensão oral	D	Uso pediátrico. Dispensação mediante prescrição por especialistas em gastro e pneumopediatria. Dispensação na UBS Central.
Dopamina 5 mg/ml	Solução injetável	US	
Doxazosina 4 mg	Comprimido	D	

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF

Medicamento	Forma Farmacêutica	Uso	Restrição
Doxiciclina 100 mg	Comprimido	D	Receita em duas vias.
Efavirenz 600 mg	Comprimido	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Efavirenz 30 mg/ml	Solução oral	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Enalapril 5 mg	Comprimido	D	
Enalapril 20 mg	Comprimido	D	
Enfuvirtida 90 mg/ml	Frasco-ampola	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Eritromicina 25 mg/ml	Suspensão oral	D	
Enoxaparina 20mg/0,2ml seringa preenchida subcutânea	Solução injetável	D	
Escopolamina 10 mg	Comprimido	D	
Escopolamina 20 mg/ml	Solução injetável	US	
Espironolactona 25 mg	Comprimido	D	
Espironolactona 100 mg	Comprimido	D	
Estavudina 30 mg	Comprimido	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Estavudina 1 mg/ml	Solução oral	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Estradiol 1 mg	Comprimido	D	
Estreptomicina 1g	Pó para injeção	AE	
Estriol 1mg/g	Creme vaginal	D	
Etambutol 400 mg	Comprimido	D	
Etinilestradiol 20 mcg + gestodeno 75 mcg	Comprimido	D	
Etinilestradiol 30 mcg + levonorgestrel 150 mcg	Comprimido	D	
Etionamida 250 mg	Comprimido	D	

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUME

Medicamento	Forma Farmacêutica	Uso	Restrição
Etomidato 2 mg/ml	Solução injetável	US	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Etravirina 100 mg	Comprimido	D	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Fentanila 50mcg/ml	Solução injetável	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Uso restrito na UPA e SAMU.
Fenilefrina 100 mg/ml	Colírio	US	
Fenitoína 100 mg	Comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Fenitoína 50 mg/ml	Solução injetável	US	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Fenobarbital 100 mg	Comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Fenobarbital 40 mg/ml	Gotas orais	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Fenobarbital 100 mg/ml	Solução injetável	US	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Fenoterol 5 mg/ml	Gotas para inalação	US	
Filtro protetor solar Fator 45	Creme ou loção	D	Uso restrito no tratamento da hanseníase. Dispensação em farmácia autorizada mediante receita em duas vias carimbada pelo ambulatório de hanseníase. Uso restrito para tratamento de lúpus. Dispensação em farmácia autorizada mediante receita em duas vias prescrita por especialista do ambulatório de especialidades – ARE.
Fitomenadiona (vit. K1) 10 mg/ml	Solução injetável IM	US	
Fitomenadiona (vit. K1) 10 mg/ml	Solução injetável EV	US	
Fluconazol 150 mg	Comprimido	AE	
Flumazenil 0,1 mg/ml	Solução injetável	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF

Medicamento	Forma Farmacêutica	Uso	Restrição
Fluoresceína 1%	Colírio	US	
Fluoxetina 20 mg	Cápsula ou comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Fosamprenavir 700 mg	Comprimido	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Furosemida 40 mg	Comprimido	D	
Furosemida 10 mg/ml	Solução injetável	US	
Ganciclovir sódico 546 mg (equivalente a 500 mg ganciclovir)	Pó para solução injetável	AE	Uso restrito para tratamento de infecções causadas por citomegalovirus. Dispensação no SAE DST/Aids.
Gentamicina 5 mg/ml	Colírio	D	Receita em duas vias.
Glibenclamida 5 mg	Comprimido	D	
Glicerina para clister 12%	Solução	US	
Gliclazida 30 mg	Comprimido ação prolongada	D	
Glicofisiológico, soro (glicose 5% + sódio 0,9%)	Solução injetável 250mg e 500mg	US	
Gliconato de cálcio 10 % (0,45 mEq/ml)	Solução injetável	US	
Glicose 50 mg/ml (5%)	Solução injetável 250mg e 500mg	US	
Glicose 250 mg/ml (25%)	Solução injetável ampola	US	
Glicose 500 mg/ml (50%)	Solução injetável ampola	US	
Glicosímetro	Unidade	D	Uso restrito aos pacientes que utilizam insulina, cadastrados no programa “Doce é a Vida”. Dispensação mediante assinatura do contrato de fornecimento dos insumos.
Haloperidol 5 mg	Comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Haloperidol 2 mg/ml	Solução oral	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUME

Medicamento	Forma Farmacêutica	Uso	Restrição
Haloperidol 5mg/ml	Solução injetável	US	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Haloperidol, decanoato 50 mg/ml	Solução injetável	US	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Hidralazina 25 mg	Comprimido	D	
Hidrato de cloral	Solução oral	US	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Hidroclorotiazida 25 mg	Comprimido	D	
Hidrocortisona 100 mg	Pó para solução injetável	US	
Hidrocortisona 500 mg	Pó para solução injetável	US	
Hidróxido de alumínio 60 mg + hidróxido de magnésio 40 mg/ml	Suspensão oral	D	
Hidróxido de potássio 10%	Solução	US	
Hipoclorito de sódio 2,5%	Solução	D	
Hipromelose 3 mg + dextrano 1 mg/ml	Colírio	AE	
Ibuprofeno 50 mg/ml	Solução oral (gotas)	D	
Imipramina 25 mg	Comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Indinavir 400 mg	Comprimido	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Insulina humana NPH 100 UI/ml	Suspensão injetável	D	
Insulina humana regular 100 UI/ml	Solução injetável	D	
Iodopovidona - PVPI 10 % (1 % iodo ativo)	Solução alcoólica	US	
Iodopovidona - PVPI 10 % (1 % iodo ativo)	Solução aquosa	US	
Iodopovidona - PVPI 10 % (1 % iodo ativo)	Solução degermante	US	
Ipratrópio, brometo 0,25 mg/ml	Gotas para inalação	US	

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF

Medicamento	Forma Farmacêutica	Uso	Restrição
Isoniazida 100 mg	Comprimido	D	
Isoniazida 100 mg + rifampicina 150 mg	Comprimido	D	
Isoniazida 200 mg + rifampicina 300 mg	Comprimido	D	
Itraconazol 100 mg	Comprimido	D	Receita em duas vias.
Ivermectina 6mg	Comprimido	D	
Lamivudina 150 mg	Comprimido	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Lamivudina 10 mg/ml	Solução oral	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Lancetas + lancetador	Unidade	D	Uso restrito aos pacientes que utilizam insulina, cadastrados no programa “Doce é a Vida”. Dispensação mediante assinatura do contrato de fornecimento dos insumos.
Levodopa 100mg + benserazida 25 mg	Comprimido dispersível	D	Dispensação mediante prescrição por neurologista e psiquiatra (Portaria SMS 18/2010). Receita em duas vias.
Levodopa 100mg + benserazida 25 mg	Comprimido liberação lenta	D	Dispensação mediante prescrição por neurologista e psiquiatra (Portaria SMS 18/2010). Receita em duas vias.
Levodopa 250 mg + carbidopa 25 mg	Comprimido	D	Dispensação mediante prescrição por neurologista e psiquiatra (Portaria SMS 18/2010). Receita em duas vias.
Levofloxacino 500 mg	Comprimido	D	Uso em pneumonia adquirida na comunidade dispensação mediante prescrição em formulário próprio + receita em duas vias.
Levomepromazina 40mg/ml	Gotas orais	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Levonorgestrel 0,75	Comprimido	D	Uso restrito para contracepção de emergência.
Levotiroxina 25 mcg	Comprimido	D	
Levotiroxina 50 mcg	Comprimido	D	
Levotiroxina 100 mcg	Comprimido	D	
Lidocaína 2%	Gel	US	

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUME

Medicamento	Forma Farmacêutica	Uso	Restrição
Lidocaína 10%	Aerosol	US	
Lidocaína 2%	Solução injetável	US	
Lidocaína 20 mg + epinefrina 0,005 mg/ml	Solução injetável	US	
Lidocaína 2,5% + prilocaína 2,5%	Gel	US	
Loperamida 2 mg	Comprimido	AE	
Lopinavir 100 mg + ritonavir 25 mg	Comprimido	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Lopinavir 200 mg + ritonavir 50 mg	Comprimido	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Lopinavir 80 mg + ritonavir 20 mg/ml	Comprimido	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Loratadina 10 mg	Comprimido	D	
Loratadina 1 mg/ml	Solução oral	D	
Losartana potássica 50 mg	Comprimido	D	
Manitol 20%	Solução	US	
Manitol 20%	Solução	D	Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.
Medicamentos homeopáticos até 2000 CH	Glóbulos ou gotas	D	Dispensação nas farmácias contratadas pelo município mediante prescrição de médicos cadastrados na DAF.
Medroxiprogesterona 150 mg/ml	Solução injetável	D	
Medroxiprogesterona 10 mg	Comprimido	D	Uso restrito para teste de dosagem de progesterona.
Metformina 500 mg	Comprimido	D	
Metformina 850 mg	Comprimido	D	
Metildopa 250 mg	Comprimido	D	
Metilfenidato 10 mg	Comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita A (amarela) + receita.

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF

Medicamento	Forma Farmacêutica	Uso	Restrição
Metoclopramida 10 mg	Comprimido	D	
Metoclopramida 5 mg/ml	Solução injetável	D	
Metoprolol 5mg	Solução injetável seringa pré-carregada	US	
Metronidazol 250 mg	Comprimido	D	Receita em duas vias.
Metronidazol 500 mg/5 g	Geléia vaginal	D	Receita em duas vias.
Metronidazol 40 mg/ml	Suspensão oral	D	Receita em duas vias.
Miconazol 20 mg/g	Creme dermatológico	D	Uso restrito para lactentes e crianças até 10 anos.
Miconazol 2%	Creme vaginal	D	Uso restrito pela via de aplicação vaginal.
Midazolam 15mg	Comprimido	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.
Midazolam 5mg/ml	Solução injetável	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.
<i>Mikania glomerata</i> (Guaco)	Xarope	D	
Morfina 1 mg/ml	Solução injetável	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98).
Morfina 10 mg/ml	Solução injetável	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98).
Naltrexona 50 mg	Comprimido	D	Uso restrito aos pacientes do CAPS –AD e Ambulatório de Saúde Mental.
Neomicina 5mg + bacitracina 250 UI/g	Pomada	D	Receita em duas vias.
Nevirapina 200 mg	Comprimido	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Nevirapina 10 mg/ml	Suspensão oral	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Nifedipino 20 mg	Comprimido retard	D	
Nistatina 100.000 UI/ml	Suspensão oral	D	Receita em duas vias.

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUME

Medicamento	Forma Farmacêutica	Uso	Restrição
Nitrazepam 5 mg	Comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.
Nitrofurantoína 100 mg	Comprimido	D	Receita em duas vias.
Nitrofurantoína 5 mg/ml	Solução oral	D	Receita em duas vias.
Nitroprusseto de sódio 50 mg	Pó para solução injetável	US	
Noretisterona 0,35 mg	Comprimido	D	
Noretisterona 0,5mg + estradiol 1 mg	Comprimido	D	
Noretisterona, enantato 50mg + estradiol, valerato 5 mg/ml	Solução injetável	D	
Norfloxacino 400 mg	Comprimido	D	Receita em duas vias.
Nortriptilina 25 mg	Comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Ofloxacino 400 mg	Comprimido	AE	Receita em duas vias.
Óleo cicatrizante com ácidos graxos e vitaminas A e E	Emulsão	US	
Omeprazol 20 mg	Comprimido ou cápsula	D	
Oseltamivir 30 mg	Comprimido	D	Receita em duas vias.
Oseltamivir 45 mg	Comprimido	D	Receita em duas vias.
Oseltamivir 75 mg	Comprimido	D	Receita em duas vias.
Óxido de zinco 66 mg + Vitamina A 5000 UI + Vitamina D3 100 UI	Pomada	D	
Papaína 3%	Gel	US	
Papaína 10%	Gel	US	
Paracetamol 500 mg	Comprimido	D	
Paracetamol 200 mg/ml	Solução oral	D	
Pentamidina 300 mg	Pó para solução injetável	AE	

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF

Medicamento	Forma Farmacêutica	Uso	Restrição
Permanganato de potássio 100 mg	Comprimido	D	
Permetrina 1%	Loção	D	
Permetrina 5%	Loção	D	
Petidina 50 mg/ml	Solução injetável	US	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Pirazinamida 500 mg	Comprimido	D	
Pirimetamina 25 mg	Comprimido	AE	
Polimixina B 10.000 UI + neomicina 5 mg + hicrocortisona 10 mg/ml	Solução otológica (uso odontológico)	US	
Polivitamínico - Acetato de retinol (Vitamina A) 6.250 UI + Colecalciferol (Vitamina D3) 1.000 UI + Cloridrato de tiamina (Vitamina B1) 5 mg + Riboflavina 5-fosfato sódica (Vitamina B2) 2 mg + Nicotinamida 15 mg + Ácido ascórbico (Vitamina C) 75 mg	Gotas orais	D	Uso restrito para lactentes e crianças até 10 anos. Os valores estão de acordo com as dosagens diárias recomendadas pela RDC/ANVISA nº. 269/05.
Prednisolona 3 mg/ml	Solução oral	D	
Prednisona 5 mg	Comprimido	D	
Prednisona 20 mg	Comprimido	D	
Preservativo masculino 52 mm	Unidade	D	
Prilocaína 30 mg + felipressina 0,03 UI/ml	Solução injetável	US	
Prometazina 25 mg	Comprimido	D	
Prometazina 25 mg/ml	Solução injetável	US	
Propranolol 40 mg	Comprimido	D	
Raltegravir 400 mg	Comprimido	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUME

Medicamento	Forma Farmacêutica	Uso	Restrição
Ranitidina 150 mg/10 ml	Solução oral	D	Uso pediátrico. Dispensação mediante prescrição por especialistas em gastro e pneumopediatria. Dispensação na UBS Central.
Ranitidina 25 mg/ml	Solução injetável	US	
Reagente para detecção do <i>Helicobacter pylori</i>	Tubo teste	US	
Retinol, acetato 10.000 UI + aminoácidos 25 mg + metionina 5 mg + cloranfenicol 5mg/g	Pomada oftalmológica	US	
Rifampicina 300 mg	Comprimido	D	Receita em duas vias.
Rifampicina 50 mg/ml	Solução oral	D	Receita em duas vias.
Rifampicina 150 mg + isoniazida 75 mg + pirazinamida 400 mg + etambutol 275 mg	Comprimido	D	
Ritonavir 100 mg	Cápsula	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Sais para reidratação oral - Após preparo 1 litro: cloreto de sódio 2,6 g(75 mmol sódio), glicose anidra 13,5 g (75 mmol glicose), cloreto de potássio 1,5 g (20 mmol potássio e 65 mmol cloreto) e citrato de sódio diidratado 2,9 g (10 mmol de citrato)	Pó para preparo de solução oral	D	
Salbutamol 100 mcg/dose	Aerosol	D	
Saquinavir 200 mg	Cápsula	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Saquinavir 200 mg	Cápsula retard	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Seringa para insulina	Unidade	D	Uso restrito aos pacientes que utilizam insulina, cadastrados no programa “Doce é a Vida”. Dispensação mediante assinatura do contrato de fornecimento dos insumos.
Sertralina 50 mg	Cápsula ou comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Shiller a 2%	Solução	US	

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF

Medicamento	Forma Farmacêutica	Uso	Restrição
Sinvastatina 20 mg	Comprimido	D	Dispensação mediante apresentação de formulário próprio (Portaria SMS/17/2010).
Sinvastatina 40 mg	Comprimido	D	Dispensação mediante apresentação de formulário próprio (Portaria SMS/17/2010).
Solução fosfatada para enema	Frasco	D	Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.
Solução ringer + lactato - cloreto 109 mEq, sódio 130 mEq, potássio 4 mEq, cálcio 2,7 mEq, lactato 27,7 mEq/L	Solução injetável	US	
Sulfadiazina 500 mg	Comprimido	D	Receita em duas vias.
Sulfadiazina de prata 1%	Creme	US	
Sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg	Comprimido	D	Receita em duas vias.
Sulfametoxazol + trimetoprima 200 mg + 40 mg/5 ml	Suspensão oral	D	Receita em duas vias.
Sulfato de magnésio 10%	Solução injetável	US	Também indicado para casos de pré-eclampsia e eclampsia.
Sulfato de sódio	Pó	US	
Sulfato ferroso 25 mg ferro elementar	Gotas orais	D	
Sulfato ferroso 40 mg ferro elementar	Comprimido	D	
Suxametônio 500 mg	Pó para solução injetável	US	
Talidomida 100 mg	Comprimido	AE	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C3 (Portaria SVS 344/98). Dispensação na UBS Central. Notificação de receita de talidomida + receita em duas vias + termo consentimento.
Tenofovir 300 mg	Comprimido	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Terbutalino 0,5 mg/ml	Solução injetável	US	
Tetracaína 10mg + fenilefrina 1 mg/ml	Colírio	US	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita de controle especial em duas vias.
Tiamina 300 mg	Comprimido	D	Prevenção e tratamento de deficiência da tiamina.

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUME

Medicamento	Forma Farmacêutica	Uso	Restrição
Tiamina 100.000 UI/ml (100 mg/ml)	Solução injetável	US	Prevenção e tratamento de deficiência da tiamina.
Tinidazol 500 mg	Comprimido	D	
Tiras para determinação de glicose	Unidade	D	Uso restrito aos pacientes que utilizam insulina, cadastrados no programa “Doce é a Vida”. Dispensação mediante assinatura do contrato de fornecimento dos insumos.
Tratamento multibacilar – clofazimina 50 mg + clofazimina 100 mg + rifampicina 300 mg + dapsona 100 mg	Comprimido	AE	
Tratamento paucibacilar - dapsona 100 mg + rifampicina 300 mg	Comprimido	AE	
Tropicamida 1%	Colírio	US	
<i>Valeriana officinalis</i> 40 mg	Comprimido	D	
Vancomicina 500 mg	Pó para solução injetável	US	Uso para continuação de tratamento de osteomielite. Dispensação mediante prescrição em formulário próprio + receita em duas vias.
Varfarina sódica 5 mg	Comprimido	D	
Vaselina	Sólida	US	
Vaselina	Líquida	US	
Vitamina C (ácido ascórbico) 500 mg	Comprimido	AE	Uso por pacientes em hemodiálise.
Vitaminas do complexo B (tiamina (B1) + riboflavina (B2) + pantotenato (B5) + piridoxina (B6))	Drágeas	AE	Uso por pacientes em hemodiálise.
Zidovudina 100 mg	Cápsula	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Zidovudina 10 mg/ml	Solução oral	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.
Zidovudina 10 mg/ml	Solução injetável	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF

Medicamento	Forma Farmacêutica	Uso	Restrição
Zidovudina 300 mg + lamivudina 150 mg	Comprimido	AE	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no SAE DST/AIDS.

USO DE ANTIMICROBIANOS EM INFECÇÕES EM ADULTOS

TRATAMENTO DAS INFECÇÕES REPIRATÓRIAS ALTAS

SINUSITE^{1,2}

Uso de Antimicrobiano somente com persistência dos sintomas por mais de 7 dias; dor facial e secreção nasal purulenta

Antimicrobiano

1ª Escolha	Amoxicilina 500 mg de 8/8 horas por 10 dias
2ª Escolha	Amoxicilina + Ácido Clavulânico (500/125 mg) de 8/8 horas por 10 dias
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Doxiciclina 100 mg de 12/12 horas por 10 dias

FARINGITE E AMIGDALITE PURULENTAS^{1,2}

Antimicrobiano

1ª Escolha	Amoxicilina 500 mg de 8/8 horas por 10 dias OU Penicilina 1.200.000 IM em dose única
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Azitromicina 500 mg por 3 dias

RINITE

Não se recomenda o uso de Antimicrobiano sistêmico em adultos

OTITE MÉDIA AGUDA¹

Antimicrobiano

1ª Escolha	Amoxicilina 500 mg de 8/8 horas por 5 a 7 dias
2ª Escolha	Amoxicilina + Ácido Clavulânico (500/125 mg) de 8/8 horas, por 5 a 7 dias

BRONQUITE AGUDA²

Não se recomenda o uso de Antimicrobiano

COQUELUCHE^{1,3}

Antimicrobiano

Adulto	Azitromicina 500 mg 1 ao dia por 5 dias
Criança	Eritromicina 40 mg/kg/dia de 6/6 horas por 14 dias

PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE⁴**Antimicrobiano**

Pacientes previamente saudáveis, tratamento em domicílio

1ª Escolha

Amoxicilina 1g de 8/8 horas por 7 dias

2ª Escolha

Azitromicina 500 mg 1 ao dia por 7 dias
(prescrição em formulário próprio)Considerar associação com Oseltamivir 75 mg 12/12 horas por 5 dias durante
epidemia de influenza**Pacientes com doenças associadas (DM, ICC, neoplasia, hepatopatia, doenças
neurológicas, insuficiência renal crônica, DPOC, asma, alcoolismo, uso de drogas
ilícitas, obesidade ou desnutrição grave) ou uso de antibióticos nos últimos 3
meses:**

1ª Escolha

Amoxicilina + Ácido Clavulânico 500/125 mg 8/8 horas por 7
dias

2ª Escolha

Levofloxacino 500 mg, 1 ao dia por 7 dias
(prescrição em formulário próprio)**TRATAMENTO DAS INFECÇÕES URINÁRIAS****CISTITE AGUDA EM MULHERES GRÁVIDAS^{1,2,5}**

Solicitar Urocultura e iniciar tratamento empírico

Cefalexina 500 mg 6/6 horas ou de 8/8 horas por 3 dias

OU

Amoxicilina 500 mg de 8/8 horas por 3 dias

OU

Nitrofurantoína 100 mg 6/6 horas por 3 dias

**CISTITE AGUDA NÃO COMPLICADA EM
MULHERES^{1,2}**

Sulfametoxazol/Trimetoprim (400/80 mg) 2 cpr 12/12 horas por 3 dias

OU

Norfloxacina 400 mg 12/12 horas por 3 dias

OU

Nitrofurantoína 100 mg 6/6 horas por 3 a 7 dias

**INFECÇÕES DE TRATO URINÁRIO BAIXO EM
HOMENS^{1,5}**

Solicitar Urocultura e tratar de acordo com o antibiograma por 7 dias

Norfloxacino 400mg de 12/12 horas 7 a 10 dias

OU

Sulfametoxazol/Trimetoprim (400/80 mg) 2 cpr 12/12 horas por 7 a 10 dias

PIELONEFRITE AGUDA^{2,6}

Solicitar Urocultura e iniciar tratamento empírico

Sulfametoxazol/Trimetoprim (400/80 mg) 2 cpr 12/12 horas por 14 dias

OU

Ciprofloxacino 500mg 12/12 horas por 7 dias

TRATAMENTO DAS INFECÇÕES DE PELE									
<table> <tr> <th colspan="2">IMPETIGO^{1,7}</th></tr> <tr> <th colspan="2">Antimicrobiano</th></tr> <tr> <td>1ª Escolha</td><td>Cefalexina 1g VO 6/6 horas por 7 dias</td></tr> <tr> <td>Alérgicos a Beta-Lactâmicos</td><td>Clindamicina 150 a 450 mg VO 6/6 horas por 7 dias</td></tr> </table>		IMPETIGO ^{1,7}		Antimicrobiano		1ª Escolha	Cefalexina 1g VO 6/6 horas por 7 dias	Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Clindamicina 150 a 450 mg VO 6/6 horas por 7 dias
IMPETIGO ^{1,7}									
Antimicrobiano									
1ª Escolha	Cefalexina 1g VO 6/6 horas por 7 dias								
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Clindamicina 150 a 450 mg VO 6/6 horas por 7 dias								
<table> <tr> <th colspan="2">ERISPELA LEVE PRECOCE^{1,2}</th></tr> <tr> <th colspan="2">Antimicrobiano</th></tr> <tr> <td>1ª Escolha</td><td>Penicilina Procaína IM 12/12 horas por 10 dias OU Amoxicilina 50 a 100 mg/kg/dia 8/8 horas</td></tr> <tr> <td>Alérgicos a Beta-Lactâmicos</td><td>Clindamicina 300 a 450 mg VO 6/6 horas por 7 dias</td></tr> </table>		ERISPELA LEVE PRECOCE ^{1,2}		Antimicrobiano		1ª Escolha	Penicilina Procaína IM 12/12 horas por 10 dias OU Amoxicilina 50 a 100 mg/kg/dia 8/8 horas	Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Clindamicina 300 a 450 mg VO 6/6 horas por 7 dias
ERISPELA LEVE PRECOCE ^{1,2}									
Antimicrobiano									
1ª Escolha	Penicilina Procaína IM 12/12 horas por 10 dias OU Amoxicilina 50 a 100 mg/kg/dia 8/8 horas								
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Clindamicina 300 a 450 mg VO 6/6 horas por 7 dias								
<table> <tr> <th colspan="2">ERISPELA EXTENSA</th></tr> <tr> <td colspan="2">Hospitalizar</td></tr> </table>		ERISPELA EXTENSA		Hospitalizar					
ERISPELA EXTENSA									
Hospitalizar									
<table> <tr> <th colspan="2">CELULITE LEVE¹</th></tr> <tr> <th colspan="2">Antimicrobiano</th></tr> <tr> <td>1ª Escolha</td><td>Cefalexina 1g VO 6/6 horas por 7 dias</td></tr> <tr> <td>Alérgicos a Beta-Lactâmicos</td><td>Clindamicina 300 a 450 mg VO 6/6 horas por 7 dias</td></tr> </table>		CELULITE LEVE ¹		Antimicrobiano		1ª Escolha	Cefalexina 1g VO 6/6 horas por 7 dias	Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Clindamicina 300 a 450 mg VO 6/6 horas por 7 dias
CELULITE LEVE ¹									
Antimicrobiano									
1ª Escolha	Cefalexina 1g VO 6/6 horas por 7 dias								
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Clindamicina 300 a 450 mg VO 6/6 horas por 7 dias								
<table> <tr> <th colspan="2">CELULITE EXTENSA E GRAVE</th></tr> <tr> <td colspan="2">Hospitalizar</td></tr> </table>		CELULITE EXTENSA E GRAVE		Hospitalizar					
CELULITE EXTENSA E GRAVE									
Hospitalizar									

1. Levin, A.S.S. (org.). Guia de utilização de anti-infecciosos e recomendações para a prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. São Paulo: Hospital das Clínicas, 2011. 5ª edição. Disponível em: <http://www.hcnet.usp.br/adm/dc/gcih/manual_antiinfecciosos/manual_antiinfecciosos_2012_2014_2.pdf>

2. Gilbert, D.N ET AL.. (org.). Guia Sanford de terapêutica antimicrobiana, 41ª ed. São Paulo : Editorial Médica, 2011

3. Recommended Antimicrobial Agents for the Treatment and Postexposure Prophylaxis of Pertussis; CDC Guidelines MMWR 2005; 54(RR14): 1-16 disponível em <http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr5414.pdf>.

4. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Diretrizes Brasileiras para Pneumonia Adquirida na Comunidade em Adultos Imunocompetentes- 2009. J BrasPneumol. 2009; 35(6): 574-601

5. Sociedade Brasileira de Infectologia e Sociedade Brasileira de Urologia. Cistites em Situações Especiais: Tratamento. Projeto diretrizes, 2004. Disponível em: <http://www.projetodiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/033.pdf>

6. Gupta, Kalpana. International Clinical Practice Guidelines. Clinical Infectious Diseases, p. 103-120., 2011. Disponível em: <http://www.idsociety.org/uploadedFiles/IDSA/Guidelines-Patient_Care/PDF_Library/Uncomp%20UTI.pdf>. Acesso em: abr. 2013.

7. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al; Infectious Diseases Society of America. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections. Clin Infect Dis. 2005;41:1373-1406 . BMJ Publishing Group Limited 2011. Disponível em: <http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/476/treatment/details.html>. Acesso em: abr 2013

USO DE ANTIMICROBIANOS EM INFECÇÕES PEDIÁTRICAS

OTITE MEDIA AGUDA⁸

Antimicrobiano	
1ª Escolha	Amoxicilina 50 mg/kg/dia 8/8 horas ou 12/12 horas por 10 dias
2ª Escolha	Amoxicilina 90 mg/Kg/dia 8/8 horas ou 12/12 horas por 10 dias OU Amoxicilina + Ácido Clavulânico 50mg/ml, 50 mg/kg/dia 8/8 horas ou 12/12 horas por 10 dias (prescrição em formulário próprio).
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Eritromicina 50 mg/kg/dia 6/6 horas por 10 dias

PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE⁹

Antimicrobiano	
Pneumonia Afebril do Lactente (2 a 12 semanas de vida).	
Eritromicina 30 a 50 mg/kg/dia 6/6 horas por 14 dias (<i>Chlamydomphila trachomati</i>) OU Sulfametoxazol + Trimetoprim (200/40) 100 mg/kg/dia (sulfametoxazol) 12/12 horas por 21 dias (<i>Pneumocystis jiroveci</i>)	
Lactentes e Pré Escolares (≥ 2 meses e < 6 anos)	
1ª Escolha	Amoxicilina 50 mg/kg/dia 8/8 horas por 10 dias OU Penicilina procaína 50.000 UI I M de 24/24 horas por 7 dias OU Eritromicina 40 a 50 mg/kg/dia dividido em 4 doses de 6/6 horas em caso de alergia
Em caso de falência de tratamento	Amoxicilina + Ácido Clavulânico 50 a 90 mg/kg/dia 8/8 horas por 10 dias (prescrição em formulário próprio).
Escolares	
1ª Escolha	Amoxicilina - 50 mg/kg/dia 8/8 horas por 10 dias. OU Penicilina Procaina IM 50.000 UI/kg/dia por 7 dias
Em caso de falência de tratamento	Amoxicilina + Ácido Clavulânico 50mg/ml 50 a 90 mg/kg/dia 8/8 horas por 10 dias (prescrição em formulário próprio) OU Eritromicina – 50 mg/kg/dia 6/6 horas por 14 dias em caso de alergia

IMPETIGO BOLHOSO, CELULITE OU ERIPELA

Antimicrobiano	
1ª Escolha	Cefalexina 50 mg/kg/dia 6/6 horas por 10 dias.
	Em caso de impetigo: Penicilina benzatina 600 000 UI – Intramuscular – para pacientes menores de 25 kg e Penicilina benzatina 1 200 000 UI – Intramuscular - para pacientes maiores de 25 kg.
2ª Escolha	Amoxicilina +Ácido Clavulânico 50 mg/kg/dia 8/8 horas por 10 dias (prescrição em formulário próprio).
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Eritromicina 50 mg/kg/dia 6/6 horas por 10 dias.

INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO¹⁰

Antimicrobiano*
Sulfametoxazol + Trimetopim 40 mg/kg/dia 12/12 horas por 10 dias. OU
Cefalexina 50 a 100 mg/kg/dia 6/6 horas por 10 dias. OU
Ácido nalidíxico 30 a 50 mg/kg/dia 6/6horas por 10 dias. OU
Amoxicilina + Clavulanato 50 mg/kg/dia de 8/8 horas por 10 dias.
* Ideal basear-se no antibiograma

FARINGITE^{11,12}

Antimicrobiano	
1ª Escolha	Penicilina benzatina 600 000 UI – Intramuscular para pacientes menores de 25 kg e Penicilina benzatina 1 200 000 UI – Intramuscular para pacientes maiores de 25 kg.
2ª Escolha	Amoxicilina 50 mg/kg/dia 8/8 horas ou 12/12 horas por 10 dias OU Cefalexina 50 mg/kg/dia 6/6 horas por 10 dias OU Amoxicilina + Ácido Clavulânico 50 mg/ml 50 mg/kg/dia 8/8 horas por 10 dias (prescrição em formulário próprio)
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Eritromicina 50 mg/kg/dia 6/6 horas por 10 dias

8. American Academy of Pediatrics and American Academy of Family Physicians. Subcommittee on Management of Acute Otitis Media. Diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics 2004;113(5):1451-65

9. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Diretrizes Brasileiras para Pneumonia Adquirida na Comunidade em Adultos Imunocompetentes- 2009. J BrasPneumol. 2009; 35(6): 574-601

10.PMSP. Hospital Municipal Infantil Menino Jesus - Protocolo de Infecção Urinária

11.Approach to diagnosis of acute infectious pharyngitis in children and adolescent . Update.com January 2010

12.Bisno et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of group a streptococcal faringitidis. Clin Infect dis 2002;35:113-25

USO DE ANTIMICROBIANOS EM PARASITOSEs INTESITINAIS^{13,14}

AMEBÍASE

1ª Escolha - Metronidazol

Adulto	500 a 750 mg, por via oral, 8/8 horas, durante 5 a 10 dias. Dose máxima diária: 4g.
Criança	35 a 50 mg/kg, por via oral 8/8 horas, durante 7 a 10 dias. Dose máxima diária: 2,4 g.

2ª Escolha - Tinidazol

Adulto	Formas intestinais: 2g, VO, para adultos, após uma das refeições por 2 dias. Formas extra-intestinais: 50mg/kg/dia, durante 2 ou 3 dias, de acordo com a clínica. Em formas graves, 2g, VO, por 3 dias.
--------	---

ENTEROBÍASE

Albendazol

Adulto	400 mg, por via oral, em dose única. O tratamento pode ser repetido após 2 a 3 semanas.
Criança	Até 2 anos: 200 mg, por via oral, em dose única; o tratamento pode ser repetido após 3 semanas.
	Acima de 2 anos: 400 mg, por via oral, em dose única; o tratamento pode ser repetido após 2 a 3 semanas.

GIARDÍASE

1ª Escolha - Metronidazol

Adulto	250 mg, por via oral 8/8 horas, durante 5 a 7 dias. Pode-se repetir o ciclo com intervalo de 1 semana.
Criança	15 mg/kg, por via oral 8/8 horas, durante 7 a 10 dias. Dose máxima diária: 750 mg

2ª Escolha - Tinidazol

Adulto	2g VO , dose única.
--------	---------------------

ASCARIDÍASE

Albendazol

Adulto	400 mg, por via oral, em dose única; o tratamento pode ser repetido após 2 a 3 semanas,
Criança	Até 2 anos: 200 mg, por via oral, em dose única; o tratamento pode ser repetido após 3 semanas.
	Acima de 2 anos: 400 mg, por via oral, em dose única; o tratamento pode ser repetido após 2 a 3 semanas.

CISTICERCOSE	
Albendazol	
Adulto	Menos de 60 kg: dose 7,5 mg/kg/dia, por via oral 12/12 horas, por 8 a 30 dias; dose máxima diária: 800 mg. Mais de 60 kg: dose 400 mg, por via oral, a cada 12 horas, durante 8 a 30 dias
Criança	15 mg/dia, por 30 dias de 8/8 horas, mais 100mg de Metilprednisolona, no primeiro dia de tratamento, depois manter 20 mg/dia, por 30 dias.

TENÍASE	
Albendazol	
Adulto	400 mg, por via oral, a cada 24 horas, durante 3 dias.
Criança	Até 2 anos: 200 mg, por via oral, a cada 24 horas, durante 3 dias. Acima de 2 anos: 400 mg, por via oral, a cada 24 horas, durante 3 dias.

ESCABIOSE	
Ivermectina	
Adulto	200 mcg/kg, por via oral em dose única, repetida após 7 a 14 dias. Recomenda-se tratar toda a família.

ESTRONGILOIDÍASE	
1ª Escolha - Ivermectina	
Adulto	200 microgramas/kg, por via oral, em dose única ou durante 2 dias. Se ainda existirem larvas após 3 meses, repetir o tratamento. Em pacientes imunodeprimidos a terapia pode ser repetida após duas semanas.
2ª Escolha - Albendazol	
Adulto	400 mg, por via oral, a cada 12 ou 24 horas, durante 2 a 3 dias.
Criança	200 mg, por via oral, a cada 24 horas, durante 3 dias. Acima de 2 anos 400 mg, por via oral, a cada 24 horas, durante 3 dias.

LARVA MIGRANS	
1ª Escolha - Ivermectina	
Adulto	150 a 200 microgramas/kg, por via oral, uma vez ao dia, durante 1 a 2 dias.
Criança	Acima de 5 anos 150 a 200 microgramas/kg, por via oral, uma vez ao dia, durante 1 a 2 dias.
2ª Escolha - Albendazol	
Adulto	400 mg, por via oral, de 12/12 horas, por 3 dias (cutânea) ou 5 dias (visceral).
Criança	Acima de 2 anos 400 mg, por via oral, de 12/12 horas, por 3 dias (cutânea) ou 5 dias (visceral).

13. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias : guia de bolso / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 8. ed. rev. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010.

14. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. Manual de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST e Aids. Brasília: Ministério da Saúde. 2005. 140p. Série Manuais n.o 68 4.ed

USO DE ANTIMICROBIANOS EM CORRIMENTOS VAGINAIS^{15,16}**TRICOMONÍASE**

Antimicrobiano

1ª Escolha	Metronidazol 2g VO, dose única. OU Metronidazol 500mg, VO, de 12/12 horas por 7 dias.
2ª Escolha	Tinidazol 2g VO, dose única.
Gestantes após o 1º trimestre e durante a amamentação	Metronidazol 2 g VO, dose única. OU Metronidazol 250 mg VO, de 8/8 horas por 7 dias.

CANDIDÍASE VULVOVAGINAL

Antimicrobiano

1ª Escolha	Miconazol, creme a 2%, via vaginal, 1 aplicação à noite ao deitar-se, por 7 dias.
2ª Escolha	Itraconazol 200mg VO, de 12/12 horas em 1 dia.
Gestantes após o 1º trimestre e durante a amamentação	Miconazol, creme a 2%, via vaginal, 1 aplicação à noite ao deitar-se, por 7 dias.

VAGINOSE BACTERIANA

Antimicrobiano

1ª Escolha	Metronidazol 500mg VO, de 12/12 horas por 7 dias.
2ª Escolha	Metronidazol 2 g VO, dose única. OU Metronidazol gel 0,75%, 1 aplicação vaginal (5 g), 1 a 2 vezes ao dia, por 5 dias. OU Clindamicina 300 mg, VO, de 12/12 horas, por 7 dias.
Gestantes após o 1º trimestre e durante a amamentação	Metronidazol 250mg, de 8/8 horas por 7 dias. OU Clindamicina 300mg VO, de 12/12 horas por 7 dias.

**INFECÇÕES MISTAS
(TRICOMONÍASE + CANDIDÍASE)**

Antimicrobiano

Tinidazol 2g VO, dose única + Miconazol, creme a 2%, via vaginal, uma aplicação à noite, por 10 a 14 dias

15. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. *Manual de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis* / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST e Aids. Brasília: Ministério da Saúde. 2005. 140p. Série Manuais n.º 68 4.ed.

16. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. *Formulário terapêutico nacional 2010: RENAME 2010*/Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010

RESUMO 2013