

PARECER TÉCNICO

10/08/2018

MEDICAMENTO SOLICITADO: Aripiprazol 10mg

INDICAÇÃO DE BULA: É indicado para o tratamento de esquizofrenia, tratamento agudo e de manutenção de episódios de mania e mistos associados ao transtorno bipolar do tipo I¹.

DOENÇA(S) INFORMADA(S): CID F29 – Psicose não-orgânica não especificada².

RESPOSTA

A psicose é uma síndrome neurológica associada ao funcionamento anormal dos lobos frontal e temporal e às projeções dopaminérgicas para essas áreas, que pode se manifestar como alucinações, delírios e pensamentos e comportamentos desorganizados, além de alterações da personalidade³. Pode ser causada por transtornos psicóticos primários, como a esquizofrenia, transtorno delirante, transtorno esquizoafetivo, transtorno esquizofreniforme e transtorno psicótico breve, bem como por causa secundária, incluindo medicamentos psicoativos ou doenças em geral³.

Para definir a psicose aguda como um transtorno psicótico é necessário primeiramente descartar as causas orgânicas³. O Ministério da Saúde possui protocolo específico para o Tratamento da Esquizofrenia⁴, do Transtorno Esquizoafetivo⁵ e do Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I⁶. Os referidos protocolos levam em conta as evidências disponíveis e dispensa à população os tratamentos medicamentosos utilizados nas doenças^{4,5,6}. Os medicamentos disponíveis no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e preconizados nos referidos protocolos são:

-Esquizofrenia: Ziprazidona, Clozapina, Olanzapina, Quetiapina e Risperidona⁴.

-Transtorno Esquizoafetivo: Risperidona, Quetiapina, Ziprazidona, Olanzapina Clozapina⁵.

-Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I: Lamotrigina, Risperidona, Quetiapina, Olanzapina e Clozapina⁶.

Além dos medicamentos citados acima, estão disponíveis na REMUME⁷, para o tratamento dos transtornos referidos, os seguintes medicamentos: Decanoato de haloperidol 50 mg/mL - solução injetável, Clorpromazina, Carbonato de Lítio, Carbamazepina, Ácido Valproico e Haloperidol comprimidos, haloperidol 2 mg/mL - solução oral e Fluoxetina cápsulas.

Uma revisão sistemática realizada por Komossa et al., comparou os efeitos do aripiprazol com outros antipsicóticos atípicos para as pessoas com esquizofrenia⁸. A revisão incluiu quatro estudos com 1.404 participantes e confrontou aripiprazol contra olanzapina e risperidona. O Aripiprazol se mostrou menos eficaz do que a olanzapina em termos do estado mental geral. Comparado com a risperidona, não existiu diferença na eficácia⁸. O tratamento com aripiprazol não foi incluído nos protocolos do Ministério da Saúde por não ter eficácia superior aos antipsicóticos apresentados acima e seu custo ser mais alto^{4,5,6}. No relatório constante no processo, o médico informa que já utilizou o antipsicótico risperidona.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Avenida Romeu Strazzi, 199 – Vila Sinibaldi - CEP 15084-010 - São José do Rio Preto - SP
Telefone (17) 3216 9785 – sms.daf@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

Caso não seja possível adequar a prescrição aos protocolos do Ministério da Saúde, há os antipsicóticos disponíveis na REMUME⁷, que não foram prescritos e que são encontrados nas farmácias das Unidades de Saúde.

REFERÊNCIAS:

1. ARISTAB. Farmacêutica Responsável: Gabriela Mallmann. Guarulhos - SP : Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. Bula de remédio aprovada em 12/08/2016. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=24149482016&pIdAnexo=3970226. Acesso em 10 de Agosto 2018.
2. DATASUS – Departamento de Informática do SUS. Sistemas – cadastros nacionais. Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - CID-10. Disponível em: http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f20_f29.htm Acesso: 10 de Agosto 2018.
3. BMJ Best Practice. Avaliação da Psicose. Última atualização: Dezembro, 2016. BMJ Publishing Group Limited. Disponível em: <https://bestpractice.bmj.com/topics/pt-br/1199/treatment-algorithm>. Acesso em: 10 Agosto 2018.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Esquizofrenia. Disponível em: <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdt-esquizofrenia-livro-2013.pdf>. Acesso em: 10 Agosto 2018.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. Transtorno esquizoafetivo. Disponível em: <http://conitec.gov.br/images/Protocolos/TranstornoEsquizoafetivo.pdf>. Acesso em 10 agosto 2018.
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Protocolos/PCDT_TranstornoAfetivoBipolar_TipoI.pdf. Acesso em 10 agosto 2018.
7. BRASIL. Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto – SP. Disponível em: <http://gestao.saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/arqu/arqufunc/2018/remume-2018.pdf>. Acesso em: 10 agosto 2018.
8. BRASIL. Ministério da Saúde. Nota Técnica N° 07/2012 (Atualizada em 04/12/2015). Disponível em: <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/12/Aripiprazol---atualizada-em-04-12-2015-.pdf>. Acesso em 10 agosto 2018.