



PREFEITURA DE
RIO PRETO
SAÚDE

REMUME

2021

São José do Rio Preto/SP

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Secretaria Municipal de Saúde

Comissão de Farmácia e Terapêutica – Portaria SMS nº 07 de 15 de abril de 2019.

Alcides Pinto de Souza Junior – Médico - DUE
Alex dos Reis Recio – Farmacêutico - DAF
Ana Ligia Pereira Santos – Farmacêutica – DAF
Anderson José de Almeida – Farmacêutico – DAF
Carmen Lígia Firmino Marques – Farmacêutica – DAF
Claudio Rodrigues de Andrade Filho – Farmacêutico - DAF
Marcia Wakai Catelan – Infectologista Pediátrica – DEVISA
Maria Silvia Araújo Pereira – Farmacêutica – DAF
Monica Sanches Ita – Médica - DAE
Saulo Anzei – Médico - DAE
Simone Secco da Rocha – Médica – DAB
Soraya Andrade Pereira – Médica – DAB

Coordenadores das áreas técnicas:

Adriana Érika Marques Guarnieri – Enfermeira – DAB/DAE – Gerência de Enfermagem
Andrea Zocal – pediatra – DAB – Saúde da Criança
Ana Maria Carpes Pranke – Dentista – DAB – Saúde Bucal
Ana Paula Lago – Médica– DAB – Saúde da Mulher
Fabiana Monteiro Jacinto de Melo – Enfermeira – DAB - Saúde do Adulto

Abreviaturas

AE – Prescrição Ambulatório Especializado

AMP – ampola

BIS – Bisnaga

CAR - Cartela

D – Dispensação para o paciente

EV – Endovenoso

FR – Frasco

FR AMP – frasco ampola

G - Grama

IM – Intramuscular

ML – Mililitros

SC - Subcutâneo

US – Uso na Unidade de Saúde

VO – Via oral

DAB – Departamento de Atenção Básica

DAF – Departamento de Assistência Farmacêutica

DEVISA – Departamento de Vigilância Epidemiológica

DUE – Departamento de Urgência e Emergência

CBAF – Componente Básico da Assistência Farmacêutica

CESAF – Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica

Sumário

I – CLASSIFICAÇÃO POR GRUPO FARMACOLÓGICO	12
A - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CBAF	13
1. ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS	13
1.1. ANALGÉSICO NÃO OPIOIDE E ANTIPIRÉTICOS	13
1.2. ANALGÉSICO OPIOÍDE	13
2. ANESTÉSICOS	13
2.1. ANESTÉSICO LOCAL	13
2.2. ANESTÉSICOS GERAIS	14
2.3. ADJUVANTES DA ANESTESIA	14
2.4. BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR	15
3. ANTIALÉRGICO	15
4. ANTÍDOTOS USADOS EM INTOXICAÇÕES EXÓGENAS	15
4.1. NÃO ESPECÍFICO	15
4.2. ESPECÍFICO	16
5. ANTI-INFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA	16
5.1. ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES	16
5.2. ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES	16
5.3. MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA	17
6. ANTIMICROBIANOS	17
6.1. ANTIBACTERIANOS SISTÊMICOS	17
6.1.1. PENICILINAS	17
6.1.2. CEFALOSPORINAS	17
6.1.3. GLICOPEPTÍDEOS	18
6.1.4. SULFONAMIDAS E ANTISSÉPTICOS URINÁRIOS	18
6.1.5. MACROLÍDEOS	18
6.1.6. QUINOLONAS	19
6.1.7. TETRACICLINAS	19
6.1.8. IMIDAZÓLICOS	19
6.2. CARBAPENÊMICO	19
6.3. ANTIBACTERIANOS TÓPICOS	19

6.4. OFTALMOLÓGICOS.....	19
6.5. ANTIFÚNGICOS.....	19
6.5.1. SISTÊMICOS.....	19
6.5.2. TÓPICOS.....	20
6.6. ANTIVIRAIS.....	20
6.7. ANTISSÉPTICOS.....	20
6.8. ANTIPARASITÁRIOS.....	20
6.8.1. ESCABICIDA E PEDICULICIDA.....	20
6.8.2. ANTI-HELMÍNTICOS.....	20
6.8.3. ANTIPROTOZOÁRIOS.....	20
6.8.3.1. AMEBICIDA, GIARDICIDA E TRICOMONICIDA.....	21
6.8.3.2. MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE E ADJUVANTES.....	21
7. ANTIVERTIGINOSOS.....	21
8. VITAMINAS.....	22
9. CORREÇÃO DE ELETRÓLITOS.....	22
10. SUPLEMENTOS MINERAIS.....	22
10.1. REIDRATAÇÃO ORAL.....	22
11. SOLUÇÕES INTRAVENOSAS - REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO.....	22
12. SISTEMA CARDIOVASCULAR.....	23
12.1. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA.....	23
12.2. ANTI-ARRÍTIMICO.....	24
12.3. ANTI-HIPERTENSIVO.....	24
12.3.1. DIURÉTICOS.....	24
12.3.2. BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS.....	24
12.3.3. BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS DE AÇÃO CENTRAL.....	24
12.3.4. BLOQUEADOR DE CANAIS DE CÁLCIO.....	24
12.3.5. VASODILATADOR.....	24
12.3.6. INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA.....	25
12.3.7. ANTAGONISTA DE RECEPTOR DE ANGIOTENSINA II.....	25
12.4. USADOS EM CHOQUE – ESTIMULANTES ADRENÉRGICOS – DROGAS VASOATIVAS.....	25
12.5. HIPOLIPEMIANTES.....	25
12.6. CARDIOTÔNICO - GLICOSÍDEO CARDÍACO.....	25

12.7. ANTITROMBÓTICO	25
13. SISTEMA DIGESTIVO	26
13.1. ANTIÁCIDOS	26
13.2. ANTISECRETORES	26
13.3. ANTIEMÉTICOS E AGENTES PRÓCINÉTICOS.....	26
13.4. ANTIESPASMÓDICO	26
13.5. ANTIESPASMÓDICO ASSOCIADO COM ANALGÉSICO.....	26
13.6. LAXATIVO	27
13.7. ANTIFLATULANTE.....	27
14. SISTEMA ENDÓCRINO	27
14.1. HORMÔNIOS TIREOIDIANOS	27
14.2. INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS.....	27
15. SISTEMA REPRODUTOR - HORMÔNIOS SEXUAIS	28
15.1. REPOSIÇÃO HORMONAL.....	28
15.2. INIBIDOR DA PROLACTINA	28
15.3. CONTRACEPTIVOS HORMONAIS ORAIS	28
15.4. CONTRACEPTIVOS HORMONAIS INJETÁVEIS.....	28
15.5. CONTRACEPTIVO DE BARREIRA	28
15.6. CONTRACEPTIVO DE USO TÓPICO	28
16. TRATAMENTO/PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE	28
17. SISTEMA RESPIRATÓRIO	29
17.1. ANTIASMÁTICOS.....	29
17.2. PREPARAÇÕES NASAIS	29
17.3. INALANTES.....	29
18. SANGUE	29
18.1 ANTIANÊMICOS	29
18.2. ANTICOAGULANTES.....	29
18.3. ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS	30
18.4. ANTI-HEMORRÁGICO.....	30
19. SISTEMA NERVOSO	30
19.1. ANTICONVULSIVANTE.....	30
19.2. ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZANTES DO HUMOR.....	31

19.3. ANSIOLÍTICOS E HIPOSEDATIVOS.....	32
19.4. ESTIMULANTE SISTEMA NERVOSO CENTRAL	32
19.5. AUXILIAR DO TRATAMENTO DO ALCOOLISMO.....	32
19.6. ANTIPARKINSONIANOS	32
19.7. ANTIPSICÓTICOS	33
20. SISTEMA OCULAR.....	33
20.1. ANESTÉSICO LOCAL	33
20.2. CICATRIZANTE.....	34
20.3.MIDRIÁTRICOS E CICLOPLÉGICOS.....	34
20.4. AGENTE DIAGNÓSTICOUS	34
20.5. DESCONGESTIONANTES E ANTIALÉRGICOS	34
20.6. ANTIMICROBIANO.....	34
21. PELE E MUCOSA	34
21.1. CICATRIZANTES, EMOLIENTES E PROTETORES.....	34
21.2. ANOMICROBIANOS.....	34
21.3. TRATAMENTO DE FERIDAS.....	35
22. SISTEMA UROGENITAL.....	35
22.1. HIPERPLASIA BENÍGNA DA PRÓSTATA	35
22.1.1. ANTAGONISTA ALFA-ADRENÉRGICO	35
22.1.2. INIBIDOR DA 5-ALFA-REDUTASE.....	35
23. FITOTERÁPICOS.....	35
24. HOMEOPÁTICOS	35
25. OUTROS PRODUTOS AUXILIARES NÃO TERAPÊUTICOS	35
25.1. APLICAÇÃO DE INSULINA.....	35
25.2. AUTOMONITORAMENTO DE GLICEMIA.....	36
25.3. OXIGENOTERAPIA.....	36
25.4. DIAGNÓSTICO SAÚDE DA MULHER.....	36
B - COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CESAF)	37
1. PROGRAMA DST/AIDS	37
1.1. ANTIVIRAIS.....	37
1.2.ANTIRRETROVIRAIS.....	37
1.2.1.INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA ANÁLOGA DE NUCLEOSÍDEO.....	37

1.2.2.INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA NÃO-ANÁLOGOS DE NUCLEOSÍDEO	38
1.2.3.INIBIDORES DE PROTEASE.....	38
1.2.4.INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA ANÁLOGA DE NUCLEOTÍDEO	38
1.2.5.INIBIDORES DE INTEGRASE.....	39
1.3.OUTROS ANTIRRETROVIRAIS.....	39
1.4.ANTI-INFECCIOSO/ANTI-FÚNGICO E ADJUVANTES	39
1.5.SISTEMA DIGESTIVO	39
1.5.1.ANTIDIARRÊICO SINTOMÁTICO	39
2.PROGRAMA TUBERCULOSE.....	40
3.PROGRAMA HANSENÍASE	41
3.1.TRATAMENTO.....	41
3.2. COADJUVANTES	41
4.PROGRAMA DE TABAGISMO	42
5. TOXOPLASMOSE	42
6. INFLUENZA	43
7. HEPATITES VIRAIS	43
8. ESQUISTOSSOMOSE	44
9. DOENÇA DE CHAGAS.....	44
10. BRUCELOSE	44
11. DIFTERIA	44
12. FILARIOSE.....	44
13. MENINGITES	45
14. LEISHIMANOSE	45
15. MICOSES SISTÊMICAS.....	45
II – CLASSIFICAÇÃO – ORDEM ALFABÉTICA	46
III – MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS	71
1. ATENÇÃO BÁSICA - CARRINHO DE EMERGÊNCIA.....	72
2. ATENÇÃO BÁSICA - MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO	73
2.1 KIT PARA GLICEMIA	74
3. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	75
4. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SALA DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA	76
4.1 KIT PARA GLICEMIA	77

5. LEITO COVID-19.....	78
5.1. MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO, SEDAÇÃO E INTUBAÇÃO DE PACIENTES.....	78
IV – USO DE ANTIMICROBIANOS EM INFECÇÕES EM ADULTOS.....	79
1. TRATAMENTO DAS INFECÇÕES REPIRATÓRIAS ALTAS	80
1.1. SINUSITE^{1,2,3,4,31}	80
1.2. FARINGITE E AMIGDALITE PURULENTAS^{3,5,6,33}	80
1.3. RINITE¹⁹	80
1.4. OTITE MÉDIA AGUDA^{1,3,7,33}	80
1.5. BRONQUITE AGUDA¹	80
1.6. COQUELUCHE^{3,9,33}	81
1.7. PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE^{3,10,11,12,13,32}	81
1.7.1. PACIENTES PREVIAMENTE SADIOS, TRATAMENTO EM DOMICÍLIO, SEM USO DE ANTIBIÓTICOS	81
NOS ÚLTIMOS 3 MESES:^{3,10,11,13,32}	81
1.7.2. PACIENTES COM DOENÇAS ASSOCIADAS OU USO DE ANTIBIÓTICOS NOS ÚLTIMOS 3 MESES:^{3,10,11,13}	81
1.7.3. PACIENTES EM LEITO DE OBSERVAÇÃO - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO²⁴	82
1.7.4. PACIENTES GRAVES ENCAMINHADOS PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR²⁴	82
1.8 PNEUMONIA ATÍPICA^{3,30}	82
2. TRATAMENTO DAS INFECÇÕES URINÁRIAS.....	83
2.1. CISTITE AGUDA EM MULHERES GRÁVIDAS³⁴	83
2.2. CISTITE AGUDA NÃO COMPLICADA EM ADULTO^{3,14,16,34,35}	83
2.3. UROCULTURA³	83
2.4. CISTITE COMPLICADA – PACIENTES EM LEITO DE OBSERVAÇÃO NA UPA²⁵	83
2.5. PIELONEFRITE AGUDA^{3,14,16,34,35}	84
2.6. UROCULTURA³	84
2.7. PIELONEFRITE AGUDA - PACIENTES EM LEITO DE OBSERVAÇÃO UPA²⁵	84
3. TRATAMENTO DAS INFECÇÕES DE PELE	84
3.1. IMPETIGO^{3,17,20,22,33}	84
3.2. ERISPELA LEVE PRECOCE.....	85
3.3. ERISPELA EXTENSA	85
3.4. CELULITE LEVE	85
3.5. CELULITE EXTENSA E GRAVE	85
3.6. PROFILAXIA DE MORDEDURA DE CÃO OU GATO OU ANIMAIS^{3,8}	86

3.7. INFECCÃO PÓS MORDEDURA DE CÃO OU GATO OU ANIMAIS (MORDEDURAS MÚLTIPLAS E EXTENSAS) ³	86
4. INFECCÕES DA CAVIDADE ORAL.....	86
4.1. PROFILAXIA ANTIBIÓTICA (PREVENÇÃO DA ENDOCARDITE INFECCIOSA). ^{27,28,29}	86
4.2. ABCESSO PERIAPICAL AGUDO ^{27,28,29}	86
V – USO DE ANTIMICROBIANOS EM INFECCÕES PEDIÁTRICAS	90
1. COQUELUCHE ^{3,12}	91
2. FARINGITE ^{1,6,12}	91
3. OTITE MEDIA AGUDA ^{1,4,6,11, 12}	91
4. SINUSITE ^{1, 12}	92
5. PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE ^{1,2,5,6,7,8}	92
6. PNEUMONIA ATÍPICA ^{1,6,8,9}	92
7. IMPETIGO BOLHOSO, CELULITE OU ERISPELA ^{1,10,12}	92
8. INFECCÕES DO TRATO URINÁRIO ^{1,12,13}	93
9. INFECCÕES GASTROINTESTINAIS ^{1,12}	93
VI – USO DE ANTIMICROBIANOS EM PARASIToses	95
1. AMEBÍASE ^{1, 2}	96
2. ENTEROBÍASE ^{1, 2, 3}	96
3. GIARDÍASE ^{1,2}	96
4. ASCARIDÍASE ^{2,3}	97
5. TENÍASE ^{1,2,3}	97
6. ESCABIOSE ²	97
7. PEDICULOSE ²	98
8. ESTRONGILOIDÍASE ^{1, 2, 3}	98
9. LARVA MIGRANS ^{1,2,3}	98
10. TOXOPLASMOSE	99
VII – USO DE ANTIMICROBIANOS EM INFECCÕES GENITAIS	101
1. USO DE ANTIMICROBIANOS EM CORRIMENTOS VAGINAIS	102
1.1. TRICOMONÍASE ¹	102
1.2. CANDIDÍASE VULVOVAGINAL ¹	102
1.3. VAGINOSE BACTERIANA ¹	102
2. USO DE ANTIMICROBIANOS EM CORRIMENTOS URETRAIS.....	103
2.1. URETRITE GONOCÓCICA E POR CLAMÍDIA NÃO COMPLICADA (URETRITE E PROCTITE) ¹	103

2.2. URETRITE POR CLAMÍDIA ¹	103
2.3. URETRITE POR MYCOPLASMA GENITALIUM ¹	103
3. SÍFILIS.....	103
3.1 SÍFILIS PRIMÁRIA, SÍFILIS SECUNDÁRIA E LATENTE RECENTE (ATÉ UM ANO DE DURAÇÃO) ¹	103
3.2 SÍFILIS LATENTE TARDIA (MAIS DE UM ANO DE DURAÇÃO) OU LATENTE COM DURAÇÃO IGNORADA E	103
SÍFILIS TERCIÁRIA ¹	103
VIII – PARECERES DE INCLUSÃO	105
ÁCIDO TRANEXÂMICO	106
ATROPINA.....	109
CANETA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA.....	111
CLORTALIDONA	113
ESPIRAMICINA.....	117
MEDICAMENTOS PARA SEDAÇÃO E INTUBAÇÃO DE PACIENTES EM LEITO COVID-19	120
NOREPINEFRINA	122
RISPERIDONA	125
SALBUTAMOL GOTAS PARA INALAÇÃO.....	129
TRAMADOL E IBUPROFENO.....	132
VALERIANA OFFICINALIS	135
.....	139
IX – PARECERES DE EXCLUSÃO	139
FENOTEROL.....	140
MEDROXIPROGESTERONA.....	143
RANITIDINA	145
TENOXICAM.....	148
TINIDAZOL	150
X – FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS	154
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO.....	155
AZITROMICINA.....	156
CEFTRIAXONA	157
CLINDAMICINA.....	158
LEVOFLOXACINO	159
VANCOMICINA.....	160

I – CLASSIFICAÇÃO POR GRUPO FARMACOLÓGICO

A - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CBAF

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
1. ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS			
1.1. ANALGÉSICO NÃO OPIOIDE E ANTIPIRÉTICOS			
Dipirona	solução oral 500 mg/mL, fr 10 mL		D
Dipirona	solução injetável 500 mg/mL, amp 2 mL, IM/IV		US
Paracetamol	comprimido 500 mg solução oral 200 mg/mL, fr 15 mL		D
1.2. ANALGÉSICO OPIOÍDE			
Codeína	comprimido 30 mg	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
Morfina	solução injetável 1 mg/mL, amp 2 mL, IM/IV solução injetável 10 mg/mL, amp 1 mL, IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
Tramadol	solução injetável 50 mg/mL, amp 2mL, IM/IV/SC	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo da dor.	US
2. ANESTÉSICOS			
2.1. ANESTÉSICO LOCAL			
Bupivacaína, cloridrato	solução injetável, 5 mg/mL, frasco ampola 20 mL	Uso restrito nos procedimentos de prostectomia e cirurgia plástica no Núcleo Diagnóstico Hospital Dia – Complexo Pró Saúde.	US
Lidocaína	aerossol 10% solução injetável 2% - tubete 1,8 mL e frasco amp 20 mL		US
Lidocaína	gel 2%, bisnaga 30 g	Seguir protocolo de cateterismo vesical intermitente.	US/D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Lidocaína + epinefrina	solução injetável 20 mg + 0,005 mg/mL		US
Lidocaína + epinefrina	solução injetável 20 mg + 1/100.000/mL	Uso odontológico.	US
Prilocáína + felipressina	solução injetável 30 mg + 0,03 UI/mL	Uso odontológico.	US
2.2. ANESTESICOS GERAIS			
Dextrocetamina	solução injetável, 50mg/ml , frasco 10 ml	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso restrito em leito Covid-19.	US
Etomidato	solução injetável 2 mg/mL, amp 10 mL, IV	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
Propofol	Solução injetável 10mg/mL, amp 20mL	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso no Complexo Pró Saúde – Hospital Dia e Leito Covid-19.	US
2.3. ADJUVANTES DA ANESTESIA			
Dexmedetomidina, cloridrato	solução injetável, 100mcg/ml, amp 2 ml	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso restrito em leito Covid-19.	US
Fentanila	solução injetável 0,05 mg/mL, amp 2 mL, IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Uso restrito na UPA, SAMU e Complexo Pró-Saúde. Receita branca.	US
Fentanila	solução injetável, 0,05 mg/mL, amp 10 mL IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso no Complexo Pró Saúde – Hospital Dia e leito Covid-19.	US
Midazolam	solução injetável 5 mg/mL, amp 3 mL, IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Midazolam	solução injetável 5 mg/mL, amp 10 mL, IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso restrito em leito Covid-19.	US
Morfina	solução injetável, 10mg/ml, ampola 1ml	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
2.4. BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR			
Atracurio, besilato	solução injetável 10 mg/mL, amp 5 ml	Uso restrito em leito Covid-19.	US
Pancurônio	solução injetável 2mg/ml, amp 2 ml	Uso restrito em leito Covid-19.	US
Rocurônio	solução injetável 10mg/ml, amp 5 ml	Uso restrito em leito Covid-19.	US
Suxametônio	pó para solução injetável 100 mg, fr amp, IM/IV/SC		US
3. ANTIALÉRGICO			
Loratadina	comprimido 10 mg solução oral 1 mg/mL, fr 100 mL		D
Prometazina	comprimido 25 mg		D
Prometazina	solução injetável 25 mg/mL, amp 2 mL, IM		US
4. ANTÍDOTOS USADOS EM INTOXICAÇÕES EXÓGENAS			
4.1. NÃO ESPECÍFICO			
Bicarbonato de sódio	solução injetável 1 mEq/mL (8,4%), fr 250 mL, IV		US
Carvão vegetal ativado	pó para uso oral, sache 10 g		US

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
4.2. ESPECÍFICO			
Atropina	solução injetável 0,50 mg/mL, amp 1 mL, IM/IV/SC		US
Flumazenil	solução injetável 0,1 mg/mL, amp 5 mL, IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
Naloxona, cloridrato	Solução injetável 0,4 mg/mL, amp 1 ml	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso no Complexo Pró Saúde – Hospital Dia e leito Covid-19.	US

5. ANTI-INFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA

5.1. ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES

Diclofenaco	comprimido 50 mg	Uso não recomendado para crianças menores 12 anos	D
Diclofenaco	solução injetável 25 mg/mL, amp 3 mL, IM		US
Ibuprofeno	solução oral 50 mg/mL, gotas, fr 30 mL		D
Ibuprofeno	600 mg, comprimido	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo da dor.	US

5.2. ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES

Dexametasona	creme 0,1%, bis 10 g		D
Dexametasona	solução injetável 2 mg/mL, amp 1 mL, IM/IV solução injetável 4 mg/mL, amp 2,5 mL, IM/IV		US
Hidrocortisona	pó para solução injetável 100 mg, fr amp, IM/IV pó para solução injetável 500 mg, fr amp, IM/IV		US

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Prednisolona	solução oral 3 mg/mL, fr 100 mL	Uso restrito crianças e pessoas com dificuldade de deglutição.	D
Prednisona	comprimido 5 mg comprimido 20 mg		D
Acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona	solução injetável 3 mg + 3 mg/mL, amp 1 mL, IM	Uso restrito para gestantes em situação de risco.	D
5.3. MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA			
Alopurinol	comprimido 100 mg comprimido 300 mg		D

6. ANTIMICROBIANOS

6.1. ANTIBACTERIANOS SISTÊMICOS

6.1.1. PENICILINAS

Amoxicilina	cápsula ou comprimido 500 mg suspensão oral 250 mg/5 mL, fr 60 e 150 mL		D
Amoxicilina + ácido clavulânico	comprimido 500 mg + 125 mg suspensão oral 250 mg + 62,5 mg/5 mL, fr 75 mL	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, de acordo com a legislação municipal vigente. Receita em duas vias.	D
Benzilpenicilina benzatina	pó para suspensão injetável 600.000 UI, fr amp, IM pó para suspensão injetável 1.200.000 UI, fr amp, IM	Receita em duas vias.	D
Benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina benzatina	pó para suspensão injetável 300.000 UI + 100.000 UI, fr amp, IM	Receita em duas vias.	D
Piperacilina + Tazobactam	frasco ampola 4 g + 0,5 g	Uso restrito em leito Covid-19.	US

6.1.2. CEFALOSPORINAS

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Cefalexina	cápsula ou comprimido 500 mg suspensão oral 250 mg/5 mL, fr 100 mL	Receita em duas vias.	D
Ceftriaxona	pó para solução injetável 1g, fr amp, IV	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, de acordo com protocolo municipal vigente. Nos casos de IST é necessária a notificação SINAN. Receita em duas vias.	D
6.1.3. GLICOPEPTÍDEOS			
Vancomicina	pó para solução injetável 500 mg, IV (infusão)	Uso em continuidade do tratamento de osteomielite. Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, de acordo a legislação municipal vigente. Receita em duas vias.	D
6.1.4. SULFONAMIDAS E ANTISSEPTICOS URINÁRIOS			
Sulfametoxazol + trimetoprima	comprimido 400 mg + 80 mg suspensão oral 200mg + 40 mg/5mL, fr 100 mL	Receita em duas vias.	D
Nitrofurantoína	comprimido 100 mg	Receita em duas vias.	D
6.1.5. MACROLÍDEOS			
Azitromicina	comprimido 500 mg	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, conforme legislação municipal vigente. Nos casos de IST é necessária a notificação. Receita em duas vias.	D
Azitromicina	pó para suspensão oral, 40mg/mL	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, de acordo com legislação municipal vigente. Receita em duas vias.	D
Claritromicina	comprimido 500 mg	Uso em pacientes com diagnóstico de H. Pylori. Uso restrito para o tratamento de micobactérias atípicas. Receita em duas vias.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
6.1.6. QUINOLONAS			
Ciprofloxacino	cápsula ou comprimido 500 mg	Receita em duas vias.	D
Levofloxacino	comprimido de 250 mg e 500 mg	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, de acordo com legislação municipal vigente. Receita em duas vias.	D
Clindamicina	cápsula 300 mg	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio. Uso em IST necessário a notificação. Receita em duas vias.	D
Clindamicina	solução injetável 150mg/mL, amp 4 mL, IM/EV	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo.	US
6.1.7. TETRACICLINAS			
Doxiciclina	comprimido 100 mg	Receita em duas vias.	D
6.1.8. IMIDAZÓLICOS			
Metronidazol	comprimido 250 mg suspensão oral 40 mg/mL, fr 80 mL	Receita em duas vias.	D
Metronidazol	solução injetável 5mg/mL, fr 100 mL, EV	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo.	US
6.2. CARBAPENÊMICO			
Meropeném	pó liofilizado para solução injetável 1 g, frasco ampola	Uso restrito em leito Covid-19.	D
6.3. ANTIBACTERIANOS TÓPICOS			
Neomicina + bacitracina	pomada 5 mg + 250 UI/g, bis 10 g		D
6.4. OFTALMOLÓGICOS			
Gentamicina	colírio 5 mg/mL, fr 5 mL	Receita em duas vias.	D
6.5. ANTIFÚNGICOS			
6.5.1. SISTÊMICOS			
Itraconazol	comprimido 100 mg	Receita em duas vias.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
6.5.2. TÓPICOS			
Nistatina	suspensão oral 100.000 UI/mL, fr 50 mL	Receita em duas vias.	D
Miconazol	creme dermatológico 20 mg/g, bis 28 g	Uso restrito para lactentes, crianças e dermatite fúngica da área das fraldas.	D
Miconazol	creme vaginal 2%, bis 80 g + 1-aplicadores	Uso restrito pela via de aplicação vaginal.	D
6.6. ANTIVIRAIS			
Aciclovir	comprimido 200 mg	Receita em duas vias.	D
Oseltamivir	comprimido 30 mg comprimido 45 mg comprimido 75 mg	Receita em duas vias.	D
6.7. ANTISSEPTICOS			
Ácido tricloroacético	solução 80%, fr 20 mL		US
Água oxigenada	solução 10 vol., fr 1000 mL		US
Álcool etílico	solução 70%, fr 1000 mL	Antissepsia da pele.	US
Hipoclorito de sódio	solução 2,5%, fr 50 mL		D
Clorexidine sol. aquosa 1%	frasco 1 L	Uso restrito conforme POP curativos.	US
Clorexidine sol. degermante 2%	frasco 1 L	Uso restrito conforme POP curativos.	US
Clorexidine sol. alcoólica 0,5%	frasco 1 L	Uso restrito conforme POP curativos.	US
6.8. ANTIPARASITÁRIOS			
6.8.1. ESCABICIDA E PEDICULICIDA			
Ivermectina	comprimido 6 mg		D
Permetrina	loção 1 % e 5 %, fr 60 mL		D
6.8.2. ANTI-HELMÍNTICOS			
Albendazol	comprimido mastigável 400 mg suspensão oral 40 mg/mL fr 10 mL		D
Ivermectina	comprimido 6 mg		D
6.8.3. ANTIPROTOZOÁRIOS			

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
6.8.3.1. AMEBICIDA, GIARDICIDA E TRICOMONICIDA			
Metronidazol	comprimido 250 mg suspensão oral 40 mg/mL, fr 80mL	Receita em duas vias.	D
Metronidazol	geleia vaginal 500 mg/5 g, bis 50 g + 10 aplicadores	Receita em duas vias.	D
6.8.3.2. MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE E ADJUVANTES			
Ácido fólico	comprimido 15 mg	Protocolo de Toxoplasmose. Crianças até um ano: manipulação conforme Portaria SMS nº 02 de 26 de janeiro de 2015.	D
Clindamicina	cápsula 300 mg	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, de acordo com legislação municipal vigente. Receita em duas vias.	D
Espiramicina	comprimido 1,5 mui	Protocolo de Toxoplasmose. Receita em duas vias + Notificação SINAN + exames.	D
Pirimetamina	comprimido 25 mg	Protocolo de Toxoplasmose. Receita em duas vias + Notificação SINAN + exames. Crianças até um ano: manipulação conforme Portaria SMS nº 02 de 26 de janeiro de 2015.	D
Sulfadiazina	comprimido 500 mg	Protocolo de Toxoplasmose. Receita em duas vias + Notificação SINAN + exames. Crianças até um ano: manipulação conforme Portaria SMS nº 02 de 26 de janeiro de 2015.	D
7. ANTIVERTIGINOSOS			
Cinarizina	comprimido 75 mg		D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
8. VITAMINAS			
Tiamina	comprimido 300 mg	Prevenção e tratamento da deficiência da tiamina.	D
Tiamina	solução injetável (100 mg/mL), amp 1 mL, IM/IV	Situações de emergência em alcoolistas crônicos.	US
Vitamina C (ácido ascórbico)	comprimido 500 mg	Pacientes em hemodiálise.	D
Vitamina do complexo B (tiamina (B1) + riboflavina (B2) + pantotenato (B5) + piridoxina (B6))	drágeas	Pacientes em hemodiálise e em tratamento da tuberculose.	D
9. CORREÇÃO DE ELETRÓLITOS			
Cloreto de potássio	xarope 6%, fr 100 mL		D
10. SUPLEMENTOS MINERAIS			
10.1. REIDRATAÇÃO ORAL			
Sais para reidratação oral	Composição: cloreto sódio 3,5g glicose 20g, indicação citrato de sódio 2,9g cloreto de potássio 1,5g. Pó para o preparo de solução oral. Para uso em 1.000mL de solução pronta, segundo padrão OMS. Envelope contendo 27,9g		D
11. SOLUÇÕES INTRAVENOSAS - REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO			
Água para injeção	solução injetável, amp 10 mL		US
Bicarbonato de sódio	solução injetável 1 mEq/mL (8,4%), fr 250 mL, IV		US
Cloreto de potássio	solução injetável 19,1% (2,56 mEq/mL), amp 10 mL, IV		US
Cloreto de sódio	solução injetável 20 % (3,4 Eq/mL), amp 10 mL, IV		US

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Gliconato de cálcio	solução injetável 10 % (0,45 mEq/mL), amp 10 mL, IV		US
Glicose	solução injetável 250 mg/mL (25%), amp 10 mL, IV solução injetável 500 mg/mL (50%), amp 10 mL, IV		US
Soro fisiológico – cloreto de sódio	solução injetável 0,9 % (0,154 mEq/mL), fr 100 mL, 250 mL, 500 mL e 1000 mL, IV		US
Soro glicosado – glicose	solução injetável 50 mg/mL (5%), fr 250 e 500 mL, IV		US
Solução ringer + lactato	solução injetável, fr 500 mL, IV Composição por litro: cloreto 109 mEq, sódio 130 mEq, potássio 4 mEq, cálcio 2,7 mEq, lactato 27,7 mEq		US
Sulfato de magnésio	solução injetável 10 %, amp 10 mL, IV	Indicado para casos de pré-eclampsia e eclampsia.	US

12. SISTEMA CARDIOVASCULAR

12.1. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Carvedilol	comprimido 3,125 mg comprimido 6,25 mg comprimido 12,5 mg comprimido 25 mg	Uso restrito em Insuficiência Cardíaca Congestiva.	D
Digoxina	comprimido 0,25 mg		D
Espironolactona	comprimido 25 mg comprimido 100 mg		D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
12.2. ANTI-ARRÍTIMICO			
Adenosina	solução injetável 3 mg/mL, amp 2 mL, IV		US
Amiodarona	comprimido 200 mg		D
Amiodarona	solução injetável 50 mg/mL, amp 3 mL, IV		US
Metoprolol	solução injetável 1 mg/mL, seringa pré-carregada 5 mL, IV		US
12.3. ANTI-HIPERTENSIVO			
12.3.1. DIURÉTICOS			
Clortalidona	comprimido 25mg	Tratamento da Hipertensão Arterial Resistente conforme protocolo Municipal.	D
Furosemida	comprimido 40 mg		D
Furosemida	solução injetável 10 mg/mL, amp 2 mL, IM/IV		US
Hidroclorotiazida	comprimido 25mg	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D
Manitol	solução a 20%, fr 250 mL IV e oral	Dispensação com solicitação exame médico.	US/D
12.3.2. BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS			
Atenolol	comprimido 25 mg comprimido 50 mg	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular a apresentação 25mg.	D
Propranolol	comprimido 40mg	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D
12.3.3. BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS DE AÇÃO CENTRAL			
Metildopa	comprimido 250 mg	Tratamento de hipertensão na gravidez. Tratamento combinado na Hipertensão Arterial de difícil controle.	D
12.3.4. BLOQUEADOR DE CANAIS DE CÁLCIO			
Anlodipino	comprimido 5 mg		D
12.3.5. VASODILATADOR			
Dinitrato de isossorbida	comprimido sublingual 5 mg		US

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Hidralazina 50mg	comprimido	Paciente renal crônico.	D
12.3.6. INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA			
Captopril	comprimido 25 mg	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D
Enalapril	comprimido 20mg		D
12.3.7. ANTAGONISTA DE RECEPTOR DE ANGIOTENSINA II			
Losartana	comprimido 50mg	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D
12.4. USADOS EM CHOQUE – ESTIMULANTES ADRENÉRGICOS – DROGAS VASOATIVAS			
Adrenalina	solução injetável 1 mg/mL, amp 1 mL, IM/IV/SC		US
Dobutamina	solução injetável 12,5 mg/ml, amp 20ml	Uso restrito em leito Covid-19.	US
Dopamina	solução injetável 5 mg/mL, amp 10 mL, IV		US
Efedrina, sulfato	solução injetável 50mg/mL, amp 1 mL, IV	Uso restrito ao Hospital DIA – Complexo Pró Saúde.	US
Norepinefrina, hemitartrato	solução injetável 2 mg/ml, amp 4 ml	Uso restrito Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e em leito Covid-19.	US
Vasopressina	solução injetável, 20 U/ml, amp 1 mL	Uso restrito em leito Covid-19.	US
12.5. HIPOLIPEMIANTES			
Sinvastatina	comprimido 20 mg comprimido 40 mg		D
12.6. CARDIOTÔNICO - GLICOSÍDEO CARDÍACO			
Deslanosídeo	solução injetável 0,2 mg/mL, amp 2 mL, IM/IV		US
12.7. ANTITROMBÓTICO			
Clopidogrel	comprimido 75 mg	Uso exclusivo na admissão de pacientes com síndrome coronariana aguda.	US

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
13. SISTEMA DIGESTIVO			
13.1. ANTIÁCIDOS			
Hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio	suspensão oral 60 + 40 mg/mL, fr 100 mL		D
13.2. ANTISECRETORES			
Omeprazol	comprimido ou cápsula 20mg	Uso restrito de acordo com protocolo.	D
Omeprazol	solução injetável 40 mg, fr amp, IV	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo.	US
13.3. ANTIEMÉTICOS E AGENTES PRÓCINÉTICOS			
Bromoprida	gotas orais 4 mg/mL, fr 20 mL		D
Bromoprida	solução injetável 5 mg/mLm amp 2 mL, IM/IV		US
Dimenidrinato + piridoxina	solução injetável 50 mg + 50 mg/mL, amp 1 mL, IM		US
Domperidona	suspensão oral 1 mg/mL, fr 100 mL	Uso pediátrico. Dispensação mediante prescrição por especialistas em gastro e pneumopediatria. Dispensação na Farmácia Municipal.	D
Metoclopramida	comprimido 10 mg		D
Metoclopramida	solução injetável 5 mg/mL, amp 2 mL, IM/IV		US
13.4. ANTIESPASMÓDICO			
Brometo de N-butilescolamina	comprimido 10 mg		D
Brometo de N-butilescolamina	solução injetável 20 mg/mL, amp 1 mL, IM/IV/SC		US
13.5. ANTIESPASMÓDICO ASSOCIADO COM ANALGÉSICO			
Brometo de N-butilescolamina + dipirona	solução injetável 4 mg + 500 mg/mL, amp 5 mL, IM/IV		US

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
13.6. LAXATIVO			
Bisacodil	comprimido 5 mg	Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.	D
Solução para clister com glicerina	solução 12%		US
Solução fosfatada para enema	frasco 130 mL	Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.	D
13.7. ANTIFLATULANTE			
Simeticona (dimeticona)	solução oral 75 mg/mL, fr 10 mL	Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.	D
14. SISTEMA ENDÓCRINO			
14.1. HORMÔNIOS TIREOIDIANOS			
Levotiroxina	comprimido 25 mcg, 50 mcg e 100 mcg		D
14.2. INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS			
Gliclazida	comprimido de ação prolongada 60 mg		D
Insulina humana NPH	suspensão injetável 100 UI/mL, frasco ampola 10 mL	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D
Insulina humana NPH	caneta aplicadora 3 mL	Pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1 e 2 , conforme protocolo do Ministério da Saúde.	D
Insulina humana regular	solução injetável 100 UI/mL, frasco ampola 10 mL	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D
Insulina humana regular	caneta aplicadora 3 mL	Pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1 e 2 , conforme protocolo do Ministério da Saúde.	D
Metformina	comprimido 500 mg comprimido 850 mg	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
15. SISTEMA REPRODUTOR - HORMÔNIOS SEXUAIS			
15.1. REPOSIÇÃO HORMONAL			
Estriol	creme vaginal 1 mg/g, bis 50 g		D
Estradiol	comprimido 1 mg, car 28 drágeas		D
Noretisterona + estradiol	comprimido 0,5 mg + 1 mg (cartela com 28 comprimidos)		D
15.2. INIBIDOR DA PROLACTINA			
Cabergolina	comprimido 0,5 mg	Uso restrito para lactantes HIV positivas e outros casos especiais. Receita em duas vias. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
15.3. CONTRACEPTIVOS HORMONAIS ORAIS			
Etinilestradiol + gestodeno	comprimido 20 mcg + 75 mcg		D
Etinilestradiol + levonorgestrel	comprimido 30 mcg + 150 mcg		D
Levonorgestrel	comprimido 0,75 mg	Uso restrito para contracepção de emergência.	D
Noretisterona	comprimido 0,35 mg		D
Progesterona	comprimido 100mg	Uso restrito ao protocolo de atenção pré-natal – obrigatório preenchimento de formulário próprio.	D
15.4. CONTRACEPTIVOS HORMONAIS INJETÁVEIS			
Medroxiprogesterona	solução injetável 150 mg/mL, amp 1 mL, IM		D
Noretisterona, enantato + estradiol, valerato	solução injetável 50 mg + 5 mg/mL, amp 1 mL, IM		D
15.5. CONTRACEPTIVO DE BARREIRA			
Preservativo masculino	unidade 52 mm		D
15.6. CONTRACEPTIVO DE USO TÓPICO			
DIU (dispositivo intrauterino)	unidade	Procedimento realizado em Unidade de Saúde.	US
16. TRATAMENTO/PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE			
Alendronato de sódio	comprimido 70 mg		D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Carbonato de cálcio + Colecalciferol (Vitamina D3)	comprimido 1250 mg (500mg de cálcio ionizável) + 400 UI		D
17. SISTEMA RESPIRATÓRIO			
17.1. ANTIASMÁTICOS			
Salbutamol	aerossol, 100 mcg /dose	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D
Terbutalino	solução injetável 0,5 mg/mL, amp 1 mL, IV (infusão)/SC		US
17.2. PREPARAÇÕES NASAIS			
Cloreto de sódio + cloreto benzalcônio 0,01%	solução nasal 0,9%, fr 30 mL		D
17.3. INALANTES			
Ipratrópio, brometo	gotas para inalação 0,25 mg/mL, fr 20 mL		US
Salbutamol	solução para inalação 5mg/mL, fr 10mL		US
18. SANGUE			
18.1 ANTIANÊMICOS			
Ácido fólico	comprimido 5 mg		D
Sulfato ferroso	comprimido 40 mg ferro elementar gotas orais 25 mg ferro elementar, fr 30 mL		D
18.2. ANTICOAGULANTES			
Enoxaparina	20 mg/0,2 mL seringa preenchida 0,2 mL, SC 40 mg/0,4 mL seringa preenchida 0,4 mL, SC	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo.	US

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Heparina	solução injetável 5.000 UI/0,2mL , amp 0,25 mL, SC		D
Varfarina sódica	comprimido 5 mg		D
18.3. ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS			
Ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg		D
18.4. ANTI-HEMORRÁGICO			
Ácido tranexâmico 50 mg/mL	solução injetável, ampola de 5 mL	Uso restrito no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)	US
Fitomenadiona (vit. K1)	solução injetável 10 mg/mL, amp 1 mL, IM/SC		US

19. SISTEMA NERVOSO

19.1. ANTICONVULSIVANTE

Ácido valpróico ou valproato de sódio	cápsula ou comprimido 288 mg (equivalente a 250 mg ácido valpróico) solução oral ou xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg ácido valpróico/mL), fr 100 mL	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Carbamazepina	comprimido 200 mg suspensão oral 100 mg/5 mL, fr 100 mL	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Fenitoína	comprimido 100 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Fenitoína	solução injetável 50 mg/mL, amp 5 mL, IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Fenobarbital	comprimido 100 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Fenobarbital	solução injetável 100 mg/mL, amp 2 mL, IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
19.2. ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZANTES DO HUMOR			
Ácido valpróico ou valproato de sódio	cápsula ou comprimido 288 mg (equivalente a 250 mg ácido valpróico) solução oral ou xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg ácido valpróico/mL), fr 100 mL	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Amitriptilina	comprimido 25 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Carbamazepina	comprimido 200 mg suspensão oral 100 mg/5 mL, fr 100 mL	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Carbonato de lítio	comprimido 300 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Clomipramina	comprimido 25 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Fluoxetina	cápsula ou comprimido 20 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Imipramina	comprimido 25 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Nortriptilina	comprimido 25 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Sertralina	cápsula ou comprimido 50 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
19.3. ANSIOLÍTICOS E HIPOSEDATIVOS			
Clonazepam	comprimido 2 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.	D
Diazepam	comprimido 5 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.	D
Diazepam	solução injetável 5 mg/mL, amp 2 mL, IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
Nitrazepam	comprimido 5 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.	D
<i>Valeriana officinalis</i>	comprimido 50mg		D
19.4. ESTIMULANTE SISTEMA NERVOSO CENTRAL			
Metilfenidato	comprimido 10 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita A (amarela) + receita de neurologista ou psiquiatra. Dispensação conforme protocolo municipal: crianças e adolescentes de 6 a 18 anos.	D
19.5. AUXILIAR DO TRATAMENTO DO ALCOOLISMO			
Naltrexona	comprimido 50 mg	Uso restrito aos pacientes do CAPS. Dispensação nas unidades de referência: UBS Central, UBS Jaguaré e ESF Eng. Schimdt. Receita branca em duas vias.	AE
19.6. ANTIPARKINSONIANOS			
Biperideno	comprimido 2mg	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Levodopa + benserazida	comprimido dispersível 100 mg +25 mg cápsula retard 100 mg+25 mg (HBS)		D
Levodopa + carbidopa	comprimido 250 mg + 25 mg		D
19.7. ANTIPSICÓTICOS			
Clorpromazina	comprimido 25 mg	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Clorpromazina	comprimido 100 mg	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Haloperidol	comprimido 5 mg	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Haloperidol	solução oral – 2 mg/mL frasco 20mL	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Haloperidol	solução injetável 5 mg/mL, ampola 1mL	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	US
Haloperidol, decanoato	solução injetável 50 mg/mL, ampola 1mL	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Levomepromazina 40 mg/mL	gotas orais, frasco 20 mL	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Risperidona	comprimido 1mg comprimido 2 mg	Transtorno de conduta infante juvenil. Dispensação de acordo com protocolo Municipal.	AE
Risperidona	solução oral, 1 mg/mL, frasco 30 mL	Transtorno de conduta infante juvenil. Dispensação de acordo com protocolo Municipal.	AE

20. SISTEMA OCULAR

20.1. ANESTÉSICO LOCAL

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Tetracaína + fenilefrina	colírio 10 mg + 1 mg/mL, fr 10 mL	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
20.2. CICATRIZANTE			
Retinol, acetato + aminoácidos + metionina + cloranfenicol	pomada oftalmológica 10.000 UI + 25 mg + 5 mg + 5 mg/g, bis 3,5 g		US
20.3. MIDRIÁTRICOS E CICLOPLÉGICOS			
Tropicamida	colírio 1%, fr 5 mL		US
20.4. AGENTE DIAGNÓSTICO			
Fluoresceína	colírio 1%, fr 5 mL		US
20.5. DESCONGESTIONANTES E ANTIALÉRGICOS			
Fenilefrina	colírio 100 mg/mL, fr 5 mL		US
20.6. ANTIMICROBIANO			
Gentamicina	colírio 5 mg/mL, fr 5 mL	Receita em duas vias.	D
21. PELE E MUCOSA			
21.1. CICATRIZANTES, EMOLIENTES E PROTETORES			
Oxido de zinco + Vitamina A + Vitamina D3	pomada, 66mg + 5.000UI + 100UI, bisnaga 45g	Restrito a criança e idoso – 1 bisnaga por mês.	D
21.2. ANTIMICROBIANOS			
Neomicina + bacitracina	pomada 5 mg + 250 UI/g, bis 10 g		D
Nistatina	suspensão oral 100.000 UI/mL fr 50 mL	Receita em duas vias.	D
Metronidazol	geleia vaginal 500 mg/5 g, bis 50 g	Receita em duas vias.	D
Miconazol	creme dermatológico 20 mg/g	Uso restrito para lactentes, crianças e dermatite fúngica da área das fraldas.	D
Miconazol	creme vaginal 2%, bis 80 g + 10 aplicadores, bis 28 g	Uso restrito pela via de aplicação vaginal.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
21.3. TRATAMENTO DE FERIDAS			
Aloe vera 10%, gel	pote 100 g	Uso restrito ao protocolo de curativos.	US
Papaína	gel 3% e 10%, pote 100 g	Uso restrito ao protocolo de curativos.	US
Sulfadiazina de prata	creme 1 %, pote 100 g	Uso restrito ao protocolo de curativos.	US
22. SISTEMA UROGENITAL			
22.1. HIPERPLASIA BENÍGNA DA PRÓSTATA			
22.1.1. ANTAGONISTA ALFA-ADRENÉRGICO			
Doxazosina	comprimido 4 mg		D
22.1.2. INIBIDOR DA 5-ALFA-REDUTASE			
Finasterida	comprimido 5 mg	Prescrição de urologista conforme protocolo.	D
23. FITOTERÁPICOS			
<i>Valeriana officinalis</i>	comprimido 50mg		D
24. HOMEOPÁTICOS			
Medicamentos homeopáticos: até 1000 CH	glóbulos ou gotas	Dispensação nas farmácias contratadas pelo município mediante prescrição de médicos cadastrados no DAF.	D
25. OUTROS PRODUTOS AUXILIARES NÃO TERAPÊUTICOS			
25.1. APLICAÇÃO DE INSULINA			
Agulha para caneta de insulina 4 mm	unidade	Restrito a pacientes em uso das canetas de insulina NPH e/ou regular.	D
Seringa para insulina	unidade	Uso restrito aos pacientes que utilizam insulina.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
25.2. AUTOMONITORAMENTO DE GLICEMIA			
Tiras para determinação de glicose	unidade	Automonitoramento de glicemia capilar: dispensação conforme protocolo vigente.	D
Lancetas + lancetador	unidade	Automonitoramento de glicemia capilar: dispensação conforme protocolo vigente.	D
Seringa para insulina	unidade	Uso restrito aos pacientes que utilizam insulina.	D
Glicosímetro	unidade	Automonitoramento de glicemia capilar: dispensação conforme protocolo vigente.	D
25.3. OXIGENOTERAPIA			
Água para injeção	solução estéril, fr 500 mL	Oxigenoterapia.	D
25.4. DIAGNÓSTICO SAÚDE DA MULHER			
Ácido acético	solução 2%, fr 200 mL		US
Shiller	solução 2%, fr 200 mL		US

**B - COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CESAF)
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE**

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
1. PROGRAMA DST/AIDS			
1.1. ANTIVIRAIS			
Aciclovir	comprimido 200 mg	Receita em duas vias.	D
Ganciclovir sódico	pó para solução injetável 546 mg (equivalente a 500 mg ganciclovir), fr amp	Uso restrito para tratamento de infecções causadas por citomegalovirus. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
1.2. ANTIRRETROVIRAIS			
1.2.1. INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA ANÁLOGA DE NUCLEOSÍDEO			
Abacavir	comprimido 300 mg solução oral 20 mg/mL, fr 240 mL	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Etravirina	comprimido 100 mg e 200mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Lamivudina	comprimido 150 mg, solução oral 10 mg/mL, fr 240 mL	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Zidovudina	cápsula retard 100 mg solução oral 10 mg/mL, fr 100 mL solução injetável 10 mg/mL, fr amp 20 mL	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Zidovudina + lamivudina	comprimido 300 mg + 150 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
1.2.2.INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA NÃO-ANÁLOGOS DE NUCLEOSÍDEO			
Efavirenz	comprimido 200 mg comprimido 600 mg solução oral 30 mg/mL, fr 180 mL	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Nevirapina	comprimido 200 mg suspensão oral 10 mg/mL, fr 240 mL	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
1.2.3.INIBIDORES DE PROTEASE			
Atazanavir	cápsula 300 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Darunavir	comprimido 600mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Lopinavir + ritonavir	comprimido 100 mg + 25 mg solução oral 80 mg + 20 mg/ mL, fr 160 mL	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Ritonavir	comprimido revestido 100mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
1.2.4.INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA ANÁLOGA DE NUCLEOTÍDEO			
Tenofovir	comprimido 300 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Tenofovir desoproxila + fumarato de entricitabina	comprimido revestido 300 mg + 200 mg	Prescrição e formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Tenofovir desoproxila + fumarato de lamivudina	comprimido 300 mg + 300 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Tenofovir disoproxil + fumarato de lamivudina + efavirenz	comprimido 300 mg + 300 mg + 600 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
1.2.5.INIBIDORES DE INTEGRASE			
Dolutegravir sódico	comprimido revestido 300 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Raltegravir	comprimido 400 mg e 100 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
1.3.OUTROS ANTIRRETROVIRAIS			
Maraviroque	comprimido 150 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
1.4.ANTI-INFECCIOSO/ANTI-FÚNGICO E ADJUVANTES			
Fluconazol	comprimido 150 mg	Restrito ao programa DST/AIDS. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Pentamidina	pó para solução injetável 300 mg, fr amp 10 mL	Restrito ao programa DST/AIDS. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
1.5.SISTEMA DIGESTIVO			
1.5.1ANTIDIARRÉICO SINTOMÁTICO			
Loperamida	comprimido 2 mg	Restrito ao programa DST/AIDS. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
2.PROGRAMA TUBERCULOSE			
Claritromicina	cápsula ou comprimido 500 mg	Receita em duas vias.	D
Estreptomicina	pó para injeção 1 g, fr amp	Receita em duas vias.	D
Etambutol	comprimido 400 mg	Receita em duas vias.	D
Isoniazida	comprimido 100 mg e 300mg	Receita em duas vias.	D
Isoniazida + rifampicina	comprimido 75 mg + 150 mg	Receita em duas vias.	D
Pirazinamida	comprimido 500 mg suspensão oral 30 mg/mL	Receita em duas vias.	D
Rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol	comprimido 150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	Receita em duas vias.	D
Rifampicina	comprimido 300 mg solução oral 20 mg/mL	Receita em duas vias.	D
Capreomicina	pó para solução injetável 1 g	Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Clofazimina	cápsula 50 mg e 100 mg	Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Cloridrato de moxifloxacino	comprimido 400 mg	Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Cloridrato de piridoxina	comprimido 50 mg	Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Linezolida	comprimido 600 mg	Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Rifabutina	cápsula 150 mg	Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Sulfato de amicacina	solução injetável 250 mg/mL, ampola 2 mL	Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Terizidona	cápsula 250 mg	Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
3.PROGRAMA HANSENÍASE			
3.1.TRATAMENTO			
Ofloxacino	comprimido 400 mg	Receita em duas vias.	AE
Talidomida	comprimido 100 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C3 (Portaria SVS 344/98). Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis e na Farmácia Municipal. Notificação de receita de talidomida + receita + termo de consentimento.	AE
Tratamento multibacilar – clofazimina + clofazimina + rifampicina + dapsona	comprimido 50 mg + 100 mg + 300 mg + 100 mg	Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	D
Tratamento paucibacilar – dapsona + rifampicina	comprimido 100 mg + 300 mg	Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	D
Clofazimina	cápsula 100 mg	Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Rifampicina	suspensão oral 20 mg/mL (2%) cápsula 300 mg	Receita em duas vias.	D
3.2. COADJUVANTES			
Hipromelose + dextrano	colírio 3 mg + 1 mg/mL, fr 15 mL	Uso restrito no tratamento da hanseníase. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Hidratante com uréia	creme 100mg/g, pote 100 g	Uso restrito no tratamento da hanseníase. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Filtro protetor solar	fator proteção 45, fr 100 mL	Uso restrito no tratamento da hanseníase e lúpus. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
4.PROGRAMA DE TABAGISMO			
4.1.TRATAMENTO			
Cloridrato de bupropiona	comprimido de liberação prolongada 150 mg	Uso restrito ao programa de tabagismo. Disponível nas unidades credenciadas no programa. Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita em duas vias.	D
Nicotina	adesivo transdérmico 7 mg , 14 mg e 21 mg goma de mascar 2 mg pastilha 2 mg	Uso restrito ao programa de tabagismo. Disponível nas unidades credenciadas no programa.	D

5. TOXOPLASMOSE			
5.1 TRATAMENTO			
Espiramicina	comprimido 500 mg	Protocolo de Toxoplasmose. Receita em duas vias + Notificação SINAN + exames	D
Pirimetamina	comprimido 25 mg	Protocolo de Toxoplasmose. Receita em duas vias + Notificação SINAN + exames Crianças até um ano: manipulação conforme Portaria SMS nº 02 de 26 de janeiro de 2015.	D
Sulfadiazina	comprimido 500 mg	Protocolo de Toxoplasmose. Receita em duas vias + Notificação SINAN + exames. Crianças até um ano: manipulação conforme Portaria SMS nº 02 de 26 de janeiro de 2015.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
6. INFLUENZA			
6.1. TRATAMENTO			
Fosfato de oseltamivir	cápsula 30 mg, 45 mg e 75 mg	Receita em duas vias.	D
Zanamivir	pó para inalação oral 5 mg	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica.	AE
7. HEPATITES VIRAIS			
7.1. TRATAMENTO			
Alfapeginterferona 2A	seringa preenchida 180 mcg	Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Entecavir	comprimido 0,5 mg	Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Ribavirina	cápsula 250 mg	Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Tenofovir	comprimido 300 mg	Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Sofosbuvir	comprimido 400 mg	Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Sofosbuvir + Ledispavir	comprimido 400 mg + 90 mg	Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Sofosbuvir + Velpatasvir	comprimido 400 mg + 100 mg	Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Glecaprevir + Pibrentasvir	comprimido 100 mg + 40 mg	Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
8. ESQUISTOSSOMOSE			
8.1. TRATAMENTO			
Oxamniquina	suspensão oral 50 mg/mL	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica.	D
Praziquantel	comprimido 600 mg	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica.	D
9. DOENÇA DE CHAGAS			
9.1. TRATAMENTO			
Benznidazol	comprimido 12,5 mg e 100 mg	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica.	D
10. BRUCELOSE			
10.1. TRATAMENTO			
Rifampicina	suspensão oral 20 mg/mL cápsula 300 mg	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica. Receita em duas vias.	D
Sulfato de estreptomicina	pó para solução injetável 1g	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica. Receita em duas vias.	D
11. DIFTERIA			
11.1. TRATAMENTO			
Cloranfenicol	suspensão oral 25 mg/mL	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica.	D
12. FILARIOSE			
12.1. TRATAMENTO			
Citrato de dietilcarbamazina	comprimido 50 mg	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
13. MENINGITES			
13.1. TRATAMENTO			
Rifampicina	suspensão oral 20 mg/mL cápsula 300 mg	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica. Receita em duas vias.	D
14. LEISHIMANIOSE			
14.1 TRATAMENTO			
Anfotericina B (desoxicolato ou lipossomal)	pó para solução injetável 50 mg	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica – uso hospitalar.	-
Antimoniato de meglumina	solução injetável 300 mg/mL	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica – uso hospitalar.	-
Pentamidina	solução injetável 300 mg/mL	Restrito ao programa DST/AIDS. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Pentoxifilina	comprimido 400 mg	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica.	AE
15. MICOSES SISTÊMICAS			
15.1. TRATAMENTO			
Anfotericina B (complexo lipídico)	suspensão injetável 5 mg/mL	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica – uso hospitalar.	-
Fluconazol	solução injetável 2 mg/mL	Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica – uso hospitalar.	-
Itraconazol	cápsula 100 mg	Receita em duas vias.	D

II – CLASSIFICAÇÃO – ORDEM ALFABÉTICA
MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Abacavir 20 mg/mL	solução oral, frasco 240 mL	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Abacavir, sulfato 300 mg	comprimido	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Acetato de retinol 10.000 ui/g, aminoácidos 25 mg/g, metionina 5 mg/g e cloranfenicol 5 mg/g	pomada - bisnaga 3,5 g	US	
Aciclovir 200 mg	comprimido	D	Receita em duas vias.
Ácido acético 2%	solução tópica, frasco 200 mL	US	
Ácido acetilsalicílico 100 mg	comprimido	D	
Ácido fólico 5 mg	comprimido	D	
Ácido folínico 15 mg	comprimido	D	Protocolo de Toxoplasmose. Crianças até um ano: manipulação conforme Portaria SMS nº 02 de 26 de janeiro de 2015.
Ácido tranexâmico 50 mg/mL	Solução injetável, ampola 5 mL	US	Uso restrito no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Ácido tricloroacético 80%	solução tópica, frasco 20 mL	US	
Ácido Valpróico ou Valproato de Sódio 288 mg (equivalente a 250 mg de ácido valpróico)	cápsula ou comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Ácido Valpróico ou Valproato de Sódio 250 mg/5 mL	xarope, frasco 100 mL	D	
Adenosina 3 mg/mL	solução injetável 3 mg/mL, ampola 2 mL, IV	US	
Adrenalina 1 mg/mL (epinefrina)	solução injetável, ampola 1 mL, IM/IV/SC	US	
Água Oxigenada 10 vol.	solução, frasco 1000 mL	US	

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Água para injeção	ampola 10 mL	US	
Água para injeção	frasco 500 mL	D	Oxigenoterapia.
Agulha para caneta de insulina 4 mm	unidade	D	Restrito a pacientes em uso das canetas de insulina NPH e/ou regular.
Albendazol 400 mg	comprimido mastigável	D	
Albendazol 40 mg/mL	suspensão oral, frasco 10 mL	D	
Álcool etílico 70%	solução, frasco 1000 mL	US	Antissepsia da pele.
Alendronato de sódio 70 mg	comprimido	D	
Alfapeginterferona 2A 180 mcg	seringa preenchida	D	CESAF - Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Aloe vera 10%, gel	pote 100g	US	Uso restrito ao protocolo de curativos.
Alopurinol 100 mg e 300 mg	comprimido	D	
Amiodarona 200 mg	comprimido	D	
Amiodarona 50 mg/mL	solução injetável, ampola 3 mL, IV	US	
Amitriptilina 25 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Amoxicilina 500 mg	cápsula ou comprimido	D	Receita em duas vias.
Amoxicilina 250 mg/5 mL	suspensão oral, frasco 150 mL e 60 mL	D	Receita em duas vias.
Amoxicilina 500 mg + ácido clavulânico 125 mg	comprimido	D	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio de acordo com legislação municipal vigente. Receita em duas vias.
Amoxicilina 250 mg + ácido clavulânico 62,5 mg	pó para suspensão oral, frasco 75 mL	D	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio de acordo com legislação municipal vigente. Receita em duas vias.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Anfotericina B (desoxicolato ou lipossomal) 50 mg	pó para solução injetável	-	CESAF - Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica – uso hospitalar.
Anfotericina B (complexo lipídico) 5 mg/mL	suspensão injetável	-	CESAF - Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica – uso hospitalar.
Anlodipino 5 mg	comprimido	D	
Antimoniato de meglumina 300 mg/mL	solução injetável	-	CESAF - Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica – uso hospitalar.
Atazanavir 300 mg	cápsula	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Atenolol 25 mg e 50 mg	comprimido	D	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular, apresentação 25mg.
Atracurio, besilato 10mg/ml	ampola 5ml	US	Uso restrito em leito Covid-19.
Atropina 0,50 mg/mL	solução injetável, ampola 1 mL, IM/IV/SC	US	
Azitromicina 500 mg	comprimido	D	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, conforme legislação municipal vigente. Nos casos de IST é necessária a notificação. Receita em duas vias.
Azitromicina 40mg/mL	pó para suspensão oral	D	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, conforme legislação municipal vigente. Receita em duas vias.
Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI e 1.200.000 UI	pó para suspensão injetável frasco ampola, IM	D	Receita em duas vias.
Benzilpenicilina procaína 300.000UI + potássica 100.000 UI	pó para suspensão injetável frasco ampola, IM	D	Receita em duas vias.
Bicarbonato de sódio 1 mEq/mL (8,4%)	solução injetável, frasco 250 mL, IV	US	

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Benznidazol 12,5 mg e 100 mg	comprimido	D	CESAF - Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica.
Betametasona , acetato 3 mg + betametasona, fosfato dissódico 3 mg/mL	solução injetável, amp 1 mL, IM	D	Uso restrito para gestantes em situação de risco.
Biperideno 2 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Bisacodil 5 mg	comprimido	D	Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.
Brometo de n-butilescopolamina 10 mg	comprimido	D	
Brometo de n-butilescopolamina 20 mg/mL	solução injetável, ampola 1 mL, IM/IV/SC	US	
Brometo de n-b-escopolamina 4 mg + dipirona 500 mg	solução injetável, ampola 5 mL, IM/IV	US	
Bromoprida 4 mg/mL	gotas orais, frasco 20 mL	D	
Bromoprida 10 mg/2 mL	solução injetável, ampola 2 mL, IM/EV	US	
Bupivacaína, cloridrato 5 mg/mL	solução injetável, frasco ampola 20 mL	US	Uso restrito nos procedimentos de prosectomia e cirurgia plástica no Núcleo Diagnóstico Hospital Dia – Complexo Pró Saúde.
Bupropiona, cloridrato 150 mg	comprimido de liberação prolongada	D	CESAF - Uso restrito ao programa de tabagismo. Disponível nas unidades credenciadas no programa. Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita em duas vias
Cabergolina 0,5 mg	comprimido	AE	Uso restrito para lactantes HIV positivas e outros casos especiais. Receita em duas vias. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Capreomicina 1 g	pó para solução injetável	AE	CESAF - Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Captopril 25 mg	comprimido	D	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.
Carbamazepina 100 mg/5 mL	suspensão oral, frasco 100 mL	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Carbamazepina 200 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Carbonato de cálcio 1250mg (equivalente a 500mg de cálcio ionizável) + Colecalciferol (Vitamina D3) 400 UI	comprimido	D	
Carbonato de lítio 300 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Carvão vegetal ativado	pó para uso oral, sachê 10 g	US	
Carvedilol 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg e 25 mg	comprimido	D	Uso restrito em Insuficiência Cardíaca Congestiva.
Cefalexina 500 mg	cápsula ou comprimido	D	Receita em duas vias.
Cefalexina 250 mg/5 mL	suspensão oral, frasco 100 mL	D	Receita em duas vias
Ceftriaxona 1g	pó para solução injetável, frasco ampola, IV	D	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, de acordo com protocolo municipal vigente. Nos casos de IST é necessária a notificação SINAN. Receita em duas vias.
Cinarizina 75 mg	comprimido	D	
Ciprofloxacino 500 mg	cápsula ou comprimido	D	Receita em duas vias
Citrato de dietilcarbamazina 50 mg	comprimido	D	CESAF - Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Clarithromicina 500 mg	cápsula ou comprimido	D	Uso restrito para tratamento de micobactérias atípicas. Uso no tratamento do <i>H. pilory</i> . Receita em duas vias.
Clindamicina 300 mg	cápsula	D	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio conforme legislação municipal vigente. Uso em IST é necessária à notificação. Prescrição em duas vias.
Clindamicina 150mg/mL	solução injetável 150mg/mL, ampola 4mL, IM/IV	US	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo.
Clofazimina 100 mg	cápsula	AE	CESAF - Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Clomipramina 25 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Clonazepam 2 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.
Clopidogrel 75 mg	comprimido	US	Uso exclusivo na admissão de pacientes com síndrome coronariana aguda.
Cloranfenicol 25 mg/mL	suspensão oral	D	CESAF - Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica.
Cloreto de potássio 6%	xarope, frasco 100 mL	D	
Cloreto de potássio 19,1%	solução injetável, ampola 10 mL, IV	US	
Cloreto de sódio 20 % (3,4 mEq/mL)	solução injetável, ampola 10 mL, IV	US	
Clorexidine sol. aquosa 1%	frasco 1 L	US	Uso restrito conforme POP curativos.
Clorexidine sol. degermante 2%	frasco 1 L	US	Uso restrito conforme POP curativos.
Clorexidine sol. alcoólica 0,5%	frasco 1 L	US	Uso restrito conforme POP curativos.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Cloridrato de moxifloxacino 400 mg	comprimido	AE	CESAF - Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Cloridrato de piridoxina 50 mg	comprimido	AE	CESAF - Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Clorpromazina 25 mg, 100 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Clortalidona 25 mg	comprimido	D	Tratamento da Hipertensão Arterial Resistente conforme protocolo Municipal.
Codeína 30 mg	comprimido	US	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.
Creme hidratante - Uréia 100 mg/g	creme pote 100 g	AE	CESAF - Uso restrito no tratamento da hanseníase. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Darunavir 600 mg	comprimido	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Deslanosídeo 0,2 mg/mL	solução injetável, ampola 2 mL, IM/IV	US	
Dexametasona 0,1%	creme bisnaga 10 g	D	
Dexametasona 2 mg/mL	solução injetável 2 mg/mL, ampola 1 mL, IM/IV	US	
Dexametasona 4 mg/mL	solução injetável 4 mg/mL, ampola 2,5 mL, IM/IV	US	
Dexmedetomidina, cloridrato 100 mcg/ml	ampola 2ml	US	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso restrito em leito Covid-19.
Dextrocetamina 50mg/ml	frasco 10ml	US	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso restrito em leito Covid-19.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Diazepam 5 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.
Diazepam 5 mg/mL	solução injetável, ampola 2 mL, IM/IV	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.
Diclofenaco 50 mg	comprimido	D	Uso não recomendado para crianças menores 12 anos.
Diclofenaco 25 mg/mL	solução injetável, ampola 3 mL, IM	US	
Didanosina 10 mg/mL (DDI)	pó para solução oral, frasco 4 g	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Digoxina 0,25 mg	comprimido	D	
Dimenidrinato 50 mg + piridoxina 50 mg/mL	solução injetável, ampola 1 mL, IM	US	
Dinitrato de isossorbida 5 mg	comprimido sublingual	US	
Dipirona 500 mg/mL	gotas orais, frasco 10 mL	D	
Dipirona 500 mg/mL	solução injetável 500 mg/mL, ampola 2 mL, IM/IV	US	
DIU (dispositivo intrauterino)	unidade	US	Procedimento realizado em Unidade de Saúde.
Dobutamina 12,5mg/ml	ampola 20ml	US	Uso restrito em leito Covid-19.
Dolutegravir sódico 50 mg	comprimido	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Domperidona 1 mg/mL	suspensão oral, frasco 100 mL	D	Uso pediátrico. Dispensação mediante prescrição por especialistas em gastro e pneumopediatria. Dispensação na Farmácia Municipal.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Dopamina 5 mg/mL	solução injetável, ampola 10 mL, IV	US	
Doxazosina 4 mg	comprimido	D	
Doxiciclina 100 mg	comprimido	D	Receita em duas vias.
Efavirenz 200 mg, 600 mg	comprimido	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Efavirenz 30 mg/mL	solução oral, frasco 180 mL	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Efedrina, sulfato 50 mg/mL	solução injetável, ampola 1 mL	US	Uso restrito ao Hospital DIA – Complexo Pró Saúde.
Enalapril 20mg	comprimido	D	
Enoxaparina 20mg/0,2mL	seringa preenchida 0,2 mL, SC	US	Restrito a protocolos específicos das UPAs.
Enoxaparina 40mg/0,4mL	seringa preenchida 0,4 mL, SC	US	Restrito a protocolos específicos das UPAs.
Entecavir 0,5 mg	comprimido	D	CESAF - Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Espiramicina 1,5 mui	comprimido	D	CESAF - Protocolo de Toxoplasmose. Receita em duas vias + Notificação SINAN + exames.
Espironolactona 25 mg, 100 mg	comprimido	D	
Estradiol 1 mg	cartela com 28 comprimidos	D	
Estreptomicina 1g	pó para injeção, frasco ampola	D	CESAF - Receita em duas vias.
Estriol 1mg/g	creme vaginal, bisnaga 50 g	D	
Etambutol 400 mg	comprimido	D	CESAF - Receita em duas vias.
Etinilestradiol 20 mcg + gestodeno 75 mcg	cartela com 21 comprimidos	D	

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Etinilestradiol 30 mcg + levonorgestrel 150 mcg	cartela com 21 comprimidos	D	
Etomidato 2 mg/mL	solução injetável, ampola 10 mL	US	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Etravirina 100 mg, 200mg	comprimido	AE	CEAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Fenilefrina 100 mg/mL	colírio, frasco 5 mL	US	
Fenitoína 50 mg/mL	solução injetável, ampola 5 mL, IM/IV	US	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.
Fenitoína 100 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Fenobarbital 100 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Fenobarbital 100 mg/mL	solução injetável, ampola 2 mL, IM/IV	US	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.
Fenobarbital 40 mg/mL	gotas orais, frasco 20 mL	D	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Fentanila 0,05 mg/mL , citrato	solução injetável, ampola 2 mL IM/IV	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Uso restrito na UPA, SAMU e Complexo Pró Saúde. Receita branca.
Fentanila 0,05 mg/mL , citrato	solução injetável, ampola 10 mL IM/IV	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso no Complexo Pró Saúde – Hospital Dia e leito Covid-19.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Filtro protetor solar Fator 45	loção ou gel, frasco 100 mL	AE	CESAF - Uso restrito no tratamento da hanseníase e lúpus. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Finasterida 5 mg	comprimido	D	Prescrição de urologista conforme protocolo.
Fitomenadiona (vit. K1) 10 mg/mL	solução injetável im, ampola 1 mL, im/sc	US	
Fluconazol 150 mg	comprimido	AE	CESAF - Restrito ao programa DST/AIDS. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Fluconazol 2 mg/mL	solução injetável	-	CESAF - Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica – uso hospitalar.
Flumazenil 0,1 mg/mL	solução injetável 0,1 mg/mL, ampola 5 mL, IV	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98).
Fluoresceína 10 mg/mL	colírio, frasco 3 mL	US	
Fluoxetina 20 mg, cloridrato	cápsula ou comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Furosemida 10 mg/mL	solução injetável, ampola 2 mL, IM/IV	US	
Furosemida 40 mg	Comprimido	D	
Ganciclovir sódico 546 mg (equivalente a 500 mg ganciclovir)	pó para solução injetável, frasco ampola	AE	CESAF - Uso restrito para tratamento de infecções causadas por citomegalovírus. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Gentamicina 5 mg/mL	colírio, frasco 5 mL	D	Receita em duas vias.
Glecaprevir + Pibrentasvir	comprimido 100 mg + 40 mg	D	CESAF - Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Gliclazida 60 mg	comprimido ação prolongada	D	
Gliconato de cálcio 10 % (0,45 mEq/mL)	solução injetável , ampola 10 mL, IV	US	
Glicose 25% e 50%	solução injetável, ampola 10 mL, IV	US	
Glicosímetro	unidade	D	Automonitoramento de glicemia capilar: dispensação conforme protocolo vigente.
Haloperidol, decanoato 50 mg/mL	solução injetável, ampola 1 mL	D	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Haloperidol 5 mg/mL	solução injetável, ampola 1 mL	US	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita braca em duas vias.
Haloperidol 5 mg	Comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Haloperidol 2 mg/mL	solução oral, frasco 20 mL	D	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca, duas vias.
Heparina 5.000 ui/0,25mL	ampola 0,2 mL, SC	D	
Hidralazina 50mg	comprimido	D	Paciente renal crônico.
Hidroclorotiazida 25 mg	comprimido	D	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.
Hidrocortisona 100 mg e 500 mg	pó para solução injetável, frasco ampola, IM/IV	US	
Hidróxido de alumínio 60 mg + hidróxido de magnésio 40 mg/mL	suspensão oral , frasco 150 mL	D	
Hipoclorito de sódio 2,5%	solução, frasco 50 mL	D	
Hipromelose 3 mg + dextrano 1 mg/mL	colírio, frasco 15 mL	AE	CESAF - Uso restrito no tratamento da hanseníase. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Ibuprofeno 50 mg/mL	solução oral, frasco 30 mL	D	
Ibuprofeno 600 mg	comprimido	US	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo da dor.
Imipramina 25 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca, duas vias.
Insulina humana NPH 100 UI/mL	suspensão injetável, frasco 10 mL	D	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.
Insulina humana NPH 100 UI/mL	caneta aplicadora 3 mL	D	Pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1 e 2 , conforme protocolo do Ministério da Saúde.
Insulina humana regular 100 UI/mL	solução injetável, frasco 10 mL	D	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.
Insulina humana regular 100 UI/mL	caneta aplicadora 3 mL	D	Pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1 e 2 , conforme protocolo do Ministério da Saúde.
Ipratrópio, brometo 0,25 mg/mL	gotas para inalação, frasco 20 mL	US	
Isoniazida 100 mg e 300 mg	comprimido	D	CESAF - Receita em duas vias.
Isoniazida 75 mg + rifampicina 150 mg	comprimido	D	CESAF - Receita em duas vias.
Itraconazol 100 mg	cápsula	D	Receita em duas vias.
Ivermectina 6 mg	comprimido	D	
Lamivudina 10 mg/mL	solução oral, frasco 240 mL	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Lamivudina 150 mg + zidovudina 300 mg	comprimido	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Lamivudina 150 mg	comprimido	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Lancetas + lancetador	unidade	D	Automonitoramento de glicemia capilar: dispensação conforme protocolo vigente.
Levodopa 100 mg + benserazida 25 mg	comprimido dispersível	D	
Levodopa 100 mg + benserazida 25 mg - (HBS) liberação lenta	cápsula retard	D	
Levodopa 250 mg + carbidopa 25 mg	comprimido	D	
Levofloxacino 250 mg e 500 mg	comprimido	D	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio. Receita em duas vias.
Levomepromazina 40 mg/mL	gotas orais, frasco 20 mL	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Levonorgestrel 0,75 mg	cartela com 2 comprimidos	D	Uso restrito para contracepção de emergência.
Levotiroxina 25 mcg, 50mcg, 100 mcg	comprimido	D	
Lidocaína 10%	spray, frasco 50 mL	US	Uso restrito ao Hospital DIA.
Lidocaína 2%	gel, bisnaga 30 g	US/D	Seguir protocolo de cateterismo vesical intermitente.
Lidocaína 2%	solução injetável, tubete 1.8 mL	US	
Lidocaína 2%	solução injetável, frasco 20 mL	US	
Lidocaína 20 mg + epinefrina 0,005 mg/mL	solução injetável, frasco 20 mL	US	
Lidocaína 20 mg + epinefrina 1/100.000/mL	solução injetável, tubete 1,8 mL	US	Uso odontológico.
Linezolida 600 mg	comprimido	AE	CESAF - Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Loperamida 2 mg	comprimido	AE	CESAF - Restrito ao programa DST/AIDS. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Lopinavir 80 mg + ritonavir 20 mg/mL	solução oral, frasco 160 mL	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Lopinavir 100 mg + ritonavir 25 mg	comprimido	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Loratadina 1mg/mL	xarope, frasco 100 mL	D	
Loratadina 10 mg	comprimido	D	
Losartana 50mg	comprimido	D	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.
Manitol 20%	solução, frasco 250 mL, iv e oral	US/D	Dispensação com solicitação exame médico.
Maraviroque 150 mg	comprimido	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Medicamentos homeopáticos até 1000 CH	glóbulos ou gotas, frasco 20 mL	D	Dispensação nas farmácias contratadas pelo município mediante prescrição de médicos cadastrados na DAF.
Medroxiprogesterona 150 mg/mL	injetável, ampola 1 mL, IM	D	
Meropeném 1g	frasco ampola	US	Uso restrito em leito Covid-19.
Metformina 500 mg e 850 mg	comprimido	D	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.
Metildopa 250 mg	comprimido	D	Tratamento de hipertensão na gravidez. Tratamento combinado na Hipertensão Arterial de difícil controle.
Metilfenidato 10 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita A (amarela) + receita de neurologista ou psiquiatra. Dispensação conforme protocolo municipal: crianças e adolescentes de 6 a 18 anos.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Metoclopramida 5 mg/mL	solução injetável, amp 2 mL, IM/IV	US	
Metoclopramida 10 mg	comprimido	D	
Metoprolol 1mg/mL	solução injetável, amp 5 mL, IV	US	
Metronidazol 40 mg/mL	suspensão oral, frasco 80 mL	D	Receita em duas vias.
Metronidazol 250 mg	comprimido	D	Receita em duas vias.
Metronidazol 500 mg/5 g	geléia, bisnaga 50 g (com 10 aplicadores)	D	Receita em duas vias.
Metronidazol 5mg/mL	solução injetável 5mg/mL, frasco 100mL, IV	US	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo.
Miconazol 20 mg/g	creme dermatológico, bisnaga 28g	D	Uso restrito para lactentes, crianças e dermatite fúngica da área das fraldas.
Miconazol 2%	creme vaginal, bisnaga 80 g (com 10 aplicadores)	D	Uso restrito pela via de aplicação vaginal.
Midazolam 5mg/mL	solução injetável 5 mg/mL, ampola 3 mL, uso IM/IV	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.
Midazolam 5mg/ml	ampola 10 ml	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso restrito em leito Covid-19.
Morfina 1 mg/mL	solução injetável 1 mg/mL, ampola 2 mL, IM/IV	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.
Morfina 10 mg/mL	solução injetável 10 mg/mL, ampola 1 mL, IM/IV	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.
Naloxona, cloridrato 0,4 mg/mL	Ampola 1 ml	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso no Complexo Pró Saúde – Hospital Dia e leito Covid-19.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Naltrexona 50 mg	comprimido	D	Uso restrito aos pacientes do CAPS. Dispensação nas unidades de referência: UBS Central, UBS Jaguaré e ESF Eng. Schimdt. Receita branca em duas vias.
Neomicina 5 mg + bacitracina 250 UI/g	pomada, bisnaga 10 g	D	
Nevirapina 10 mg/mL	solução oral, frasco 240 mL	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Nevirapina 200 mg	Comprimido	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Nicotina	adesivo transdérmico 7 mg , 14 mg e 21 mg goma de mascar 2 mg pastilha 2 mg	D	CESAF - Uso restrito ao programa de tabagismo. Disponível nas unidades credenciadas no programa.
Nistatina 100.000 UI/mL	suspensão oral, frasco 50 mL	D	Receita em duas vias.
Nitrazepam 5 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.
Nitrofurantoína 100 mg	cápsula	D	Receita em duas vias.
Norepinefrina, hemitartrato 2mg/ml	ampola 4 ml	US	Uso restrito Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Leito Covid-19.
Noretisterona 0,35 mg	cartela com 35 comprimidos	D	
Noretisterona 0,5 mg + estradiol 1 mg	cartela com 28 comprimidos	D	
Noretisterona 50 mg + estradiol 5 mg	solução injetável, seringa preenchida 1 mL, IM	D	
Nortriptilina 25 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca, duas vias.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Ofloxacino 400 mg	comprimido	D	CESAF - Receita em duas vias.
Omeprazol 20mg	comprimido ou cápsula	D	Uso restrito de acordo com protocolo.
Omeprazol 40mg	pó líófilo, frasco amp, IV	US	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo.
Oseltamivir 30 mg, 45 mg e 75 mg	comprimido	D	CESAF - Receita em duas vias.
Oxamniquina 50 mg/mL	suspensão oral	D	CESAF - Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica.
Oxido de zinco 66 mg + Vitamina A 5.000 UI + Vitamina D3 100 UI	bisnaga 45 g	D	Restrito a crianças e idosos – 1 tubo por mês.
Pancurônio 2mg/ml	ampola 2 ml	US	Uso restrito em leito Covid-19.
Papaína 3% e 10%	gel, pote 100 g	US	Uso restrito ao protocolo de curativos.
Paracetamol 200 mg/mL	gotas orais, frasco 15 mL	D	
Paracetamol 500 mg	Comprimido	D	
Pentamidina 300 mg/mL	pó para solução injetável, frasco amp 10 mL	AE	CESAF - Restrito ao programa DST/AIDS. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Permetrina 1%	loção, frasco 60 mL	D	
Permetrina 5%	loção, frasco 60 mL	D	
Pirazinamida 30 mg/mL	suspensão oral, fr 150 mL	D	CESAF - Receita em duas vias.
Piperacilina 4 g + Tazobactam 0,5 g	frasco ampola	US	Uso restrito em leito Covid-19.
Pirazinamida 500 mg	comprimido	D	CESAF - Receita em duas vias.
Pirimetamina 25 mg	comprimido	D	CESAF - Protocolo de Toxoplasmose. Receita em duas vias + Notificação SINAN + exames. Crianças até um ano: manipulação conforme Portaria SMS nº 02 de 26 de janeiro de 2015.
Praziquantel 600 mg	comprimido	D	CESAF - Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Prednisolona 3 mg/mL	solução oral , frasco 100 mL	D	Uso restrito crianças e pessoas com dificuldade de deglutição.
Prednisona 5 mg e 20 mg	comprimido	D	
Preservativo masculino 52 mm	unidade	D	
Prilocaína 30 mg + felipressina 0,03 UI/mL	solução injetável, tubete 1,8 mL	US	Uso odontológico.
Progesterona 100mg	comprimido	D	Uso restrito ao protocolo de atenção pré-natal – obrigatório preenchimento de formulário próprio.
Prometazina 25 mg	comprimido	D	
Prometazina 25 mg/mL	solução injetável 25 mg/mL, ampola 2 mL, IM	US	
Propofol 10mg/mL	ampola 20 mL	US	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso no Complexo Pró Saúde – Hospital Dia e Leito Covid-19.
Propranolol 40mg	comprimido	D	Também disponível no Programa Farmácia Popular
Raltegravir 400 mg e 100 mg	comprimido	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Ribavirina 250 mg	cápsula	AE	CESAF - Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Rifabutina 150 mg	cápsula	AE	CESAF - Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Rifampicina 20 mg/mL	suspensão oral, frasco 50 mL	D	CESAF - Receita em duas vias.
Rifampicina 300 mg	comprimido	D	CESAF - Receita em duas vias.
Rifampicina 150 mg + isoniazida 75 mg + pirazinamida 400 mg + etambutol 275 mg	comprimido	D	CESAF - Receita em duas vias.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Risperidona 1 mg, 2 mg	comprimido	AE	Transtorno de conduta infante juvenil. Dispensação de acordo com protocolo Municipal.
Risperidona 1mg/mL, solução oral	frasco 30 mL	AE	Transtorno de conduta infante juvenil. Dispensação de acordo com protocolo Municipal.
Ritonavir 100 mg	comprimido revestido	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Rocurônio 10mg/ml	ampola 5 ml	US	Uso restrito em leito Covid-19.
Sais para reidratação oral - cloreto sódio 3,5g, glicose 20g citrato de sódio 2,9g cloreto de potássio 1,5g.	pó para preparo de solução oral, envelope 27.9 g	D	
Salbutamol 100 mcg/dose	aerossol, frasco 50 doses	D	Também disponível no Programa Farmácia Popular
Salbutamol 5mg/mL	gotas para inalação, frasco 10 mL	US	
Seringa para insulina	unidade	D	Uso restrito aos pacientes que utilizam insulina.
Sertralina 50 mg	cápsula ou comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Simeticona 75 mg/mL (dimeticona)	gotas orais, frasco 10 mL	D	Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.
Shiller a 2%	solução, frasco 200 mL	US	
Sinvastatina 20 mg e 40 mg	comprimido	D	
Sofosbuvir	comprimido 400 mg		CESAF - Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Sofosbuvir + Ledispavir	comprimido 400 mg + 90 mg		CESAF - Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Sofosbuvir + Velpatasvir	comprimido 400 mg + 100 mg		CESAF - Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Solução fisiológica nasal (cloreto de sódio 0,9% + cloreto benzalcônio 0,01%)	frasco 30 mL	D	
Solução fosfatada para enema	frasco 130 mL	D	Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.
Solução para clister com glicerina 12%	frasco 500 mL	US	
Solução ringer + lactato - cloreto 109 mEq, sódio 130 mEq, potássio 4 mEq, cálcio 2,7 mEq, lactato 27,7 mEq/L	solução injetável, frasco 500 mL, IV	US	
Soro Fisiológico – cloreto de sódio 0,9%	solução injetável, ampola 10 mL, frasco 100 mL, 250 mL, 500 mL e 1.000 mL, IV	US	
Soro Glicosado – glicose 5%	solução injetável, frasco 250 mL e 500 mL, IV	US	
Sulfato de amicacina 250 mg/mL	solução injetável, ampola 2 mL	AE	CESAF - Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Sulfadiazina 500 mg	comprimido	D	CESAF - Protocolo de Toxoplasmose. Receita em duas vias + Notificação SINAN + exames. Crianças até um ano: manipulação conforme Portaria SMS nº 02 de 26 de janeiro de 2015.
Sulfadiazina de prata 1%	creme pote 100 g	US	Uso restrito ao protocolo de curativos.
Sulfametoxazol + trimetoprima 200 + 40 mg/5 mL	suspensão oral, frasco 100 mL	D	Receita em duas vias.
Sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg	comprimido	D	Receita em duas vias.
Sulfato de magnésio 10%	solução injetável, ampola 10 mL, IV	US	Indicado para casos de pré-eclampsia e eclampsia.
Sulfato ferroso 25 mg ferro elementar	gotas orais, frasco 30 mL	D	

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Sulfato ferroso 40 mg	comprimido	D	
Suxametônio 100 mg (succinilcolina)	pó para solução injetável, frasco ampola, IM/IV/SC	US	
Talidomida 100 mg	comprimido	AE	CESAF - Medicamento sujeito a controle especial; Lista C3 (Portaria SVS 344/98). Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis. Notificação de receita de talidomida + receita em duas vias + termo consentimento.
Tenofovir 300 mg	comprimido	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Protocolo de Hepatites Virais. Disponível no Ambulatório de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Tenofovir desoproxila 300 mg + fumarato de entricitabina 200 mg	comprimido revestido	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Tenofovir desoproxila 300 mg + fumarato de Lamivudina 300 mg	comprimido	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Tenofovir disoproxil, 300 mg + fumarato lamivudina 300 mg + efavirenz 600 mg	comprimido	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Terbutalino 0,5 mg/mL	solução injetável, ampola 1 mL, IV (infusão)/SC	US	
Terizidona 250 mg	cápsula	AE	CESAF - Solicitação e dispensação vinculadas ao Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Tetracaína 10 mg + fenilefrina 1 mg/mL	colírio, frasco 10 mL	US	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Tiamina 100 mg	solução injetável (100 mg/mL), ampola 1 mL, IM/IV	US	Situações de emergência em alcoolistas crônicos.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Tiamina 300 mg	comprimido	D	Prevenção e tratamento da deficiência da tiamina.
Tiras para determinação de glicose	unidade	D	Automonitoramento de glicemia capilar: dispensação conforme protocolo vigente.
Tramadol 50 mg/mL	solução injetável, ampola 2 mL, IM/IV/SC	D	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca. Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo da dor.
Tratamento multibacilar adulto – clofazimina 50 mg + clofazimina 100 mg + rifampicina 300 mg + dapsona 100 mg	comprimido	D	CESAF - Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Tratamento paucibacilar adulto - dapsona 100 mg + rifampicina 300 mg	comprimido	D	CESAF - Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Tropicamida 1%	colírio, frasco 5 mL	US	
<i>Valeriana officinalis</i> 50mg	comprimido	D	
Vancomicina 500 mg	pó para solução injetável, IV	D	Uso para continuação de tratamento de osteomielite. Dispensação mediante prescrição em formulário próprio conforme legislação municipal vigente. Receita em duas vias.
Varfarina sódica 5 mg	comprimido	D	
Vaselina Sólida	pasta pote 500 g	US	Programa de Saúde do Homem.
Vaselina líquida	frasco 1 L	US	
Vasopressina 20 U/mL	ampola 1 mL	US	Uso restrito em leito Covid-19.
Vitamina C (ácido ascórbico) 500 mg	comprimido	D	Pacientes em hemodiálise.
Vitaminas do complexo B (tiamina (B1) + riboflavina (B2) + pantotenato (B5) + piridoxina (B6))	drágeas	D	Pacientes em hemodiálise e em tratamento da tuberculose.
Zanamivir 5 mg	pó para inalação oral	AE	CESAF - Uso restrito conforme solicitação da Vigilância Epidemiológica.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Zidovudina 10 mg/mL	solução oral, frasco 100 mL e solução injetável	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Zidovudina 100 mg	cápsula retard	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Zidovudina 300 mg + lamivudina 150 mg	comprimido	AE	CESAF - Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.

III – MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

1. ATENÇÃO BÁSICA - CARRINHO DE EMERGÊNCIA

Descrição	Apresentação	Quantidade
Ácido acetilsalicílico 100mg	comprimido	1 cartela
Adrenalina (Epinefrina) 1 mg - sol.inj.	ampola 1 mL	30
Água para injeção	ampola 10 mL	5
Amiodarona 50 mg/mL - sol.inj.	ampola 3 mL	4
Atropina 0,50 mg - sol.inj.	ampola 1 mL	6
Diazepam 5 mg/mL - sol.inj.	ampola 2 mL	3
Etomidato 2 mg/mL	ampola 10 mL	3
Fenitoina 50 mg/mL - sol.inj.	ampola 5 mL	4
Fenobarbital 100 mg/ml	ampola 2 ml	1
Fentanila 0,05 mg/mL, citrato	ampola 2 mL	3
Furosemida 10 mg/mL - sol.inj.	ampola 2 mL	2
Glicose 50% - sol.inj	ampola 10 mL	6
Haloperidol 5 mg/mL - sol. inj.	ampola 1 mL	2
Hidrocortisona 500 mg - inj.	frasco ampola	2
Isossorbida 5mg	cp sublingual	1 cartela
Lidocaina 2% (100mg/5g) - gel	bisnaga 30 g	1
Lidocaína 2% - sol. inj.	frasco ampola	1
Metoprolol 1 mg/mL sol. Injetável	ampola 5 mL	4
Midazolam 5 mg/mL - sol. Inj.	ampola 3 mL	2
Morfina 10 mg/mL	ampola 1 mL	2
Prometazina 25 mg/mL - sol.inj.	ampola 2 mL	2
Succinilcolina (suxametônio), cloreto 100 mg	frasco ampola 5 mL	1
Terbutalino 0,5 mg/mL - sol.inj.	ampola 1 mL	2

2. ATENÇÃO BÁSICA - MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO

Descrição	Apresentação
Acetato de retinol 10.000 ui/g, aminoácidos 25 mg/g, metionina 5mg/g e cloranfenicol 5mg/g	bisnaga 3,5 g
Acido acetilsalicílico 100 mg	comprimido
Água para injeção	frasco 500 mL
Água para injeção	ampola 10 mL
Água oxigenada 10vol. (3% de peróxido de hidrogênio)	frasco 1 L
Álcool etílico 70%	frasco 1 L
Bicarbonato de sódio 8,4%	frasco 250 mL
Bromoprida 10mg/2mL	ampola 2 mL
Brometo de Escopolamina 20 mg - sol.inj.	ampola 1 mL
Captopril 25 mg	comprimido
Dexametasona 2mg/mL - sol. inj.	ampola 1 mL
Dexametasona 4mg/mL – sol. inj	ampola 2,5 mL
Diclofenaco 25mg/mL – sol.inj..	ampola 3 mL
Dimenidrinato 50 mg + piridoxina 50 mg - sol.inj.	ampola 1 mL
Dipirona 500 mg/mL – sol.inj.	ampola 2 mL
Dipirona 500 mg/mL - gotas orais	frasco
Furosemida 10 mg/mL - sol.inj.	ampola 2 mL
Glicose 25% e 50 % - sol.inj.	ampola 10 mL
Hidrocortisona 100 mg - sol. inj.	frasco ampola
Hidrocortisona 500 mg - inj.	frasco ampola
Insulina NPH	frasco
Insulina regular	frasco
Ipratropio 0,25 mg/mL – gotas para inalação	frasco 20 mL

Descrição	Apresentação
Isossorbida 5mg - sublingual	comprimido
Lidocaína 2% s/v	fr amp 20 mL
Lidocaína 2% gel	bisnaga 30 g
Metildopa 250mg	comprimido
Metoclopramida 5 mg/mL - sol.inj.	ampola 2 mL
Papaína gel 3%; 10%	pote 100 g
Paracetamol 200mg/mL	frasco
Salbutamol 5mg/mL gotas para inalação	frasco 10 mL
Solucao para clister com glicerina 12%	frasco 500 mL
Solução ringer com lactato	frasco 500 mL
Soro fisiológico 0,9% - sol.inj.	frasco 1 L
Soro fisiológico 0,9% - sol.inj.	frasco 250 mL
Soro fisiológico 0,9% - sol.inj.	frasco 500 mL
Soro fisiológico 0,9% sol. Inj.	frasco 100 mL
Soro glicosado 5% - sol.inj.	frasco 250 mL
Soro glicosado 5% - sol.inj.	frasco 500 mL
Sulfadiazina de prata 1%	pote 100 gramas
Tetracaina 10mg + fenilefrina 1mg/mL - colírio	frasco 10 mL
Vaselina líquida	frasco 1 L

2.1 KIT PARA GLICEMIA

Descrição	Apresentação	Quantidade
Aparelho para doseamento de glicose	unidade	1
Lancetas	unidade	01 caixa
Tiras para determinação de glicose	unidade	01 caixa

3. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

Descrição	Apresentação	Quantidade
Adenosina 3 mg/mL, sol. Injet.	ampola 2 mL	6
Epinefrina (adrenalina) 1 mg - sol.inj.	ampola 1 mL	30
Água para injeção	ampola 10 mL	5
Amiodarona 50 mg/mL - sol.inj.	ampola 3 mL	6
Atropina 0,50 mg - sol.inj.	ampola 1 mL	6
Clopidogrel 75 mg	comprimido	8
Deslanosideo 0,2 mg/mL	ampola 2 mL	5
Diazepam 5 mg/mL - sol.inj.	ampola 2 mL	3
Dopamina 5 mg/mL, cloridrato	ampola 10 mL	4
Etomidato 2 mg/mL	ampola 10 mL	5
Fenitoína 50 mg/mL - sol.inj.	ampola 5 mL	6
Fentanila 0,05 mg/mL, citrato	ampola 2 mL	5
Fenobarbital 100 mg/mL - sol inj.	ampola 2 mL	3
Flumazenil 0,5mg/5mL - sol.inj	ampola 5 mL	2
Furosemida 10mg/mL – sol. Inj.	ampola 2 mL	5
Gliconato de cálcio 10%	ampola 10 mL	5
Glicose 50% - sol. Inj.	ampola 10 mL	10
Haloperidol 5 mg/mL - sol. Inj.	ampola 1 mL	5
Hidrocortisona 500mg – inj,	frasco ampola	3
Lidocaina 2% (20mg/mL) – sol. Inj. - sem vasoconstritor	frasco ampola 20 mL	1
Lidocaína 2% (100mg/5g) – gel	bisnaga 30 g	1
Metoprolol 1 mg/mL sol. Injetável	ampola 5 mL	10
Midazolam 5 mg/mL - sol. Inj.	ampola 3 mL	10
Morfina 10mg/mL – sol. Inj.	ampola 1 mL	5
Noradrenalina, hemitartrato 2mg/ml	ampola 4 ml	2

Descrição	Apresentação	Quantidade
Succinilcolina (suxametônio), cloreto 100 mg	frasco ampola 5 mL	5
Sulfato de magnésio 10% sol. Injet.	ampola 10 mL	5

4. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SALA DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

Ácido acetilsalicílico 100 mg	comprimido	1 cartela
Água para injeção - solução injetável	ampola 10 mL	30
Água para injeção - solução injetável	frasco 500 mL	5
Bicarbonato de sódio 1 meq/mL (8,4%)	solução injetável frasco 250 mL	2
Bromoprida 10 mg/2 mL	ampola 2 mL	10
Brometo de n-butilescopolamina 20 mg/mL - solução injetável	ampola 1 mL	20
Captopril 25 mg	comprimido	1 cartela
Carvão vegetal ativado	pó para uso oral, envelope 10 g	10
Cloreto de potássio 19,1%	solução injetável, ampola 10 mL	5
Cloreto de sódio 20 % (3,4 meq/mL)	solução injetável, ampola 10 mL	5
Dexametasona 2 mg/mL	solução injetável, frasco ampola	10
Dexametasona 4 mg/mL - solução injetável	ampola 2,5 mL	10
Diclofenaco 25 mg/mL – solução injetável	ampola 3 mL	30
Dimenidrinato 50 mg + piridoxina 50 mg - solução injetável	ampola 1 mL	10
Dipirona 500 mg/mL – solução injetável	ampola 2 mL	30
Fitomenadiona 10 mg/mL - solução injetável IM	ampola 1 mL	2
Furosemida 10 mg/mL - solução injetável	ampola 2 mL	20
Gliconato de cálcio 10%- solução injetável	ampola 10 mL	5
Glicose 25% - solução injetável	ampola 10 mL	10
Glicose 50% - solução injetável	ampola 10 mL	30
Hidrocortisona 100 mg - pó para injeção	frasco ampola	10

Descrição	Apresentação	Quantidade
Hidrocortisona 500 mg – pó para injeção	frasco ampola	10
Ipratrópio, brometo 0,25 mg/mL - gotas para inalação	frasco 20 mL	1
Isossorbida 5 mg	comprimido sublingual	1 cartela
Lidocaína injetável 2 % - solução injetável	frasco ampola 20 mL	1
Lidocaína injetável 2 % - gel	bisnaga 30 g	1
Manitol 20% - solução	frasco 250 mL	4
Metildopa 250 mg	comprimido	1 cartela
Metoclopramida 5 mg/mL - solução injetável	ampola 2 mL	10
Prometazina 25 mg/mL - solução injetável	ampola 2 mL	20
Salbutamol 5mg/mL gotas para inalação	frasco 10 mL	1
Solução ringer com lactato	frasco 500 mL	12
Soro fisiológico 0,9% - solução injetável	frasco 1 L	10
Soro fisiológico 0,9% - solução injetável	frasco 250 mL	20
Soro fisiológico 0,9% - solução injetável	frasco 500 mL	20
Soro fisiológico 0,9% - solução injetável	frasco 100 mL	20
Soro glicosado 5% - solução injetável	frasco 250 mL	5
Soro glicosado 5% - solução injetável	frasco 500 mL	5
Sulfadiazina de prata 1%	pote 100 g	1
Sulfato de magnésio 10% - solução injetável	ampola 10 mL	5
Terbutalino 0,5 mg/mL - solução injetável	ampola 1 mL	5
4.1 KIT PARA GLICEMIA		
Aparelho para doseamento de glicose	unidade	1
Lancetas	unidade	01 caixa
Tiras para determinação de glicose	unidade	01 caixa

5. LEITO COVID-19

5.1. MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO, SEDAÇÃO E INTUBAÇÃO DE PACIENTES

Descrição	Apresentação	Indicação
Atracurio, besilato 10mg/ml	ampola 5 ml	Bloqueador neuromuscular, não despolarizante
Dextrocetamina 50mg/ml	frasco 10 ml	Analgesia e sedação.
Dexmedetomidina, cloridrato 100 mcg/ml	ampola 2 ml	Sedativo.
Dobutamina 12,5mg/ml	ampola 20 ml	Droga vasoativa.
Dopamina 5mg/ml (50mg/ampola)	ampola 10 ml	Droga vasoativa.
Fentanila 0,05mg/ml	ampola 10 ml	Analgesia e anestesia.
Meropeném 1 g	frasco ampola	Antibiótico.
Midazolam 5mg/ml	ampola 10 ml	Sedativo hipnótico.
Naloxona, cloridrato 0,4 mg/ml	ampola 1 ml	Antídoto opiáceo.
Norepinefrina, hemitartrato 2mg/ml (2 mg hemitartrato de norepinefrina = 1 mg de norepinefrina base)	ampola 4 ml	Droga vasoativa.
Pancurônio 2mg/ml	ampola 2 ml	Bloqueador neuromuscular, não despolarizante
Piperacilina 4 g + Tazobactam 0,5 g	frasco ampola	Antibiótico
Propofol 10mg/ml	ampola 20 ml	Sedativo hipnótico.
Rocurônio 10mg/ml	ampola 5 ml	Bloqueador neuromuscular, não despolarizante
Suxametônio (succinilcolina) 100 mg (pó para reconstituição)	frasco ampola	Bloqueador neuromuscular, despolarizante.
Vasopressina 20 U/ml	ampola 1 mL	Vasopressor.

IV – USO DE ANTIMICROBIANOS EM INFECÇÕES EM ADULTOS

1. TRATAMENTO DAS INFECÇÕES REPIRATÓRIAS ALTAS

1.1. SINUSITE^{1,2,3,4,31}

Uso de Antimicrobiano somente com persistência dos sintomas por mais de 7 dias ou dor facial/dentária ou febre alta com secreção nasal purulenta.

1ª Escolha	Amoxicilina + Ácido Clavulânico (500/125 mg) 1 comprimido de 8/8 horas por 10 a 14 dias (prescrição em formulário próprio)
2ª Escolha	Levofloxacino 500 mg 1 vez ao dia por 7 a 10 dias (prescrição em formulário próprio)
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Doxiciclina 100 mg 1 comprimido de 12/12 horas por 10 dias

1.2. FARINGITE E AMIGDALITE PURULENTAS^{3,5,6,33}

1ª Escolha	Amoxicilina 500 mg 1cp de 8/8 horas por 10 dias
2ª Escolha	Amoxicilina + Ácido Clavulânico (500/125 mg) 1 cp de 8/8 horas por 10 dias (prescrição em formulário próprio)
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Azitromicina 500 mg 1 cp ao dia por 5 dias (prescrição em formulário próprio)

1.3. RINITE¹⁹

Não se recomenda o uso de Antimicrobiano sistêmico em adultos como tratamento sintomático, evitando-se seu uso indiscriminado e aumento da resistência bacteriana.

1.4. OTITE MÉDIA AGUDA^{1,3,7,33}

1ª Escolha	Amoxicilina 500 mg 1cp de 8/8 horas por 7 a 10 dias
2ª Escolha	Amoxicilina + Ácido Clavulânico (500/125 mg) 1 cp de 8/8 horas, por 10 dias (prescrição em formulário próprio)
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Azitromicina 500 mg 1 cp ao dia por 5 dias (prescrição em formulário próprio)

1.5. BRONQUITE AGUDA¹

Não se recomenda o uso de Antimicrobiano.

1.6. COQUELUCHE^{3,9,33}	
Adulto	Azitromicina 500 mg 1cp ao dia por 5 dias (prescrição em formulário próprio)
2ª escolha	Claritromicina 500mg de 12/12 horas por 7 dias.
Se intolerância a macrolídeo	Sulfametoxazol + trimetoprima 400/80mg 2cp de 12/12 horas 7 dias
1.7. PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE^{3,10,11,12,13,32}	
Considerar associação com Oseltamivir 75 mg 12/12 horas por 5 dias durante epidemia de influenza (idealmente iniciar em até 48 horas do início dos sintomas). Se persistência dos sintomas, usar à critério médico.	
1.7.1. PACIENTES PREVIAMENTE SADIOS, TRATAMENTO EM DOMICÍLIO, SEM USO DE ANTIBIÓTICOS NOS ÚLTIMOS 3 MESES:^{3,10,11,13,32}	
1ª Escolha	Azitromicina 500 mg 1cp ao dia por 5 dias (prescrição em formulário próprio)
2ª Escolha	Doxiciclina 100 mg duas vezes ao dia por 5 dias OU Amoxicilina + Ácido Clavulânico 500/125 mg 2cp de 8/8 horas por 7 a 10 dias (prescrição em formulário próprio)
1.7.2. PACIENTES COM DOENÇAS ASSOCIADAS OU USO DE ANTIBIÓTICOS NOS ÚLTIMOS 3 MESES:^{3,10,11,13}	
Doenças Associadas: DM, ICC, IMUNODEPRIMIDO, HEPATOPATIA, INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, DPOC, ASMA e ALCOOLISMO	
1ª Escolha	Levofloxacino 750 mg, 1cp ao dia por 5 dias (prescrição em formulário próprio)
2ª Escolha	Amoxicilina + Ácido Clavulânico 500/125 mg 2cp de 8/8 horas por 7 a 10 dias (prescrição em formulário próprio) + Azitromicina 500 mg 1cp ao dia por 5 dias (prescrição em formulário próprio)

1.7.3. PACIENTES EM LEITO DE OBSERVAÇÃO - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO²⁴

CRB 65: 0 A 1	Amoxicilina + Ácido Clavulânico 500/125 mg 2cp de 8/8 horas por 7 a 10 dias (prescrição em formulário próprio) OU Azitromicina 500mg 1cp ao dia por 5 dias (prescrição em formulário próprio) OU Levofloxacino 750mg 1cp ao dia por 5 dias (prescrição em formulário próprio) OU Ceftriaxona 2 g EV por dia, 2 doses e após 6 doses (prescrição em formulário próprio. Obrigatório apresentar resumo de alta da UPA)
CRB 65: 2	Ceftriaxona 2 g EV – por dia, encaminhar para acompanhamento na Atenção Básica – unidade de referência (prescrição em formulário próprio. Obrigatório apresentar resumo de alta da UPA)

1.7.4. PACIENTES GRAVES ENCAMINHADOS PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR²⁴

CRB 65: 3 A 4	Ceftriaxona 2 g EV – 1ª dose na Unidade de Saúde (prescrição em formulário próprio)
---------------	---

1.8 PNEUMONIA ATÍPICA^{3,30}

1ª Escolha	Azitromicina 500 mg 1cp ao dia por 5 dias (prescrição em formulário próprio) OU Clarithromicina 500 mg duas vezes ao dia por 14 a 21 dias OU Doxiciclina 100 mg duas vezes ao dia por 14 dias
------------	---

2. TRATAMENTO DAS INFECÇÕES URINÁRIAS

2.1. CISTITE AGUDA EM MULHERES GRÁVIDAS³⁴

Solicitar Urocultura e iniciar tratamento empírico. Não usar nitrofurantoína **no último trimestre da gestação.**

Nitrofurantoína 100 mg 6/6 horas por 10 dias (evitar após a 36ª semana de gestação)

OU

Cefalexina 500 mg 1cp de 6/6 horas 7 a 10 dias

OU

Amoxicilina + Ácido Clavulânico (500/125 mg) 1cp de 8/8 horas por 7 a 10 dias (prescrição em formulário próprio)

2.2. CISTITE AGUDA NÃO COMPLICADA EM ADULTO^{3,14,16,34,35}

Nitrofurantoína 100 mg 1cp de 6/6 horas de 5 a 7 dias

OU

Sulfametoxazol/Trimetroprim (400/80 mg) 2 cpr 12/12 horas por 3 dias

2.3. UROCULTURA³

Ceftriaxona 1 a 2 g IV (prescrição em formulário próprio e resultado do antibiograma)

2.4. CISTITE COMPLICADA – PACIENTES EM LEITO DE OBSERVAÇÃO NA UPA²⁵

*** cistite complicada: toda infecção urinária alta ou baixa associada à doença de base, maior risco de falha terapêutica. Inclui: diabetes, gravidez, mais de 7 dias de sintomas antes do atendimento, ITU adquirida no hospital, falência renal, obstrução do trato urinário, presença de SVD, stent e tubo de nefrostomia, instrumentação urinária recente, anormalidade friccional ou automática do trato urinário, antecedentes ou ITU na infância, transplante renal, imunossupressão- neoplasia em atividade.²⁴

Ceftriaxona 1g IV por dia 5 dias (obrigatório apresentar resumo de alta da UPA)

2.5. PIELONEFRITE AGUDA ^{3,14,16,34,35}

Gestante: hospitalizar^{26,34} Se em leito de observação na UPA, realizar primeira dose de ceftriaxona antes da internação.²⁵

Adulto: solicitar urocultura e iniciar tratamento empírico. Após resultado, rever terapia.¹⁶

Ciprofloxacino 500mg 12/12 horas por 7 dias a 14 dias
OU
Sulfametoxazol/Trimetroprim (400/80 mg) 2 cp 12/12 horas por 14 dias
OU
Amoxicilina + Ácido Clavulânico (500/125 mg) 1cp de 8/8 horas por até 14 dias

2.6. UROCULTURA³

Ceftriaxona 1 a 2 g IV (prescrição em formulário próprio e resultado do antibiograma)

2.7. PIELONEFRITE AGUDA - PACIENTES EM LEITO DE OBSERVAÇÃO UPA²⁵

Ciprofloxacino 500mg 12/12 horas por 7 a 14 dias
OU
Ceftriaxona 2g IV por 14 dias (prescrição em formulário próprio)

3. TRATAMENTO DAS INFECÇÕES DE PELE

3.1. IMPETIGO^{3,17,20,22,33}

1ª Escolha	Cefalexina 500 mg VO 6/6 horas por 7 dias OU Benzilpenicilina 600.000Ui a 1.200.000UI, dose única
2ª Escolha ou Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Doxiciclina 100mg , 2 vezes dia, 7 dias OU Clindamicina 300 mg, por via oral, a cada 6 horas 7 dias (prescrição em formulário próprio).

	OU Sulfametoxazol/Trimetroprim (400/80 mg) 2 cp 12/12 horas por 5 dias .
3.2. ERISPELA LEVE PRECOCE	
1ª Escolha	Amoxicilina 500mg 1cp de 8/8 horas por 10 dias ^{3,33} OU Cefalexina 500 mg 1 cp de 6/6 horas por 10 dias ³
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Sulfametoxazol + trimetoprima 400/80mg 2cp de 12/12 horas 10 dias ³ OU Doxiciclina 100mg 1cp de 12/12 horas 10 dias ³ OU Clindamicina 300 mg 1cp 6/6 horas ou 600mg de 8/8h por 7 dias. Máximo 1800mg (prescrição em formulário próprio) ³³
3.3. ERISPELA EXTENSA	
Hospitalizar ou observação na UPA	
3.4. CELULITE LEVE	
1ª Escolha	Amoxicilina 500mg 1cp de 8/8 horas por 10 dias ³ OU Cefalexina 500 mg VO 6/6 horas por 10 dias ^{3,33}
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Sulfametoxazol + trimetoprima 400/80mg 2cp de 12/12 horas 10 dias ³ OU Doxiciclina 100mg 1cp de 12/12 horas 10 dias ³ OU Clindamicina 300 mg 1cp 6/6 horas ou 600mg de 8/8h por 7 dias. Máximo 1800mg (prescrição em formulário próprio) ³³
3.5. CELULITE EXTENSA E GRAVE	
Hospitalizar ou UPA	

3.6. PROFILAXIA DE MORDEDURA DE CÃO OU GATO OU ANIMAIS^{3,8}

Amoxicilina + Ácido Clavulânico (500/125mg) 1 cp de 8/8 horas de 3 a 5 dias (prescrição em formulário próprio).

3.7. INFECÇÃO PÓS MORDEDURA DE CÃO OU GATO OU ANIMAIS (MORDEDURAS MÚLTIPLAS E EXTENSAS)³

Hospitalizar ou observação na UPA.

Ciprofloxacina 500mg VO de 12/12 horas até melhorar a lesão + Clindamicina 600mg IV de 8/8 h

4. INFECÇÕES DA CAVIDADE ORAL

4.1. PROFILAXIA ANTIBIÓTICA (PREVENÇÃO DA ENDOCARDITE INFECCIOSA).^{27,28,29}

1ª Escolha

Amoxicilina 500 mg VO 2g 1 hora antes do procedimento.

Pacientes alérgicos a betalactâmicos

Clindamicina 300 mg VO 600mg 1 hora antes do procedimento.

4.2. ABCESSO PERIAPICAL AGUDO^{27,28,29}

1ª Escolha

Cefalexina 500 mg VO 6/6 horas por 10 dias
OU
Amoxicilina 500 mg + clavulanato VO 1cp de 8/8 horas por 7 dias.

Pacientes alérgicos a betalactâmicos

Clindamicina 300 mg VO 1cp de 8/8 horas 7 dias.

REFERÊNCIAS:

1. LEVIN, A.S.S. (org.). Guia de utilização de anti-infecciosos e recomendações para a prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. São Paulo: Hospital das Clínicas, 2011. 5ª edição. Disponível em: <http://www.sbp.com.br/pdfs/anti-infecciosos_infec_hospitalar.pdf> Acesso: 18 maio 2017
2. CHOW, A. W. et al. IDSA Clinical practice guideline for acute bacterial rhinosinusitis in children and adults. Clinical Infectious Diseases 2012. Dept. of Medicine. University of British Columbia & Vancouver Hospital. Disponível em: <<http://eguideline.guidelinecentral.com/i/71828-rhinosinusitis>> Acesso: 12 junho 2017.
3. GILBERT, D. N. et al. (org.). The Sanford Guide, To Antimicrobial Therapy, Ebook. Last update: march 2019.
4. Zara M Patel, MD Peter H Hwang, MD. Uncomplicated acute sinusitis and rhinosinusitis in adults: Treatment. UpToDate. 2017. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/uncomplicated-acute-sinusitis-and-rhinosinusitis-in-adults-treatment?source=search_result&search=sinusitis&selectedTitle=1~150#references> Acesso: 21 agosto 2017.
5. SHULMAN, S. T. et al. Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis: 2012 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases 2012. Disponível em: <<http://eguideline.guidelinecentral.com/i/100171-streptococcal-pharyngitis>> Acesso: agosto 2017
6. DynaMed [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 115782, Streptococcal pharyngitis; [updated 2016 Jul 20, cited place cited date here]; [about 18 screens]. Disponível em: < <http://web.b.ebscohost.com/dynamed/detail?sid=6239fa55-3dea-43d9-beaa-143ce2ffd685%40sessionmgr104&vid=6&bdata=Jmxhbm9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVvKlWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=115782&anchor=References>> Acesso: agosto 2017
7. LIMB, C.J.; LUSTIG, L. R.; KLEIN, J.O. Acute otitis media in adults. UpToDate. 2017. Disponível em:< https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?source=search_result&search=Acute%20otitis%20media&selectedTitle=2~150#H17> Acesso em: 21 agosto 2017.
8. TAVARES, W. Antibióticos e quimioterápicos para o clínico/Walter Tavares. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Atheneu, 2014.
9. BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância em Saúde. Volume único. 1ª edição atualizada (SVS/MS). Disponível em: <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/PDF/2017/outubro/16/Volume-Unico-2017.pdf>. Acesso em: Fevereiro 2019.
10. BMJ Best Practice. Pneumonia Adquirida na Comunidade. Última atualização: Fev 09, 2019. BMJ Publishing Group Limited. Disponível em: <https://bestpractice.bmj.com/topics/pt-br/17/pdf/17.pdf>. Acesso: março 2019.
11. FILE, T. M. Jr, .Treatment of community-acquired pneumonia in adults in the outpatient setting. UpToDate. 2017. Disponível em:< https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?source=search_result&search=Community-acquired%20pneumonia&selectedTitle=3~150> Acesso em: 21 agosto 2017.
12. MANDELL, A. L. et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society Consensus Guidelines on the Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults. Clinical Infectious Diseases 2007. Disponível em: <<http://eguideline.guidelinecentral.com/i/53989-community-acquired-pneumonia>> Acesso: agosto 2017
13. DynaMed [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 115170, Community-acquired pneumonia in adults; [updated 2018 Oct 30]; [about 36 screens]. Available from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dnh&AN=115170&site=dynamed-live&scope=site>. Registration and login required. Acesso: março 2018.

14. DynaMed [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 116894, Uncomplicated urinary tract infection (UTI) (pyelonephritis and cystitis); [updated 2017 Mar 15]; [about 23 screens]. Disponível em: <<http://web.a.ebscohost.com/dynamed/detail?sid=0b7a9672-a472-42fe-9031-ebb03abbb10d%40sessionmgr4008&vid=4&bdata=Jmxhbmc9cHQYnImc2l0ZT1keW5hbWVklWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=116894>> Acesso: agosto 2017.
15. DynaMed [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 904750, Urinary tract infection (UTI) in pregnancy; [updated 2016 Jul 08]; [about 14 screens]. Disponível em: <<http://web.a.ebscohost.com/dynamed/detail?sid=0b7a9672-a472-42fe-9031-ebb03abbb10d%40sessionmgr4008&vid=5&bdata=Jmxhbmc9cHQYnImc2l0ZT1keW5hbWVklWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=904750&db=dme>> Acesso: agosto 2017.
16. GUPTA, K. et al. International Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Acute Uncomplicated Cystitis and Pyelonephritis in Women: A 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases. Clinical Infectious Diseases 2011. Disponível em: <<http://eguideline.guidelinecentral.com/i/58207-uncomplicated-uti>> Acesso: agosto 2017
17. STEVENS D.L. et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases 2014. Disponível em: <<http://eguideline.guidelinecentral.com/i/442091-skin-and-soft-tissue-infections>> Acesso: agosto 2017.
18. LIU C. et al. Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America for the Treatment of MethicillinResistant Staphylococcus aureus Infections in Adults and Children. Clinical Infectious Diseases 2011. Disponível em: <<http://eguideline.guidelinecentral.com/i/53996-mrsa>> Acesso: agosto 2017
19. Anselmo-Lima, W T; Sakano, E. SBO Rinossinusites: evidências e experiências. J Otorhinolaryngol, São Paulo, 2015. Disponível em: <<http://www.aborlccf.org.br/imageBank/CONSENSO-RINOSSINUSITES-EVIDENCIAS-E-EXPERIENCIAS.PDF>> Acesso: agosto 2017.
20. DynaMed [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 115810, Impetigo; [updated 2016 Jun 15, cited **place cited date here**]; [about 9 screens]. Available from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dnh&AN=115810&site=dynamed-live&scope=site>. Registration and login required. Acesso março 2019.
21. DynaMed [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 116794, Cellulitis; [updated 2018 Jun 21, cited **place cited date here**]; [about 30 screens]. Available from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dnh&AN=116794&site=dynamed-live&scope=site>. Registration and login required. Acesso: março 2019.
22. BADDOUR, M L. Impetigo. UpToDate. 2017. Disponível em: <www.uptodate.com/contents/impetigo/print?source=machineLearning&search=impetigo&selectedTitle=1~113§ionRank=1&anchor=H11> Acesso: setembro 2017.
23. SPELMAN, D.; BADDOUR, L M. Cellulitis and skin abscess in adults: Treatment. UpToDate. 2017. Disponível em: <www.uptodate.com/contents/cellulitis-and-skin-abscess-in-adults-treatment?source=search_result&search=erisipela&selectedTitle=2~42> Acesso: setembro 2017.
24. MARCATTO, G. Fluxo para observação clínica parapacientes com pneumonia. São Jose do Rio Preto, 2017.
25. MARCATTO, G. Fluxo para observação prolongada de pacientes com infecção de trato urinário. São Jose do rio Preto, 2017.
26. SÃO JOSE DO RIO PRETO, Protocolo de Assistência Pré-Natal, 2017.

27. BRIGANTINI et al. Antibióticos em odontologia. Revista UNINGÁ. Vol.49,pp.121-127 (Jul - Set 2016) V.49, pp.121-127. 2016. Disponível em: [file:///C:/Documents%20and%20Settings/alpereira/Meus%20documentos/Downloads/1293-1-3703-1-10-20180108%20\(1\).pdf](file:///C:/Documents%20and%20Settings/alpereira/Meus%20documentos/Downloads/1293-1-3703-1-10-20180108%20(1).pdf). Acesso: março 2019.
28. ALFENAS, C. F. LINS, F. F. MANESCHY, M. T. Antibióticos no tratamento de abscessos perirradiculares agudos. Rev. bras. odontol., Rio de Janeiro, v. 71, n. 2, p. 120-3. 2014. Disponível em: <http://revista.aborj.org.br/index.php/rbo/article/viewFile/509/420>. Acesso: março 2019.
29. PARISI, A. G. S. et al. Protocolo Terapêutico Medicamentoso Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente. Disponível em: <http://www.unoeste.br/Areas/Graduacao/Content/documentos/3/Downloads/protocolo-medicamentoso.pdf>. Acesso: março 2019.
30. BMJ Best Practice. Pneumonia Atípica. Última atualização: May 01, 2018. BMJ Publishing Group Limited. Disponível em: <https://bestpractice.bmj.com/topics/pt-br/18/pdf/18.pdf>. Acesso: março 2019.
31. MICROMEDX® 1.0 (Healthcare Series), (electronic version). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. **Last Modified: January 10, 2019.** Disponível em: https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/63DCEB/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/EDB81E/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=sinusitis#. Acesso: 25 março 2019.
32. MICROMEDX® 1.0 (Healthcare Series), (electronic version). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. **Last Modified: March 16, 2018.** Disponível em: https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/90ADA8/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/F425B1/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.IntermediateToDocumentLink?docId=CP1698A&contentSetId=135&title=Community+acquired+pneumonia&servicesTitle=Community+acquired+pneumonia#. Acesso: 25 março 2019.
33. São Paulo. Guia de utilização de anti-infecciosos e recomendações para prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 7. ed. São Paulo. 2018-2020.
34. Brasil. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica : Saúde das Mulheres / Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: file:///C:/Documents%20and%20Settings/alpereira/Meus%20documentos/Downloads/protocolos_atencao_basica_saude_mulheres.pdf
35. EPOCRATES [Internet]. San Francisco (CA): Epocrates, Inc. c2020 [Monograph], Acute cystitis. Last Updated: 2020-05-06. Disponível em: <https://online.epocrates.com/diseases/298/Acute-cystitis>. Acesso: 30 jul 2020.

V – USO DE ANTIMICROBIANOS EM INFECÇÕES PEDIÁTRICAS

1. COQUELUCHE^{3,12}	
Criança	Azitromicina 10mg/kg/dia (máximo de 500mg) por 5 dias (prescrição em formulário próprio).
Se intolerância a macrolídeo	Sulfametoxazol + trimetoprima 200mg + 40 mg/5mL: < 2 meses: contraindicado > 6 semanas até 5 meses: 2,5 mL de 12/12 horas por 7 dias ³ a 14 dias ^{nelson} > 6 meses até 5 anos: 5 mL de 12/12 horas por 7 dias a 14 dias ^{nelson} 6 a 12anos: 10 mL de 12/12 horas por 7 dias a 14 dias ^{nelson}
2. FARINGITE^{1,6,12}	
1ª Escolha	Penicilina benzatina 25.000 UI/kg – Intramuscular (máximo de 1 200 000 UI)
2ª Escolha	Amoxicilina 50 mg/kg/dia 8/8 horas ou 12/12 horas por 10 dias OU Cefalexina 50 mg/kg/dia de 6/6 horas por 10 dias OU Amoxicilina + Ácido Clavulânico 50 mg/mL , 50 mg/kg/dia 8/8 horas por 10 dias (prescrição em formulário próprio)
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Azitromicina: 12 mg/kg/dia por 5 dias, máximo de 500 mg/dia.
3. OTITE MEDIA AGUDA^{1,4,6,11, 12}	
1ª Escolha	Amoxicilina 50 mg /kg/dia 8/8 horas ou 12/12 horas por 10 dias
2ª Escolha	Amoxicilina 90 mg/Kg/dia 8/8 horas ou 12/12 horas por 10 dias OU Amoxicilina + Ácido Clavulânico 50 mg a 90mg/kg/dia 8/8 horas ou 12/12 horas por 10 dias (prescrição em formulário próprio)
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Azitromicina 10 mg/kg/dia uma vez ao dia por 5 dias (prescrição em formulário próprio).

4. SINUSITE ^{1,12}	
1ª Escolha	Amoxicilina 50 mg /kg/dia 8/8 horas ou 12/12 horas por 10 dias
2ª Escolha	Amoxicilina 90 mg/Kg/dia 8/8 horas ou 12/12 horas por 10 dias OU Amoxicilina + Ácido Clavulânico 50 mg a 90mg/kg/dia 8/8 horas ou 12/12 horas por 10 dias (prescrição em formulário próprio)
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Azitromicina 10 mg/kg/dia uma vez ao dia por 5 dias (prescrição em formulário próprio).

5. PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE ^{1,2,5,6,7,8}	
Avaliar possibilidade de infecção viral por Influenza ou vírus em sincicial respiratório.	
Crianças > 3 meses ^{1,2}	
1ª Escolha	Amoxicilina 50 mg/kg/dia 8/8 horas por 10 dias
Em caso de falência de tratamento	Amoxicilina + Ácido Clavulânico 50 a 90 mg/kg/dia 8/8 horas por 10 dias (prescrição em formulário próprio)
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Azitromicina 10 mg/kg /dia (máximo 500mg) por 5 dias. (prescrição em formulário próprio)

6. PNEUMONIA ATÍPICA ^{1,6,8,9}	
1ª Escolha	Azitromicina 10 mg/kg por via oral uma vez ao dia por 5 dias (prescrição em formulário próprio).

7. IMPETIGO BOLHOSO, CELULITE OU ERISPELA ^{1,10,12}	
1ª Escolha	Cefalexina 50 mg/kg/dia 6/6 horas por 10 dias. Em caso de impetigo:

	Penicilina benzatina 25.000 UI/ kg (máximo de 1.200.000 UI).
2ª Escolha	Amoxicilina + Ácido Clavulânico 50 mg/kg/dia 8/8 horas por 10 dias (prescrição em formulário próprio).
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Sulfametoxazol + trimetoprima 200mg + 40 mg/5mL: 40 mg/kg/dia a cada 12 horas por 7 dias.

8. INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO^{1,12,13}

Sulfametoxazol + Trimetropima 40 mg/kg/dia 12/12 horas por 10 dias.

OU

Amoxicilina + Clavulanato 50 mg/kg/dia de 8/8 horas por 10 dias (prescrição em formulário próprio).

* Ideal basear-se no antibiograma

9. INFECÇÕES GASTROINTESTINAIS^{1,12}

Uso do antibiótico é indicado em casos de diarreia severa, com mais de 6 evacuações por dia de fezes líquidas/pastosas, temperatura 38,3 C, presença de sangue nas fezes¹.

Sulfametoxazol + Trimetropim 40 mg/kg/dia 12/12 horas por 5 dias.

OU

Azitromicina 10mg/kg/dia uma vez ao dia por 3 dias (prescrição em formulário próprio).

REFERÊNCIAS

1. GILBERT, D. N. et al. (org.). The Sanford Guide, To Antimicrobial Therapy, Ebook. Last update: march 2019.
2. BRADLEY, J S; BYINGTON, L C; SHAH, S S. The Management of Community-Acquired Pneumonia in Infants and Children Older Than 3 Months of Age: Clinical Practice Guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases 2011. Disponível em: <<http://eguideline.guidelinecentral.com/i/63099-pediatric-community-acquired-pneumonia>> Acesso: agosto 2017.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância em Saúde. Volume único. 1ª edição atualizada (SVS/MS). Disponível em: <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/PDF/2017/outubro/16/Volume-Unico-2017.pdf>. Acesso em: 21 Janeiro 2019.
4. BMJ Best Practice. Otite Média Aguda. Última atualização: Jul 04, 2018. BMJ Publishing Group Limited. Disponível em: <https://bestpractice.bmj.com/topics/pt-br/39/pdf/39.pdf>. Acesso: março 2019.
5. BMJ Best Practice. Pneumonia Adquirida na Comunidade. Última atualização: Fev 09, 2019. BMJ Publishing Group Limited. Disponível em: <https://bestpractice.bmj.com/topics/pt-br/17/pdf/17.pdf>. Acesso: março 2019.

6. American Society of Health System Pharmacists, Inc., DynaMed [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 233531, Azithromycin; [updated 2017 Apr 04, cited **place cited date here**]; [about 34 screens]. Available from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dnh&AN=233531&site=dynamed-live&scope=site>. Registration and login required. Acesso: março 2019.
7. DynaMed [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 113670, Community-acquired pneumonia in children; [updated 2018 Nov 19, cited **place cited date here**]; [about 36 screens]. Available from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=dnh&AN=113670&site=dynamed-live&scope=site>. Registration and login required. Disponível em: <http://web.b.ebscohost.com/dynamed/detail?sid=fe08c8cb-8122-4d04-8c08-5defd1e5f9f3%40pdc-v-sessmgr01&vid=4&bdata=Jmxhbmc9cHQTYnImc210ZT1keW5hbWVklWxpdmUmc2NvcGU9c210ZQ%3d%3d#AN=113670&db=dme>. Acesso: março 2019.
8. CAMARGOS, P. A. M. et all. Pneumonia adquirida na Comunidade na Infância. Sociedade Brasileira de Pediatria, Departamento Científico de Pneumologia. Documento científico nº 3, julho 2018. Disponível em: http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Pneumologia_-_20981d-DC_-_Pneumonia_adquirida_na_comunidade-ok.pdf. Acesso: março 2019.
9. BMJ Best Practice. Pneumonia Atípica. Última atualização: May 01, 2018. BMJ Publishing Group Limited. Disponível em: <https://bestpractice.bmj.com/topics/pt-br/18/pdf/18.pdf>. Acesso: março 2019.
10. BMJ Best Practice. Impetigo. Última atualização: Jan 22, 2018. BMJ Publishing Group Limited. Disponível em: <https://bestpractice.bmj.com/topics/pt-br/476/pdf/476.pdf>. Acesso: março 2019.
11. AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS AND AMERICAN ACADEMY OF FAMILY PHYSICIANS CLINICAL PRACTICE GUIDELINE Subcommittee on Management of Acute Otitis Media Diagnosis and Management of Acute Otitis Media PEDIATRICS Vol. 113 No. 5 May 2004. Disponível em: <https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/113/5/1451.full.pdf>. Acesso: março 2019.
12. BRADLEY, J. S. NELSON, J. D. Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy. American Academy of Pediatrics. 25.ed. 2019.
13. BMJ Best Practice. Infecção Urinária em Criança. Última atualização: Oct 03, 2018. BMJ Publishing Group Limited. Disponível em: <https://bestpractice.bmj.com/topics/pt-br/789/pdf/789.pdf>. Acesso em: 03 maio 2019.

VI – USO DE ANTIMICROBIANOS EM PARASITOSES

1. AMEBÍASE^{1,2}

Adulto

1ª Escolha - Metronidazol

Formas leves: Metronidazol, 500mg por via oral, de 8/8 horas 7 a 10 dias.
Formas graves (amebíase intestinal sintomática ou amebíase extraintestinal): 750mg de 8/8 horas 10 dias.
Dose máxima: 4g.

Criança

1ª Escolha – Metronidazol

Metronidazol, 30mg/kg/dia, por via oral, divididos em 3 tomadas por 5 dias.
Formas graves: 40mg/kg/dia, por via oral, divididos em 3 tomadas por 10 dias.

2. ENTEROBÍASE^{1,2,3}

Adulto

Albendazol

400 mg, por via oral, em dose única. O tratamento pode ser repetido após 2 semanas.

Criança

Albendazol

Até 2 anos: 200 mg, por via oral, em dose única. O tratamento pode ser repetido após 2 semanas.

3. GIARDÍASE^{1,2}

Adulto

1ª Escolha - Metronidazol

250 mg, por via oral 8/8 horas, durante 5 a 7 dias. Pode-se repetir o ciclo com intervalo de 1 semana.

Criança

1ª Escolha - Metronidazol

10 mg/kg, por via oral 8/8 horas, durante 7 a 10 dias. Dose máxima diária: 750 mg.

4. ASCARIDÍASE^{2,3}

Adulto

Albendazol

400 mg, por via oral, em dose única; o tratamento pode ser repetido após 2 a 3 semanas.

Criança

Albendazol

Até 2 anos: 200 mg, por via oral, em dose única; o tratamento pode ser repetido após 3 semanas.

5. TENÍASE^{1,2,3}

Adulto

Albendazol

400 mg, por via oral, a cada 24 horas, durante 3 dias.

Criança

Albendazol

Até 2 anos: 200 mg, por via oral, a cada 24 horas, durante 3 dias.

6. ESCABIOSE²

Adulto / Criança

Ivermectina

Ivermectina, dose única, por via oral, obedecendo a escala de peso corporal:
15 a 24kg: 1/2 comprimido; 25 a 35kg: 1 comprimido; 36 a 50kg: 1 1/2 comprimido; 51 a 65kg: 2 comprimidos; 65 a 79kg: 2 1/2 comprimidos; 80 kg ou mais: 3 comprimidos

Adulto / Criança

Permetrina 5% loção

Aplicar na pele acometida mantendo sem enxágue por 6 a 8 horas, por 6 noites. Recomenda-se lavar a roupa pessoal e de cama em água quente.

7. PEDICULOSE²

O tratamento medicamentoso não substitui a necessidade de remoção das lêndeas.

Adulto / Criança

Ivermectina

Ivermectina, dose única, por via oral, obedecendo a escala de peso corporal:
15 a 24kg: 1/2 comprimido; 25 a 35kg: 1 comprimido; 36 a 50kg: 1 1/2 comprimido; 51 a 65kg: 2 comprimidos; 65 a 79kg: 2 1/2 comprimidos; 80 kg ou mais: 3 comprimidos.

8. ESTRONGILOIDÍASE^{1, 2, 3}

Adulto / Criança

1ª Escolha – Irvemectina

Ivermectina, dose única, por via oral, obedecendo a escala de peso corporal (15 a 24kg: 1/2 comprimido; 25 a 35kg: 1 comprimido; 36 a 50kg: 1 1/2 comprimidos; 51 a 65kg: 2 comprimidos; 65 a 79kg: 2 1/2 comprimidos; 80kg: 3 comprimidos ou 200mcg/kg) 1x/dia por 2 dias.

Se ainda existirem larvas após 3 meses, repetir o tratamento.

Em pacientes imunodeprimidos a terapia pode ser repetida após duas semanas.

Adulto

2ª Escolha – Albendazol

400 mg, por via oral, 12/12h 7 dias.

Criança

2ª Escolha – Albendazol

Menor de 2 anos: 200 mg, por via oral, a cada 24 horas, durante 3 dias.

9. LARVA MIGRANS^{1,2,3}

Adulto e Criança maior de 5 anos (acima de 15kg)

1ª Escolha - Ivermectina	Ivermectina, dose única, por via oral, obedecendo a escala de peso corporal (15 a 24kg: 1/2 comprimido; 25 a 35kg: 1 comprimido; 36 a 50kg: 1 ½ comprimidos; 51 a 65kg: 2 comprimidos; 65 a 79kg: 2 1/2 comprimidos; 80kg: 3 comprimidos ou 200mcg/kg) 1x/dia por 2 dias.
Adulto	
2ª Escolha - Albendazol	400 mg, por via oral, de 12/12 horas, por 3 dias (cutânea) ou 7 dias (visceral).
Criança	
Albendazol	Acima de 2 anos: 400 mg, por via oral, de 12/12 horas, por 3 dias (cutânea) ou 5 dias (visceral).

10. TOXOPLASMOSE

Gestantes

1ª Escolha - Espiramicina

Espiramicina 500mg, 2cp de 8/8 horas^{4,5}.

Confirmada a suspeita diagnóstica, a espiramicina é mantida até o parto. Se descartada a infecção aguda, a profilaxia pode ser suspensa⁶.

2ª Escolha – Tríplice (feto infectado)^{4,5,6}

Sulfadiazina 500, 3 cp de 12/12 horas^{4,5,6}
 Pirimetamina 25 mg, 12/12 horas^{4,5,6}
 Ácido Fólico 15mg 1cp/dia^{4,5,6}

Confirmada a infecção aguda antes da 30ª semana, deve-se manter a espiramicina (1 g – 3.000.000 UI), de 8/8 horas, via oral, continuamente até o final da gravidez⁵.

• Se a infecção se der após a 30ª semana, recomenda-se instituir o tratamento tríplice materno: pirimetamina (25 mg), de 12/12 horas, por via oral; sulfadiazina (1.500 mg), de 12/12 horas, por via oral; e ácido fólico (10 mg/dia) – este imprescindível para a prevenção de aplasia medular causada pela pirimetamina^{4,5}.

Criança

Tríplice

Sulfadiazina 100 mg/kg/dia 12/12 horas.⁷
 Pirimetamina 1 mg/kg/dia em 1 dose diária, durante 2 a 6 meses, dependendo da intensidade de acometimento. A seguir, 1 mg/kg três vezes por semana, até completar 1 ano de utilização do

	medicamento ⁷ Ácido Fólnico 10 mg administrados 3 vezes por semana ⁷
--	---

O tratamento da toxoplasmose congênita deverá ser realizado com medicações via oral, durante o período de 1 ano. No município de São José do Rio Preto o referido tratamento é fornecido em doses individualizadas, manipuladas a partir da forma farmacêutica previamente adquirida. As prescrições deverão ser realizadas mensalmente na forma farmacêutica de cápsula, sendo a dose unitarizada de acordo com o peso da criança⁷.

REFERÊNCIAS

1. GILBERT, D. N. et al. (org.). The Sanford Guide, To Antimicrobial Therapy, 47 ed. 2017.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias : guia de bolso / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 8. ed. rev. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010.< http://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_gui_bolso.pdf> Acesso em 22 junho 2017
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. *Formulário terapêutico nacional 2010*: RENAME 2010/Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: <http://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/formulario_terapeutico_nacional_2010.pdf> Acesso em 23 junho 2017.
4. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. *Gestação de alto risco: manual técnico* / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 5. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2010.
5. Brasil. Ministério da Saúde. *Protocolos da Atenção Básica : Saúde das Mulheres* / Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf. Acesso: 27 jul 2020.
6. Sociedade Brasileira de Ginecologia. *Toxoplasmose*. 2017. Disponível em: <https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/185-toxoplasmose>. Acesso: 28 jul 2020.
7. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. Portaria nº 02 de 26 de janeiro de 2015. Estabelece protocolo clínico para tratamento de toxoplasmose congênita. Disponível em: http://gestao.saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/arqu/legi/portaria_2015-01-26_02.pdf. Acesso: 23 agosto 2019.

VII- USO DE ANTIMICROBIANOS EM INFECÇÕES GENITAIS

1. USO DE ANTIMICROBIANOS EM CORRIMENTOS VAGINAIS	
1.1. TRICOMONÍASE¹	
As parcerias sexuais devem ser tratadas com o mesmo esquema terapêutico. Evitar o consumo de álcool durante o tratamento e durante 24 horas após a conclusão do metronidazol.	
1ª Escolha	Metronidazol 2g por via oral, dose única OU
Incluindo gestantes e lactantes	Metronidazol 250 mg, 2 comprimidos, por via oral, 2 x dia por 7 dias.
1.2. CANDIDÍASE VULVOVAGINAL¹	
Não tratar parceria, exceto se sintomas.	
1ª Escolha	Miconazol creme a 2%, via vaginal, um aplicador cheio, à noite ao deitar-se, por 7 dias.
2ª Escolha	Itraconazol 100 mg, 2 cp, por via oral, 2xdia, por 1 dia.
Casos Recorrentes	Miconazol creme a 2%, via vaginal, um aplicador cheio, à noite ao deitar-se, por 14 dias.
Gestantes e Lactentes	Miconazol creme a 2%, via vaginal, um aplicador cheio, à noite ao deitar-se, por 7 dias.
1.3. VAGINOSE BACTERIANA¹	
1ª Escolha	Metronidazol 250 mg, 2 cp por via oral, 2xdia, por 7 dias OU
Incluindo gestantes e lactantes	Metronidazol gel vaginal 100 mg/g, um aplicador cheio via vaginal, à noite ao deitar-se, por 5 dias
2ª Escolha	Clindamicina 300 mg, por via oral, 2 x dia, por 7 dias
Casos Recorrentes	Metronidazol 250 mg, 2 comprimidos por via oral, 2xdia, por 10 a 14 dias OU Metronidazol gel vaginal 100 mg/g, um aplicador cheio, via intravaginal, 1xdia por 10 dias, seguido de tratamento supressivo com duas aplicações semanais, por 4 a 6 meses

2. USO DE ANTIMICROBIANOS EM CORRIMENTOS URETRAIS

2.1. URETRITE GONOCÓCICA E POR CLAMÍDIA NÃO COMPLICADA (URETRITE E PROCTITE)¹

1ª Escolha	Ceftriaxona 500 mg, IM, dose única + Azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, via oral, dose única
Alergia a cefalosporina	Azitromicina 500mg, 4 comprimidos, VO, dose unica (dose total: 2g)

2.2. URETRITE POR CLAMÍDIA¹

A resolucao dos sintomas pode levar ate 7 dias apos a conclusao da terapia¹

1ª Escolha	Azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, por via oral, dose única
2º escolha	Doxiciclina 100mg, 1 comprimido, VO, 2x/ dia, por 7 dias

2.3. URETRITE POR MYCOPLASMA GENITALIUM¹

1ª Escolha	Azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, por via oral, dose única
------------	--

3. SÍFILIS

3.1 SÍFILIS PRIMÁRIA, SÍFILIS SECUNDÁRIA E LATENTE RECENTE (ATÉ UM ANO DE DURAÇÃO)¹

1ª Escolha	Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo)
2ª Escolha	Doxiciclina 100 mg, por via oral, 2xdia, por 15 dias (exceto para gestantes); OU Ceftriaxona 1g, IV ou IM, 1xdia, por 8 a 10 dias para gestantes e não gestantes.

3.2 SÍFILIS LATENTE TARDIA (MAIS DE UM ANO DE DURAÇÃO) OU LATENTE COM DURAÇÃO IGNORADA E SÍFILIS TERCIÁRIA¹

1ª Escolha	Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, (1,2 milhão UI em cada glúteo), semanal, por três semanas. Dose total de 7,2 milhões UI.
2ª Escolha	Doxiciclina 100 mg, por via oral, 2x/dia, por 30 dias (exceto para gestantes) OU Ceftriaxona 1g, IV ou IM, 1x/dia, por 8 a 10 dias para gestantes e não gestantes.

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Protocolo Clínico e Diretrizes terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2020.

VIII – PARECERES DE INCLUSÃO

ÁCIDO TRANEXÂMICO

Tecnologia: Ácido Tranexâmico 50 mg/mL, solução injetável, ampola de 5 mL

Pergunta

Há benefícios do uso do Ácido Tranexâmico no atendimento de pacientes vítimas de trauma atendidos pelo SAMU e Unidades de Pronto Atendimento?

Nome comercial e fabricante

PRINCÍPIO ATIVO	LABORATÓRIO	PRODUTO	APRESENTAÇÃO	PMVG 18%	R\$ unitario
ÁCIDO TRANEXÂMICO	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	ÁCIDO TRANEXÂMICO	50 MG/ML SOL INJ CT 100 AMP VD TRANS X 5 ML	R\$ 424,18	R\$ 4,24
ÁCIDO TRANEXÂMICO	BLAU FARMACÊUTICA S.A.	ACIDO TRANEXAMICO	50 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 5 ML (EMB HOSP)	R\$ 212,10	R\$ 4,24
ÁCIDO TRANEXÂMICO	BLAU FARMACÊUTICA S.A.	ACIDO TRANEXAMICO	50 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP VD TRANS X 5 ML	R\$ 10,60	R\$ 2,12
ÁCIDO TRANEXÂMICO	ZYDUS NIKKHO FARMACÊUTICA LTDA	TRANSAMIN	250 MG COM CT STR X 12	R\$ 39,44	R\$ 7,89
ÁCIDO TRANEXÂMICO	ZYDUS NIKKHO FARMACÊUTICA LTDA	TRANSAMIN	50 MG/ML SOL INJ CT 5 AMP VD TRANS X 5 ML	R\$ 32,63	R\$ 6,53

(ANVISA. Lista de preços de medicamentos – preços fábrica e máximos de venda ao governo, 02/10/2020)

Indicação

O ácido tranexâmico é um agente antifibrinolítico¹ destinado ao controle e profilaxia de hemorragias provocadas por hiperfibrinólise².

Contextualização

A hemorragia é a maior causa de morte potencialmente prevenível após um trauma¹. A conduta médica, na fase aguda, visa reduzir o sangramento e a necessidade de hemotransusão¹. A dissolução regulada do coágulo (fibrinólise) é uma resposta normal ao trauma e tem o objetivo de manter os vasos sanguíneos patentes, mas pode ser exacerbada, em algumas situações, acarretando a hiperfibrinólise³. As drogas antifibrinolíticas previnem a dissolução do coágulo, levando à redução da perda sanguínea³.

Resultado da pesquisa

Ensaio clínicos randomizados, coortes e metanálises foram realizados com objetivo de avaliar e mensurar os potenciais efeitos da utilização do ácido tranexâmico no tratamento de vítimas de trauma com evidência de processo hemorrágico instituído ou em risco de instalação^{1,4} e foi avaliado que o ácido tranexâmico é indicado no tratamento de vítimas de trauma com evidência de processo hemorrágico instituído ou em risco de instalação¹. No trauma, o ácido tranexâmico foi associado à redução da taxa de mortalidade em um grande número de pacientes traumatizados com sangramento³ e estudo de revisão da literatura, concluiu que o ácido tranexâmico é tratamento eficaz e efetivo no trauma⁴.

Além disso, foi demonstrado que o ácido tranexâmico é seguro em pacientes com traumatismo crânio encefálico (TCE) e o tratamento dentro de 3 horas da lesão reduz a morte relacionada ao traumatismo craniano⁵.

Recomenda-se administração de ácido tranexâmico o mais precocemente possível em pacientes traumatizados que estejam sangrando, ou que possuam risco de hemorragia significativa, na dose inicial de 1g - infundido em 10 minutos, iniciado dentro de 3 horas após a lesão^{1,5}, considerando a administração da primeira dose na fase pré-hospitalar do trauma¹.

Custo do tratamento

Estimativa de consumo informada pelo Departamento de Urgência e Emergência: 15 a 20 ocorrências mensais com indicação de uso do ácido tranexâmico.

Tabela 1. Comparação dos valores e média de consumo mensal

Medicamento	Dose	R\$ unitário – média ponderada BPS	R\$ tratamento	CMM	R\$ anual
Ácido tranexâmico 50 mg/mL, amp 5 mL (250mg/amp)	1g (4 ampolas)	R\$ 3,5091	R\$ 14,0364	80	R\$ 3.368,736

Base de dados BPS. Os registros exibidos especificam as compras realizadas nos últimos 18 meses (27-04-2019 a 27/10/2020). Disponível em: <http://bps.saude.gov.br/visao/consultaPublica/relatorios/geral/index.jsf>.

Discussão e Deliberação

Considerando que o uso antecipado do Ácido Tranexâmico no trauma mostra grande benefício e que há disponibilidade da medicação nos hospitais de referência para regulação dos pacientes atendidos nos serviços do SUS, a comissão manifesta-se favorável à inclusão do Ácido Tranexâmico 50mg/ml ampola 5ml, recomendando que esteja disponível no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Referências

1. BRANDÃO, P.F. MACEDO, P.H.A.P. RAMOS, F.S. Choque hemorrágico e trauma: breve revisão e recomendações para manejo do sangramento e da coagulopatia. Revista Médica de Minas Gerais. Vol. 27 supl. 4. 2017. Disponível em: <file:///C:/Documents%20and%20Settings/alpereira/Meus%20documentos/Downloads/v27s4a04.pdf>.
2. ÁCIDO TRANEXÂMICO. Satoro Tabuchi. São Paulo: Blau Farmacêutica S.A. Bula de remédio 25/03/2015. Disponível em: https://www.blau.com.br/storage/app/media/bulas/MOACIR_BULAS/Acido_Tranexamico_Bula_Profissional_Saude.pdf. Acesso em: 29 out 2020.2
3. LUZ, L. et all. Ácido tranexâmico no tratamento da hemorragia no trauma. Rev. Col. Bras. Cir. vol.39 no.1. Rio de Janeiro. 2012. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69912012000100015. Acesso: 29 out 2020.
4. PINTO, M.A. et all. Uso de ácido tranexâmico no trauma: uma análise de custo-efetividade para o uso no Brasil. Artigo de revisão. ABCD Arq Bras Cir Dig Artigo de Revisão. 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/abcd/v29n4/pt_0102-6720-abcd-29-04-00282.pdf. Acesso: 29 out 2020.
5. THE LANCET. Effects of tranexamic acid on death, disability, vascular occlusive events and other morbidities in patients with acute traumatic brain injury (CRASH-3): A randomised, placebo-controlled trial. Articles. Vol. 394, issue 10210, p1713-1723, november 2019 [e-pub]. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)32233-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32233-0). Acesso: 29 out 2020.

ATROPINA

Tecnologia:

Atropina 0,5 mg/mL ampola 1 mL

Pergunta

Considerando as doses de Atropina usadas nos Serviços de Saúde qual a apresentação do medicamento que deve ser padronizada?

Indicação

A atropina é um medicamento indicado para o tratamento da bradicardia além do uso na intoxicação exógena, sendo o antídoto na intoxicação por organofosforados^{1,2,3}.

Contextualização

A atropina é um alcalóide extraído da *Atropa beladonna*^{2,3}. Trata-se de antagonista competitivo das ações da acetilcolina e outros agonistas muscarínicos^{2,3}. Tem ação em receptores existentes nas glândulas exócrinas, músculos liso e cardíaco, gânglios autônomos e neurônios intramurais².

O medicamento é comercializado nas apresentações atropina, solução injetável, 0,25mg/mL e 0,50 mg/mL, conforme tabela 1.

Figura 1. Apresentações comerciais do medicamento atropina, solução injetável

PRINCÍPIO ATIVO	LABORATÓRIO	PRODUTO	APRESENTAÇÃO
SULFATO DE ATROPINA	BLAU FARMACÊUTICA S.A.	ATROPION	0,25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1 ML
SULFATO DE ATROPINA	BLAU FARMACÊUTICA S.A.	ATROPION	0,5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1 ML
SULFATO DE ATROPINA	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACÊUTICA LTDA	PASMODEX	0,25 MG/ML SOL INJ CX 240 AMP PLAS TRANS X 1 ML
SULFATO DE ATROPINA	HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	PASMODEX	0,25 MG/ML SOL INJ IV/IM/SC CX 240 AMP PLAS PE TRANS
SULFATO DE ATROPINA	FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CATROFARMA		0,25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD INC X 1 ML
SULFATO DE ATROPINA	HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARI HYTROPIN		0,50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 1 ML

(ANVISA. Secretaria Executiva – CMED. Lista de preços de medicamentos - preços fábrica e máximos de venda ao governo. 09/06/2020)

Embora padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) na apresentação 0,25 mg/mL, ampola 1mL⁴, não houve sucesso de compra nas últimas licitações municipais para essa apresentação.

Resultado da pesquisa

A atropina é indicada nas seguintes doses:

Adulto¹

Bradicardia: 0,5-1 mg a cada 3-5 min. Dose máxima: 3 mg.

Intoxicação - Atropinização: 2 mg/dose IV ou IM, de 10/10 minuto, no máximo de 3 doses ou conforme conduta médica. Após a estabilização do paciente, pode-se utilizar a infusão contínua na dose de 1,0 mg/hora.

Criança¹

Bradicardia: 0,02mg/Kg. Dose máxima/dose: 0,5mg. Dose total máxima: 1mg.

Intoxicação - Atropinização: 0,01 a 0,03 mg/kg/dose, monitorando a frequência cardíaca. Menos de 7 kg: 0,25 mg IM, de 10/10 min, por até 3 doses; 7 a 18 kg: 0,5 mg IM, de 10/10 min, no máximo de 3 doses. 18 a 41 kg: 1 mg IM, de 10/10 min, por até 3 doses. Após a estabilização do paciente, pode-se utilizar a infusão contínua na dose de 20 a 25mg/kg corporal / hora.

Deliberação

Considerando a necessidade da Atropina no carrinho de emergências dos serviços de saúde e as doses usuais nos Serviços de Saúde fica deliberada a substituição da apresentação Atropina 0,25 mg/ml por Atropina 0,50 mg/ml.

Referências

1. SÃO JOSE DO RIO PRETO. Secretaria Municipal de Saúde, Portaria nº 17 de 04 de julho de 2019. Procede a publicação do Manual de Diluição de Medicamentos Injetáveis. Disponível em: http://saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/arqu/assifarm/2019/portaria_17.pdf. Acesso: 08 jun 2020.
2. ATROPINA. Satoro Tabuchi. São Paulo, Blau Farmacêutica S.A. Bula de remédio. Disponível em: https://www.blau.com.br/storage/app/media/bulas/novas/Bula_Atropion.pdf. Acesso: 08 jun 2020.
3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Formulário terapêutico nacional 2010: Rename 2010/Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/formulario_therapeutico_nacional_2010.pdf. Acesso: 08 jun 2020.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais : Rename 2020 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – Brasília : Ministério da Saúde, 2020.

CANETA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA

Tecnologia: Canetas aplicadoras de Insulina Humana NPH 100 UI/mL - tubete de 3 mL.
Canetas aplicadoras de Insulina Humana Regular 100 UI/mL - tubete de 3 mL.
Agulha 4mm

Indicação

Aplicação de insulina para tratamento de Diabetes Mellitus¹.

Contextualização

Vários estudos que comparam as formas de administração de insulina mostram perfis mais favoráveis com o uso da caneta, quando comparada à seringa, em relação aos parâmetros de preferência, adesão ao tratamento, facilidade de uso, conveniência, manuseio e ajuste de dosagem¹. Dessa forma, a CONITEC recomendou a incorporação da caneta para injeção de insulina no SUS¹. Por conseguinte, os insumos foram disponibilizados para os municípios, pelo Ministério da Saúde, no terceiro trimestre de 2019, juntamente com agulhas de 4 mm para aplicação dos medicamentos².

A caneta de insulina é descartável e disponibilizada já preenchida com o refil de insulina².

De acordo com orientação do Ministério da Saúde, terão acesso aos insumos pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1 e 2 nas faixas etárias especificadas: menores de 16 anos e maiores de 60 anos^{3,4,5}. Os critérios para acesso aos insumos no município de São José do Rio Preto estão estabelecidos na Nota Técnica nº 15/2020⁵.

Deliberação

Atendendo ao parecer da CONITEC e os benefícios do uso das canteas na aplicação de insulina delibera-se a sua inclusão na REMUME.

Referências

1. CONITEC. Caneta para injeção de insulina. Parecer nº 256. Março 2017. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/Relatorio_CanetasInsulina_final.pdf. Acesso: 05 jun 2020.
2. SÃO JOSE DO RIO PRETO. Canetas de insulina para o tratamento de diabetes melito tipo 1. Informe técnico CAF nº 1. Agosto, 2019. Disponível em: http://saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/arqu/arqufunc/2019/informe_caf_01-2019_canetas_insulina_dm_1.pdf. Acesso: 05 jun 2020.
3. BRASIL. Ministério da Saúde Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Coordenação-Geral de Assistência Farmacêutica Básica. Nota técnica nº 204/2019-CGAFB/DAF/SCTIE/MS.

4. BRASIL. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde DAF/SCTIE/MS. Nota técnica nº 71/2020-CGAFB/DAF/SCTIE/MS. Distribuição e critérios para dispensação das canetas aplicadoras de insulina humana NPH, Regular e agulhas. disponível em: <https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/14/nota-tecnica-71-2020-Insulinas-agulhas.pdf>.
5. SÃO JOSE DO RIO PRETO. Atualiza os critérios de dispensação das canetas de insulina para o tratamento do diabetes mellitus, no âmbito do SUS. Assistência Farmacêutica. Informe Técnico nº 15. Maio, 2020. Disponível em:

CLORTALIDONA

Tecnologia:

Clortalidona 25 mg.

Pergunta

Há superioridade de eficácia no uso da Clortalidona em comparação com a Hidroclorotiazida no tratamento da Hipertensão Arterial Resistente (HAR)?

Nome comercial e fabricante

PRINCÍPIO ATIVO	LABORATÓRIO	PRODUTO	APRESENTAÇÃO	TIPO	valor unitario
CLORTALIDONA	NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	HIGROTON	12,5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 42	Novo	0,223
CLORTALIDONA	EMS S/A	CLORTALIDONA	12.5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 60	Genérico	0,153
CLORTALIDONA	BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍ	NEOLIDONA	25 MG COM CT 3 BL AL PLAS TRANS X 14	-	0,229
CLORTALIDONA	VITAMEDIC INDUSTRIA FARM	CLORDILON	25 MG COM CT BL AL PLAS INC X 42	Similar	0,261
CLORTALIDONA	NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	HIGROTON	25 MG COM CT BL AL PLAS INC X 42	Novo	0,389
CLORTALIDONA	EMS S/A	CLORTALIDONA	25 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 60	Genérico	0,268
CLORTALIDONA	BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍ	NEOLIDONA	50 MG COM CT 2 BL AL PLAS TRANS X 14	-	0,354
CLORTALIDONA	NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	HIGROTON	50 MG COM CT BL AL PLAS INC X 28	Novo	0,589
CLORTALIDONA	VITAMEDIC INDUSTRIA FARM	CLORTALIDONA	50 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 28	Genérico	0,269
CLORTALIDONA	VITAMEDIC INDUSTRIA FARM	CLORDILON	50 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 28	Similar	0,319
CLORTALIDONA	EMS S/A	CLORTALIDONA	50 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30	Genérico	0,409
CLORTALIDONA	GERMED FARMACEUTICA LTD	CLORTALIDONA	50 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30	Genérico	0,398

(ANVISA. Lista de preços de medicamentos – preços fábrica e máximos de venda ao governo, 02/10/2020).

Indicação

O medicamento Clortalidona está indicado no tratamento da hipertensão arterial essencial, nefrogênica ou sistólica isolada, como terapia primária ou em combinação com outros agentes anti-hipertensivos¹. Na insuficiência cardíaca congestiva estável de grau leve a moderado, edema de origem específica (edema decorrente de insuficiência venosa periférica crônica) em terapia de curto prazo; ascite decorrente de cirrose hepática em pacientes estáveis; edema decorrente de síndrome nefrótica; tratamento profilático de cálculo de oxalato de cálcio recorrente, em pacientes com hipercalciúria normocalcêmica idiopática¹.

Contextualização

O objetivo primordial do tratamento da hipertensão arterial é a redução da morbidade e da mortalidade cardiovasculares do paciente hipertenso^{2,3} e a escolha do anti-hipertensivo deve considerar a redução da taxa de eventos mórbidos cardiovasculares fatais e não-fatais².

Os diuréticos são eficazes como monoterapia no tratamento da hipertensão arterial^{2,3}. Os diuréticos tiazídicos são superiores na prevenção de doenças cardiovasculares^{2,4}. Devem ser preferidos para início da terapia anti-hipertensiva^{3,4} e são representados pela Hidroclorotiazida, Clortalidona e Indapamida⁵.

Seu mecanismo anti-hipertensivo está relacionado à depleção de volume e à redução da resistência vascular periférica² e o grau da resposta pressórica aos diuréticos depende da capacidade de ativação dos sistemas contra-regulatórios ativados com a diminuição da pressão arterial, principalmente o sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA)⁵.

Os diuréticos tiazídicos exibem diferenças relacionadas à estrutura, à farmacodinâmica e à farmacocinética⁵. Apresentam potência intermediária e reduzem de forma satisfatória a pressão arterial, quando utilizados em baixas doses⁵.

Resultado da pesquisa

A hipertensão arterial resistente (HAR) é definida quando a pressão arterial permanece acima das metas recomendadas com o uso de três anti-hipertensivos de diferentes classes, incluindo um bloqueador do sistema renina-angiotensina (inibidor da enzima conversora da angiotensina) ou bloqueador do receptor de angiotensina (BRA), um bloqueador dos canais de cálcio (BCC) de ação prolongada e um diurético tiazídico (DT) de longa ação em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão⁹.

Estudos populacionais estimam prevalência da Hipertensão arterial resistente (HAR) em 12% da população hipertensa². A nova diretriz de Hipertensão Arterial 2020 apresenta prevalência de HAR de 10 e 20% dos hipertensos, no mundo⁹. No Brasil, um estudo multicêntrico e utilizando o monitoramento ambulatorial da pressão arterial mostrou uma prevalência de HAR de 11,7%⁹.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a terapêutica diurética inadequada é um dos fatores associados à HAR, além da idade mais avançada, afro-descendência, obesidade, síndrome metabólica, diabetes melitus, sedentarismo, nefropatia crônica e hipertrofia ventricular esquerda^{2,9}. O uso correto de diuréticos para assegurar controle da expansão volêmica é essencial, sendo que mais da metade dos pacientes pode alcançar a meta pressórica com otimização do diurético^{2,9}.

Atualmente, clortalidona é preferível à hidroclorotiazida no tratamento dos casos de hipertensão arterial resistente (HAR)^{3,5,9} e há estudos sugerindo que a clortalidona pode ser o diurético tiazídico de escolha para hipertensão em pacientes com alto risco de eventos cardiovasculares⁷. Conforme posicionamento Brasileiro sobre HAR⁹, deve ser utilizado um diurético tiazídico de longa ação e maior potência, como a clortalidona em lugar da hidroclorotiazida, em doses adequadas ao controle da volemia, de 12,5 a 50 mg, em dose única pela manhã⁹.

Comparação de Custo

Consumo de Hidroclorotiazida: 485.000 cp/mês (média outubro/2020).

Considerando 12% do consumo atual de Hidroclorotiazida, seriam consumidos cerca de 60.000 comprimidos de Clortalidona 25mg, custo anual estimado de R\$ 124.000,00, considerando valor de média ponderada do banco de preços.

Destacamos que o valor da aquisição municipal de Hidroclorotiazida 25mg foi de R\$ 0,014, em 2020.

Tabela 01. Comparação de custo de Clortalidona 25 mg e hidroclorotiazida 25 mg no tratamento da HAR.

Medicamento	CMM tiazídico	diurético	R\$ média ponderada Banco de Preços	R\$ mensal	R\$ anual
Hidroclorotiazida 25mg	485.000		R\$ 0,0201	R\$ 9.748,50	R\$ 116.982,00
Clortalidona 25mg (100% HCTZ)	485.000		R\$ 0,1766	R\$ 85.651,00	R\$ 1.027.812,00
Clortalidona 25mg (HAR 12%)	58.200		R\$ 0,1766	R\$ 10.278,12	R\$ 123.337,44
Clortalidona 25mg (HAR 12% 2cp)	116.400		R\$ 0,1766	R\$ 20.556,24	R\$ 246.674,88
Clortalidona 50mg (100% HCTZ)	116.400		R\$ 0,2014	R\$ 23.442,96	R\$ 281.315,52

(Banco de Preços. Os registros dos últimos 18 meses, período: 23-04-2019 a 23/10/2020. Disponível em: <http://bps.saude.gov.br/visao/consultaPublica/relatorios/geral/index.jsf>. Acesso em: 23/10/2020.)

Discussão e Deliberação

Concluimos que a Clortalidona é mais eficaz que a Hidroclorotiazida no tratamento da HAR. Dessa forma, fica deliberado pela incorporação da Clortalidona 25mg, comprimido, na REMUME 2021, para Hipertensão Arterial Resistente (HAR).

Referências

1. Hicroton, clortalidona. Flavia Regina Pegorer. São Paulo: Novartis Biociências S.A. Bula de remédio, 22/12/2014. Disponível em: <https://pro.consultaremedios.com.br/bula/hicroton>.
2. Sociedade Brasileira de Cardiologia. 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. 2016. Disponível em: http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2016/05_HIPERTENSAO_ARTERIAL.pdf.
3. Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Consensos e Diretrizes. Tratamento Medicamentoso. Capítulo 5. Copyright 13/01/2020. Disponível em: <http://departamentos.cardiol.br/dha/consenso3/capitulo5.asp>. Acesso: 10 jan 2020.
4. Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA : the journal of the

- American Medical Association. 2002. Disponível em: <https://www.epistemonikos.org/pt/documents/63cf790d125c9fe785dabf3b56c3b917a4dde8cf>. 09 janeiro 2020.
5. O uso de diuréticos tiazídicos no tratamento HAS reduzem os eventos cardiovasculares? Há diferença de eficácia entre a hidroclortiazida e clortalidona? Programa Nacional de Telessaúde Brasil Redes. Núcleo de Telessaúde Rio Grande do Sul | 03 dez 2014 | ID: sof-15325. Disponível em: <https://aps.bvs.br/aps/o-uso-de-diureticos-tiazidicos-no-tratamento-has-reduzem-os-eventos-cardiovasculares-ha-diferenca-de-eficacia-entre-a-hidroclortiazida-e-clortalidona/>
 6. MOREIRA, G. C. CIPULLO, J. P. VILELA-MARTIN, J. F. Existem diferenças entre os diversos diuréticos? Are there differences among the several diuretics? 2013. Disponível em: http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/03/881677/rbh_v20n2_55-62.pdf.
 7. DORSCH MP, GILLESPIE BW, ERICKSON SR, BLESKE BE, WEDER AB. Chlorthalidone reduces cardiovascular events compared with hydrochlorothiazide: a retrospective cohort analysis. Hypertension. 2011 Apr;57(4):689-94. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.110.161505. Epub 2011 Mar 7. PMID: 21383313. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21383313/>. Acesso: out 2020.
 8. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais : Rename 2020 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – Brasília : Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: <http://conitec.gov.br/images/Rename-2020-final.pdf>. Acesso out 2020.
 9. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Posicionamento Brasileiro sobre Hipertensão Arterial Resistente – 2020. Arq Bras Cardiol. 2020. Disponível em: <http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/2020/v11403/pdf/11403028.pdf>.

ESPIRAMICINA

Tecnologia: Espiramicina 1,5mui - comprimido revestido

Fabricantes

SUBSTÂNCIA	LABORATÓRIO	PRODUTO	APRESENTAÇÃO	CLASSE TERAPÉUTICA
ESPIRAMICINA	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA.	ROVAMICINA	1,5 MUI COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 16	J01F0 - MACROLÍDEOS E SIMILARES

Indicação

Toxoplasmose gestacional (gestante com infecção aguda) e pacientes imunodeprimidos com infecção aguda².

Contextualização

A partir da publicação da Portaria n° 1.897, de 26 de julho de 2017, que estabelece a versão 2017 da RENAME, os medicamentos para tratamento de toxoplasmose, dentre eles a espiramicina, passaram a compor a Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica, com financiamento e aquisição centralizados no Ministério da Saúde^{1,2}.

Dessa forma, a dispensação da espiramicina, anteriormente realizada através das farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, passou a ser realizada pelas farmácias dos serviços de saúde municipais, a partir de julho 2020.

A Toxoplasmose é uma infecção causada pelo *Toxoplasma gondii*. Após a infecção aguda, o parasita persiste por toda a vida do hospedeiro sem apresentar repercussões clínicas em pessoas imunocompetentes, podendo reativar se a pessoa tornar-se imunossuprimida. As principais vias de transmissão são: oral (água e alimento contaminados) e congênita (vertical). Assim, todas as gestantes devem ser instruídas sobre os cuidados de prevenção primária³.

A espiramicina não atravessa a barreira placentária, tendo efeito de impedir ou retardar a passagem do *Toxoplasma gondii* para o feto, diminuindo ou evitando o acometimento do mesmo⁴. Portanto, não está indicada quando há certeza ou mesmo probabilidade muito grande de infecção fetal (como quando a gestante adquire a infecção após a 30ª semana)⁴. Nesses casos, está indicado o tratamento tríplice, que atua sobre o feto⁴.

O dano ao feto é frequentemente mais grave quanto mais cedo ocorrer a transmissão, podendo causar aborto espontâneo, óbito fetal, microcefalia e outras sequelas no recém-nascido. Embora muitas crianças infectadas durante a gestação não apresentem sinais e sintomas no momento do nascimento podem desenvolver sequelas tardias, como perda da visão, deficiência mental e convulsões³.

Atualmente não existem registros dos medicamentos para atendimento do público pediátrico, sendo a formulação magistral o método mais adequado de atendimento dos pacientes³.

Considerando que, geralmente, a doença evolui benignamente em indivíduos imunocompetentes, não é recomendado o tratamento nestes casos nem como profilaxia³.

Resultado da pesquisa⁴

Confirmada a infecção aguda (IgM) antes da 30^a semana, deve-se manter a espiramicina na dose de 1g (3.000.000 UI) de 8 em 8 horas, via oral, continuamente até o final da gravidez.

Se a infecção se der após a 30^a semana, recomenda-se instituir o tratamento tríplice materno: pirimetamina, 25mg de 12 / 12 horas por via oral; sulfadiazina, 1.500mg de 12 / 12 horas por via oral; e ácido fólico, 15mg/dia, este imprescindível para prevenção de aplasia medular causada pela pirimetamina.

Se no primeiro exame solicitado na primeira consulta detecta-se anticorpos IgM, caso a gestação tenha menos de 16 semanas, deve ser feito imediatamente o teste de avidéz de IgG, na mesma amostra de soro.

Na presença de baixa avidéz, pode-se estar diante de uma infecção aguda; a paciente deve ser chamada e o tratamento com espiramicina deve ser iniciado imediatamente.

Na presença de alta avidéz, deve-se considerar como diagnóstico de infecção antiga, não havendo necessidade de tratamento nem de testes adicionais.

Nos exames realizados após 16 semanas de gestação, não há necessidade do teste de avidéz, pois mesmo uma avidéz alta não descartaria infecção adquirida durante a gestação.

Deliberação

Diante da disponibilização da Espiramicina através do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica fica deliberada a sua inclusão na REMUME.

Referências

1. BRASIL. Ministério da saúde. Nota técnica nº 249/2018-cgafme/daf/sctie/ms. Disponível em: https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/principal/2018/11/Nota_Tecnica_n249-2018-disponibilizacao_medicamentos_toxoplasrose.html. Acesso: 06 jul 2020.
2. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE NOTA TÉCNICA Nº 36-SEI/2017-CGAFME/DAF/SCTIE/MS. Disponível em: <http://www.saude.sc.gov.br/index.php/informacoes-gerais-documentos/vigilancia-em-saude/assistencia-farmacutica/componente-estrategico/toxoplasrose/16148-nota-tecnica-n-36-sei2017-cgafme-daf-sctie-ms/file>. Acesso: 06 jul 2020.

3. Ministério da Saúde. Nota técnica nº 249/2018 – CGAFME/DAF/SCTIE/MS. Disponível em: https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/principal/2018/11/Nota_Tecnica_n249-2018-disponibilizacao_medicamentos_toxoplasnose.html. Acesso: 06 jul 2020.
4. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gravidez de Alto Risco. Brasília, 2010. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gestacao_alto_risco.pdf.

MEDICAMENTOS PARA SEDAÇÃO E INTUBAÇÃO DE PACIENTES EM LEITO COVID-19

Indicação

Medicamentos para a sedação, intubação e tratamento de pacientes em serviços municipais internados em Leitos para a Covid-19.

Contextualização

Os medicamentos descritos na tabela 01 foram incluídos na assistência farmacêutica do Município, excepcionalmente, considerando a pandemia do Covid-19, conforme Decreto nº 18.571/20 que declarou a Calamidade Pública no Município.

Tabela 01. Tecnologias disponibilizadas durante a Pandemia Covid-19.

Descrição	Apresentação	Indicação
Atracurio, besilato 10mg/ml	ampola 5ml	Bloqueador neuromuscular, não despolarizante
Dextrocetamina 50mg/ml	frasco 10ml	Analgesia e sedação.
Dexmedetomidina, cloridrato 100 mcg/ml	ampola 2ml	Sedativo.
Dobutamina 12,5mg/ml	ampola 20ml	Droga vasoativa.
Fentanila 0,05mg/ml	ampola 10ml	Analgesia e anestesia.
Meropeném 1 g	frasco ampola	Antibiótico
Midazolam 5mg/ml	ampola 10ml	Sedativo hipnótico.
Naloxona, cloridrato 0,4 mg/ml	ampola 1 ml	Antídoto opiáceo.
Norepinefrina, hemitartrato 2mg/ml	ampola 4ml	Droga vasoativa.
Pancurônio 2mg/ml	ampola 2 ml	Bloqueador neuromuscular, não despolarizante
Piperacilina 4 g + Tazobactam 0,5 g	frasco ampola	Antibiótico
Propofol 10 mg/ml	ampola 20ml	Sedativo hipnótico.
Rocurônio 10mg/ml	ampola 5ml	Bloqueador neuromuscular, não despolarizante
Vasopressina 20 U/ml	ampola 1 mL	Vasopressor.

Deliberação

Os medicamentos serão disponibilizados nos serviços municipais com leitos de internação para Covid-19, conforme necessidade e complexidade de cada serviço.

Referências

SÃO JOSE DO RIO PRETO. Decreto nº 18.571 de 24 de março de 2020. Reconhece estado de calamidade pública no Município de São José do Rio Preto decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19) e estabelece medidas de enfrentamento. Disponível em: https://www.riopreto.sp.gov.br/wp-content/uploads/arquivosPortalGOV/coronavirus/DECRETO_N_18571.pdf. Acesso: 11 janeiro 2021.

NOREPINEFRINA

Tecnologia: Norepinefrina, hemitartrato 2mg/ml, ampola 4ml

Fabricantes

SUBSTÂNCIA	LABORATÓRIO	PRODUTO	APRESENTAÇÃO	TIPO DE PRODUTO (STATUS DO)
HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA	HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA	2 MG/ML SOL INJ IV CX 50 AMP VD AMB X 4 ML (EMB HOSP)	Genérico
HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA	2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML	Genérico
HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA	NOVAFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA	2 MG/ML SOL INJ IV CX 50 AMP VD AMB X 4 ML	Genérico
HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA	HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA	HYPONOR	2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML (REST HOSP)	Novo
HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	NORADREM	2 MG/ML SOL DIL INFUS IV CX 10 AMP VD AMB X 4 ML	Similar

(ANVISA. Secretaria Executiva – CMED. Lista de preços de medicamentos. Publicada em 10/11/2020. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/listas-de-precos>. Acesso: 02 dez 2020)

Pergunta

A Norepinefrina é a droga vasoativa necessária para o atendimento dos pacientes nas Unidades de Pronto Atendimento?

Indicação

A noradrenalina é uma catecolamina simpaticomimética de ação direta em receptores alfa-adrenérgicos, em receptores beta-1-adrenérgicos e, em menor grau, em receptores beta-2-adrenérgicos¹. Sua atividade alfa-agonista adrenérgica induz vasoconstrição periférica, o que aumenta a pressão arterial sistólica e diastólica, acompanhada da diminuição reflexa da frequência cardíaca¹. Pode ser usada em situações de emergência de hipotensão, como o choque, assim como na parada cardíaca¹. Indicada no choque cardiogênico, principalmente como decorrência do infarto agudo do miocárdio assim como no tratamento inicial do choque hipovolêmico grave, até que ocorra o restabelecimento da volemia, com a terapia de reposição de fluidos².

Contextualização

Drogas vasoativas são substâncias com efeitos vasculares periféricos, pulmonares ou cardíacos, diretos ou indiretos³. Apresentam respostas dose dependentes de efeito rápido ou curto e geralmente são usadas para regular a frequência cardíaca e o volume sistólico³. As catecolaminas são

drogas vasoativas, com atividade simpatomimética e temos como representantes a adrenalina, a dopamina (precursor imediato da noradrenalina) e a norepinefrina (precursor da adrenalina), entre outras³.

Resultado da pesquisa

As drogas vasoativas, como a adrenalina, dopamina e norepinefrina são utilizadas principalmente para manter a homeostase orgânica e tissular e é essencial o conhecimento sobre a indicação, modo de uso e titulação de cada droga conforme resposta clínica desejada para a resposta adequada ao tratamento^{2,3}. O monitoramento hemodinâmico é fundamental para uso desses medicamentos².

Em estudo de revisão de literatura comparando os efeitos da dopamina e da noradrenalina no tratamento do choque séptico foi possível afirmar que os efeitos da dopamina e noradrenalina foram capazes de aumentar o fluxo sanguíneo renal e não demonstraram alteração na depuração de creatinina⁴. A dopamina parece não demonstrar eficácia na proteção ou tratamento da falência renal em pacientes críticos e seu efeito natriurético pode causar isquemia renal⁴. Além disso, pode apresentar efeitos deletérios em pacientes normo ou hipovolêmicos, decorrente da sua ação diurética⁴. A noradrenalina foi efetiva no restabelecimento da pressão arterial média (PAM) e capaz de manter inalterado o fluxo sanguíneo renal com PAM acima de 70 mmHg⁴. A dopamina apresentou maior número de desfechos negativos como mortalidade e reações adversas, sendo apontadas as taquidismias como os principais fatores associados⁴.

Apesar de não existir diferença estatisticamente significativa, quanto à mortalidade, ensaio clínico de boa qualidade metodológica sugere que o risco de reações adversas é menor com o uso da noradrenalina, comparado ao da dopamina¹.

A noradrenalina em acesso central deve ser utilizada na diluição de 64mcg/ml (4 ampolas em 238 ml de soro glicosado 5%) e em acesso periférico, 32mcg/ml (2 ampolas em 242 ml de soro glicosado 5%).

Discussão e Deliberação

Deliberado pela inclusão da noradrenalina como droga vasoativa de escolha no tratamento da hipotensão aguda.

Referências

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Formulário terapêutico nacional 2010: Rename 2010/Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. FTN, 2010. Disponível em: http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/formulario_terapeutico_nacional_2010.pdf
2. FONSECA, J. C. L. Drogas Vasoativas uso racional. Artigo de revisão. Hospital Cardiobarra. 2001. Rev Socerj, Vol XIV Nº 2. Disponível em: http://sociedades.cardiol.br/socerj/revista/2001_02/a2001_v14_n02_art07.pdf. Acesso: 25 nov 2020.
3. Drogas vasoativas mais utilizadas na terapia intensiva. Farmacologia UEFS. Website. Disponível em: <https://farmacologiauefs.wordpress.com/topicos-gerais/drogas-vasoativas-mais-utilizadas-em-unidades-de-terapia-intensiva/>. Acesso: 25 nov 2020.

4. MIRANDA, M. P. F. SORIANO, F. G. SECOLI, S. R. Efeitos de dopamina e noradrenalina no fluxo sanguíneo regional no tratamento do choque séptico. Revista Brasileira de Terapia Intensiva 49 Vol. 20 N° 1. Janeiro/Março, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rbti/v20n1/a08v20n1.pdf>

RISPERIDONA

Tecnologia: Risperidona 1 mg, comprimido

Pergunta

Para a garantia da dose posológica, conforme protocolo municipal vigente para o tratamento do transtorno desafiador opositor (TOD) e transtorno de conduta, a inclusão do medicamento risperidona na apresentação comprimido 1 mg é custo efetiva?

Indicação

O medicamento risperidona pertence à classe dos antipsicóticos atípicos, sendo indicada quando há resistência ou intolerância aos antipsicóticos típicos¹. Trata-se de antagonista seletivo de dopamina e serotonina, tendo alta afinidade pelos receptores serotoninérgicos 5HT₂ e dopaminérgicos D₂^{1,2}. Indicado no tratamento de psicoses, tendo um efeito favorável sobre certo número de transtornos relacionados ao pensamento, às emoções e/ou às atividades, incluindo comportamentos inadequados ou agressivos¹. Tem ação significativa no tratamento dos transtornos de conduta¹.

Contextualização

A risperidona pertence à lista de Assistência Farmacêutica do SUS, sendo disponibilizada através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) nas apresentações comprimido 1mg, 2mg e 3mg², para o tratamento de Esquizofrenia (CID10: F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8)³, Transtorno Esquizoafetivo (CID10: F25.0, F25.1 e F25.2)⁴, Transtorno afetivo bipolar (F31.1, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F31.6 F31.7)⁵ e Transtorno do Espectro do Autismo (F84.0, F84.1, F84.3, F84.5 e F84.8)⁶.

Medicamento padronizado em atenção a protocolo municipal, em 2018, para tratamento do Transtorno de conduta (CID F91.0, F91.1, F91.2, F91.3, F91.8, F91.9)¹. Estão disponíveis, atualmente, na REMUME, as apresentações risperidona solução oral 1mg/ml, frasco 30ml e risperidona 2mg, comprimido sulcado, porém os fabricantes informam em bula que o comprimido não pode ser partido.

Resultado da pesquisa

O esquema de administração consiste em¹:

Tabela 1. Dose indicada de risperidona conforme peso.

Grupo de acordo com o peso	Dose diária inicial (dias 1 a 3)	Dose diária de manutenção (dia 4 em diante)	Aumento de dose, se necessário.	Faixa terapêutica
< 20 kg	0,25 mg	0,50 mg	Aumento de 0,25 mg em intervalos ≥ 2 semanas	0,5 mg a 1,50 mg
≥ 20 kg	0,50 mg	1,0 mg	Aumento de 0,50 mg em intervalos ≥ 2 semanas	1,0 mg a 2,50 mg (a)
Adultos	2,00 mg	2 a 6 mg/dia		2 mg a 6 mg

(a) Apesar de indicada a mesma dose inicial, indivíduos com peso maior que 45 kg podem necessitar de doses maiores (dose máxima de 3,5 mg/dia). Fonte: Adaptado de Janssen-Cilag, 2015⁷.

Dose máxima: até 6mg. Após, substituir a medicação.

Posologia: O medicamento risperidona pode ser administrado uma ou duas vezes ao dia. Os pacientes que apresentarem sonolência podem se beneficiar de uma mudança na administração de uma vez ao dia para duas vezes ao dia ou uma vez ao dia ao deitar-se.

Pesquisa de preço:

Tabela 2. Custo do medicamento risperidona conforme apresentação

código	medicamento	unidade	CMM	R\$ unitário
76382	risperidona 2mg comprimido sulcado	comprimido	1500	0,1400*
76383	risperidona 1 mg/ml solução oral	frasco 30ml	45	4,989* (1ml=0,1663)
	risperidona 1mg	comprimido		0,1011**

*Valores de compras municipais

**Base de dados BPS - registros das compras realizadas no período: 09-03-2019 a 09/09/2020⁸.

Consumo por faixa etária:

Tabela 3. Dispensação risperidona 1mg/ml no período de janeiro a agosto 2020.

idade	nº dispensações	nº pacientes	% dispensação
4	20	6	12,42%
5 a 10	115	41	71,43%
11 a 16	19	9	11,80%
18	5	1	3,11%
40	1	1	0,62%

Relatório BI – risperidona 1mg/ml sol. Oral. Período janeiro a agosto 2020⁹.

Tabela 4. Número de frascos de risperidona 1mg/ml dispensados no período de janeiro a agosto 2020 e estimativa de dose.

nº frascos	nº dispensações	volume em ml	% dispensação	Dose diária estimada (considerando dispensação para 2 meses)
1	47	30	29,19%	0,5
2	76	60	47,20%	1
3	11	90	6,83%	1,5
4	15	120	9,32%	2
5	2	150	1,24%	2,5
6	4	180	2,48%	3
7	0	0	0,00%	0
8	1	240	0,62%	4
9	3	270	1,86%	4,5
10	1	300	0,62%	5

Relatório BI – risperidona 1mg/ml sol. Oral. Período janeiro a agosto 2020⁹.

Discussão e deliberação

Diante das doses previstas para o tratamento do TOD e da análise do custo das diferentes apresentações fica deliberado a inclusão da Risperidona 1 mg comprimido na REMUME.

Referências

1. SÃO JOSE DO RIO PRETO. Secretaria de Saúde. Portaria N° 22 de 20 de agosto de 2018. Estabelece o uso do medicamento risperidona no o tratamento do transtorno desafiador opositor e transtorno de conduta no âmbito municipal.
2. BRASIL. Ministério da Saúde Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. Risperidona no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Relatório de Recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC – 123 Risperidona. Setembro de 2014. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/Risperidona_FINAL.pdf.
3. BRASIL. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. Portaria SAS/MS n° 364, de 9 de abril de 2013. Disponível em: <http://www.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdt-esquizofrenia-livro-2013.pdf>
4. BRASIL. Transtorno Esquizoafetivo Portaria SAS/MS n° 1203, de 04 de novembro de 2014. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/aceso-rapido/medicamentos/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento/221_risperidona_transtornoesquizoafetivo_v9.pdf.
5. BRASIL. Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I Portaria SAS/MS n° 315, de 30 de março de 2016. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/aceso-rapido/medicamentos/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento/264_risperidona_transtornoafetivobipolar_v9.pdf
6. BRASIL. Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro do Autismo Portaria SAS/MS n° 324, de 31 de março de 2016. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/aceso-rapido/medicamentos/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento/265_risperidona_transtornoespectroautismo_v10.pdf.
7. RISPERDAL. Farm. Resp.: Marcos R. Pereira. São Paulo: JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA. Bula de remédio 18/03/2015. Disponível em: <http://cdn.remediobarato.com/pdf/b607a5434bfe7c5ead3d4165d145a2c1.pdf>.
8. Banco de Preços em Saúde. Disponível em: <http://bps.saude.gov.br/visao/consultaPublica/relatorios/geral/index.jsf>.
9. Relatório BI. Risperidona 1mg/ml sol. Oral. Janeiro a agosto 2020. Disponível em: <http://analytics.empro.com.br/>.

SALBUTAMOL GOTAS PARA INALAÇÃO

Tecnologia: Salbutamol, sulfato 5 mg/mL - gotas para inalação - frasco 10 mL

Fabricantes

SUBSTÂNCIA	LABORATÓRIO	PRODUTO	APRESENTAÇÃO	CLASSE TERAPÊUTICA
SULFATO DE SALBUTAMOL	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	AEROLIN	5 MG/ML SOL P/NEBUL CT FR VD AMB X 10 ML	R03A4 - ANTIASMÁTICOS/DPOC AGONISTAS B2 CURTA AÇÃO INALANTE

(ANVISA. Secretaria Executiva – CMED. Lista de preços de medicamentos. Publicada em 01/05/2020. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/listas-de-precos>. Acesso: 28 mai 2020)

Pergunta

O Salbutamol 5mg/ml é o medicamento inalatório eficaz no tratamento do broncoespasmo para substituição do Fenoterol 5 mg/ml?

Indicação

O salbutamol pertence à classe dos beta-agonistas de curta duração¹. Indicado para o controle e prevenção da asma brônquica, bem como para o tratamento de outras condições nas quais possa ocorrer obstrução reversível das vias aéreas, tais como bronquite crônica e enfisema² além da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica exacerbada³.

Contextualização

Os broncodilatadores beta-agonistas de curta ação constituem o tratamento de primeira linha para a crise asmática⁴, sendo utilizados para alívio dos sintomas¹. A administração inalatória é a via de eleição, podendo ocorrer com uso de aerossol dosimetrado (spray) ou por nebulização, com fluxo contínuo de ar comprimido^{5,6,7}. O Salbutamol está incluído como medicamento para manejo da asma aguda nas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma, publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia¹.

Resultado da pesquisa

O medicamento Salbutamol é descrito para uso em pacientes adultos e pediátricos^{2,3}. Além disso, na gestante, é o beta-agonista de curta ação de escolha¹. Esse medicamento é considerado como classe A, tanto para gestação, quanto para amamentação, pela *Therapeutic Goods Administration – Department of Health Australian Government*⁴.

O tempo estimado de início de ação da solução para nebulização é de 5 minutos².

É indicado na seguinte posologia:

Pacientes adultos^{2,3}

- Asma e broncoespasmo: dose usual é de 10-20 gotas (2,5 a 5 mg) diluídas em 3-5 mL de soro fisiológico, repetir a cada 20 minutos na primeira hora. Após, repetir entre 1 e 4 horas.

- Exacerbação de DPOC: salbutamol ou fenoterol: 10 gotas (2,5 mg) diluídas em 3 a 5 mL de soro fisiológico; realizar três inalações a cada 15-20 minutos ou mesmo contínuas. Após as primeiras 3 inalações, espaçar as inalações em 1/1 hora ou mais, aumentando o tempo de intervalo conforme a melhora do paciente. Atualmente a maioria dos autores recomenda que a dose de salbutamol não ultrapasse 10 gotas em cada inalação.

Pacientes pediátricos¹

- Asma (nebulização): 0,07-0,15 mg/kg a cada 20 min, por 3 doses; dose máxima: 5 mg (1 mL)

Custo do tratamento

Tabela 1. Comparação de valores: broncodilatadores de curta duração

Medicamento	Apresentação	R\$ municipal	R\$ BPS*	Dose adulto	Rename
Salbutamol, sulfato 5mg/mL solução para inalação	Frasco 10 mL	-	10,3952	10-20 gotas (2,5 a 5 mg) ² (1mL = 5mg) ² 1 dose de 5mg = R\$1,0395	Sim / componente básico ¹⁰
Fenoterol 5mg/mL	Frasco 20 mL	2,56	3,2974	10-20 gotas (2,5 a 5 mg) ¹¹ (20 gotas = 1mL = 5mg) ¹¹ 1 dose de 5mg = R\$ 0,1649	Não

*média ponderada 18 meses (Banco de Preço em Saúde)

O consumo médio mensal do fenoterol no município de São José do Rio Preto é de 105 frascos/mês.

Discussão e Deliberação

Considerando a descontinuação da fabricação do medicamento fenoterol⁹.

Considerando que o Salbutamol 5mg/mL é um medicamento com propriedades farmacêuticas similares às do Fenoterol e que é indicado para o tratamento das mesmas condições clínicas¹, sendo descrito, pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, como medicamento para manejo da asma aguda¹.

Considerando que o Salbutamol 5mg/mL solução para inalação esta compreendido na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)¹⁰.

Fica deliberado a inclusão do medicamento Salbutamol 5mg/mL solução para inalação na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME).

Referências

1. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma – 2012; J Bras Pneumol. v.38, Suplemento 1, p.S1-S46 Abril 2012. Disponível em: https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/publisher.gn1.com.br/jornaldepneumologia.com.br/pdf/Suple_20_70_38_completo_versao_corrigida_04-09-12.pdf. Acesso: 03 jun 2020.
2. AEROLIN, sulfato de salbutamol. Farm. Resp.: Edinilson da Silva Oliveira GlaxoSmithKline Brasil Ltda. Bula de remédio. Disponível em: https://br.gsk.com/media/535924/rec_1501210706433718165_bl_aerolin_solneb_gds24ipi07_10105.pdf. Acesso: 03 jun 2020.
3. Medicina de emergência: abordagem prática/ professor titular e coordenador Iríneu Tadeu Velasco; editor chefe Rodrigo Antonio Brandão Neto ; editores Heraldo Possolo de Souza ... [et ai.]. - 13. ed., rev., atual. e ampl. - Barueri [SP]: Manole, 2019.
4. ZOPPI, D. Asma: abordagem da crise aguda na emergência. Revista QualidadeHC. Ribeirão Preto, 2017. Disponível em: <http://www.hcrp.usp.br/revistaqualidade/uploads/Artigos/158/158.pdf>. Acesso: 27 mai 2020. Acesso: 03 jun 2020.
5. DALCIN, PTR. PERIN, C. Manejo da asma aguda em adultos na sala de emergência emergência: evidências evidências atuais. Rev Assoc Med Bras. Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/ramb/v55n1/v55n1a21.pdf>. Acesso: 28 mai 2020.
6. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Tratamento da Crise de Asma no Pronto Socorro. Temas em Revisão. Disponível em: http://itarget.com.br/newclients/sbpt.org.br/2011/downloads/arquivos/Revisoes/REVISAO_04_TRATAMENTO_CRISE_ASMA_PRONT_O_SOCORRO.pdf. Acesso: 28 mai 2020.
7. COELHO, F.R. Conduas no primeiro atendimento a pacientes admitidos com quadro de broncoespasmo agudo: proposta de um protocolo de atendimento na Unidade de Saúde de Torres de São Sebastião. Universidade Federal de Minas Gerais, 2014. Disponível em: <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/6294.pdf>. Acesso: 28 mai 2020.
8. Prescrição de medicamentos no banco de dados da gravidez. Australian Government. Departmente of healt. Therapeutic goods administration. Disponível em: <https://www.tga.gov.au/prescribing-medicines-pregnancy-database>. Acesso: 03 jun 2020.
9. PAINEL: (ANVISA. Painel de Descontinuação de Medicamentos. Disponível em: <https://sad.anvisa.gov.br/MicroStrategy/servlet/mstrWeb>. Acesso: 27 mai 2020.
10. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais : Rename 2020 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – Brasília : Ministério da Saúde, 2020.
11. BEROTEC. Farm. Resp.: Ana Carolina Scandura Cardillo. Itapeperica da Serra: Boehringer Ingelheim do Brasil Quím. e Farm. Bula de remédio, 28/01/2019. Disponível em: https://www.boehringer-ingelheim.com.br/sites/br/files/documents/berotec_bula_paciente_e_profissional_0.pdf. Acesso: 27 mai 2020.

TRAMADOL E IBUPROFENO

Tecnologia: Tramadol 50 mg/mL, ampola 2 mL
Ibuprofeno 600 mg, comprimido

Pergunta

Ibuprofeno e tramadol são medicamentos necessários para o adequado escalonamento da dor nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA)?

Indicação

O ibuprofeno é um derivado do ácido propiônico com propriedades anti-inflamatória, analgésica e antitérmica¹, indicado no tratamento da dor leve a moderada, incluindo cefaleia e dismenorreia, febre e tratamento de inflamações musculoesqueléticas¹.

O Tramadol é um opiáceo indicado para tratamento da dor de intensidade moderada a grave².

Contextualização

A Escada Analgésica da Organização Mundial da Saúde (OMS) sugere a organização e padronização do tratamento analgésico de acordo com a intensidade de dor que o paciente apresenta, sendo a escala de tratamento orientada pela intensidade da dor em leve, moderada e intensa³.

São recomendados analgésicos simples e anti-inflamatórios para dores fracas, opioides fracos (associados ou não a analgésicos ou anti-inflamatórios), para dores moderadas e opioides fortes para dores fortes³.

Assim, consideram-se opioides fracos aqueles que apresentarem efeito teto, ou seja, acima de determinada dose não há mais efeito analgésico, só aumentam os efeitos colaterais⁴. São exemplos de opioides fracos a codeína e o tramadol. Para os opioides fortes (como a morfina) não existe limite de dosagem sendo considerada máxima a dose que consegue o melhor equilíbrio entre analgesia e efeitos colaterais⁴.

Resultado da pesquisa

Entre os anti-inflamatórios não-esteroidais, o ibuprofeno apresenta o menor risco gastrointestinal e é recomendado como representante de primeira escolha no tratamento da dor¹, sendo usado em doses entre 200 a 600 mg, por via oral, a cada 6 a 8 horas, em adultos. Dose máxima: 2,4 g/dia e 3,2 g/dia em doenças inflamatórias¹.

Com relação a opioides, caso ocorra o uso da dose máxima de um fármaco, sem efeito analgésico satisfatório ou aparecimento de efeitos adversos intoleráveis, recomenda-se a substituição por um outro opioide da mesma potência⁴, procedimento este que pode ser chamado de rotação de opioide⁴.

O tramadol é o segundo fármaco pertencente à classe de opióides fracos. É eficaz preferencialmente na dor neuropática⁴. Sua dose usual é de 50 a 100mg, de 4/4 ou 6/6 horas, sendo a dose diária máxima recomendada de até 400 mg^{2,4}. Estudos indicam que sua potência analgésica é de

1/10 da morfina e sua dose de 50mg é equivalente a 30mg de codeína⁴. Doses maiores que 400 mg/dia aumentam o risco de convulsões, porém o uso deste fármaco apresenta menor efeito adverso como constipação intestinal, depressão respiratória e dependência, quando comparado a outros opióides, como a codeína⁴.

A morfina é o fármaco de escolha para o controle da dor intensa⁴. Sua dose analgésica varia de 5mg até mais de 200mg, a cada 4 horas, mas na maioria dos casos, a dor é controlada com doses de 10 a 30mg⁴. A escolha da dose adequada é o equilíbrio entre o controle da dor com mínimos efeitos adversos possíveis⁴.

Tabela 1. Comparação de preços dos medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios para Protocolo da dor.

Medicamento	Apresentação	Valor unitário
Ibuprofeno 600 mg*	Comprimido	R\$ 0,49412
Ibuprofeno 600 mg*	Comprimido revestido	R\$ 0,690218
Ibuprofeno 600 mg*	Cápsula gelatinosa mole	R\$ 0,65938
Diclofenaco 25 mg/mL**	Ampola 3 mL IM	R\$ 0,5400
Tenoxicam 10 mg/mL**	Ampola 2mL IM/EV	R\$ 3,9000
Cetoprofeno 100mg pó liofilico **	Frasco ampola EV	R\$ 2,5000
Codeína 30 mg**	Comprimido	R\$ 0,7170
Morfina 10 mg/mL**	Ampola 1 mL	R\$ 2,2300
Morfina 1 mg/mL**	Ampola 2 mL	R\$ 5,0900
Tramadol 50 mg/mL**	Ampola 1 mL	R\$ 0,9900

* BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Preços máximos de medicamentos por princípio ativo, para compras públicas preço fábrica (pf) e preço máximo de venda ao governo (pmvg). Atualizada em 01/10/2019 Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/listas-de-precos>. Acesso em: 14 Novembro 2019.

** SJRP. AquisiçõesMunicipais.SICOM.

Discussão Foi identificada a necessidade de padronização de anti-inflamatório não esteroideal para uso em pacientes alérgicos ao diclofenaco, já padronizado, sendo indicado o ibuprofeno oral devido à segurança e eficácia¹, por pertencer à lista de medicamentos padronizados na RENAME⁵ e por apresentar custo favorável quando comparado aos anti-inflamatórios injetáveis, conforme demonstrado na tabela 1.

A necessidade de inclusão do tramadol foi pautada no adequado escalonamento da dor, caso não haja melhora com codeína oral e evitando o uso antecipado de morfina, destacando-se casos graves de pacientes dependentes de morfina já identificados nas UPAs.

Deliberação

Fica deliberada a inclusão dos medicamentos Tramadol 50 mg/mL, ampola 2 mL e Ibuprofeno 600 mg, comprimido, para uso nas UPA, conforme escalonamento previsto no Protocolo da Dor⁶.

Referências

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Formulário Terapêutico Nacional 2010: Rename 2010/Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/formulario_terapeutico_nacional_2010.pdf. Acesso: 11 novembro 2019.
2. TRAMAL. Marcelo Mesquita. São Paulo: Grünenthal do Brasil Farmacêutica Ltda. Bula de remédio aprovada em 16/01/2015. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=13911142016&pIdAnexo=3172590. Acesso: 11 novembro 2019.
3. Hospital Albert Einstein. Diretrizes Assistenciais DIRETRIZ DE TRATAMENTO FARMACOLOGICO DA DOR. Versão eletrônica atualizada em março/2012. Disponível em: <http://www.saudedireta.com.br/docupload/1344435028Diretriz%20do%20to%20da%20dor.pdf>. Acesso: 11 novembro 2019.
4. SCHWENGBER, F. Eficácia e segurança: morfina versus outros opióides no controle da dor oncológica. Ijuí, RS 2017. Disponível em: <http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4669/Fernanda%20Schwengber.pdf?sequence=1>.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais: RENAME 2018 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018. 218 p. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/medicamentos_rename.pdf. Acesso: 11 novembro 2019.
6. BRASIL. Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto. Portaria nº 13 DE 25 de junho de 2019. Procede a publicação da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos) do ano de 2019, entre outras providências correlatas. Disponível em: http://gestao.saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/arqu/legi/2019/portaria_2019-06-25_13.pdf. Acesso em: 11 novembro 2019.
7. BRASIL. São José do Rio Preto. Protocolo Dor. Departamento de Urgência e Emergência. Revisão 01.20 de outubro de 2019. Disponível em: Pasta de Gestão.

VALERIANA OFFICINALIS

Tecnologia: Valeriana officinalis 50 mg, extrato seco.

Pergunta

Qual a concentração de Valeriana officinalis mais custo efetiva para a padronização na REMUME?

Nome comercial e fabricante

Marca	Fabricante	Apresentação
Calmitane	Bionatus	Comprimidos 40 mg, 50 mg, 100 mg
Recalm	Herbarium	Cápsula 215 mg
Sonotabs	Kley Hertz	Comprimidos revestidos 100 mg
Valerance	Elofar	Comprimido revestido 160 mg
Valeriane	Zyddus Nikkho	Drágea 50mg
Valerimed	Cimed	Comprimido revestido 50 mg
Valessone	Natulab	Comprimido revestido 225,75 mg
Valsed	Cifarma	Comprimido revestido 50 mg
Valyanne	Geolab	Comprimido revestido 50 mg e 215 mg
Ansival	Myralis Pharma	Comprimido revestido 100 mg
Sonoripan	Marjan Pharma	Comprimido revestido 50 mg
Valerinati	Pharmascience	Comprimido 50 mg

(Fonte: Consulta Remédios. Homepage. Disponível em: <https://consultaremedios.com.br/valeriana-officinalis/pa>. Acesso: outubro 2019).

Indicação

A Valeriana officinalis é usada como sedativo moderado, hipnótico^{1,2} e no tratamento de distúrbios do sono associados à ansiedade^{1,2,3}.

Contextualização

A Valeriana officinalis é uma planta da família Caprifoliaceae^{1,2} e as partes utilizadas para fim medicamentoso são as raízes, rizomas e estolões da planta^{1,2,3,4,5}. É uma planta nativa da Europa e da Ásia, e naturalizada na América do Norte⁷. Tem sido usada como planta medicinal há mais de 2000 anos⁶, atuando no sistema nervoso central³. Existem relatos antigos, descritos em compêndios oficiais e farmacopeias, que comprovam sua eficácia no tratamento da insônia⁷ sendo um dos fitoterápicos mais popularmente utilizados para este fim^{3,6,7}.

A atividade do medicamento é expressa a partir da concentração do composto químico ácido sesquiterpênico, ou ácido valerênico, presente em sua composição^{1,2,3,4,5,6}. Assim, para o extrato seco (forma farmacêutica disponível) é considerado 0,8% (0,8 mg/g) de ácidos sesquiterpênicos³.

Dentre os estudos publicados referentes aos efeitos da Valeriana sobre o sono, Vorbach, Gortelmeyer e Bruning, em 1996, realizaram estudo randomizado, duplo-cego, controlado com placebo, participando 121 pacientes com insônia não orgânica, sem depressão e sem uso de medicação que possa interferir com o sono e houve relato de melhora no sono em 66% do grupo que recebeu Valeriana em comparação com 26% do grupo que recebeu placebo⁷.

Ainda sobre os efeitos da Valeriana sobre o sono, em estudo publicado em 2000, os autores concluíram que o tratamento com Valeriana mostrou efeitos positivos na estrutura do sono e percepção do sono em pacientes com insônia, podendo ser recomendado para o tratamento de pacientes com insônia psico • siológica leve⁷.

Estudos em animais mostraram que esse fitoterápico pode potencializar o efeito de outros depressores do SNC como barbitúricos, anestésicos ou benzodiazepínicos^{1,2,3}. Assim, é recomendável evitar o uso de *V. officinalis* com bebidas alcoólicas, pela possível exacerbação dos efeitos sedativos^{1,2,3}.

Resultado da Pesquisa

Doses de Valeriana officinalis recomendadas conforme literatura disponível:

Dose adulto (> 12 anos)

Extrato seco: de 45 mg¹ a 300 mg² de dose diária.

Dose máxima diária: 400 mg^{3,5}.

O fabricante traz a recomendação de não ingerir mais de 900 mg/dia³.

Posologia:

Como sedativo leve: 1 a 3 vezes ao dia^{1,2}.

Para distúrbios do sono: dose única antes de dormir^{1,2} mais uma dose no início da noite, caso seja necessário².

Para alcançar um efeito ótimo de tratamento, o uso continuado é recomendado durante 2-4 semanas¹.

A Valeriana officinalis é contraindicada para menores de 12 anos, grávidas, lactantes e pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes do fitoterápico^{1,2,3}.

Os pacientes devem ser orientados sobre execução de atividades de risco que necessitem atenção, uma vez que a Valeriana pode causar sonolência, não sendo, portanto, recomendável a sua administração antes de dirigir e operar máquinas^{1,2}.

Pesquisa de preço

A partir do registro de preços no município:

MEDICAMENTO	UNIDADE	CMM	VALOR UNITARIO	BEC	Processo
VALERIANA OFFICINALIS 50 MG. EXTRATO SECO	COMPRIMIDO	120.000	0,119	459/19	13888/19
VALERIANA OFFICINALIS 40 MG. EXTRATO SECO	COMPRIMIDO	120.000	0,3090		

Discussão

Na avaliação da dose posológica, a mínima recomendada é de 45 mg, dose superior à unidade posológica padronizada na REMUME 2019.

Além disso, a substituição da apresentação atualmente padronizada do medicamento Valeriana officinalis de 40 mg por 50 mg, acarretará em economia prevista de R\$ 304.000,00, conforme valor registrado no processo 13888/19, comparando-se com valor da última aquisição de Valeriana officinalis 40mg.

Deliberação

Dessa forma, considerando a eficácia do tratamento e o impacto orçamentário, fica deliberada a substituição da apresentação atualmente disponível por Valeriana officinalis 50mg.

Referências:

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Memento Terapêutico. 1. Ed. Brasília, 2016. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33832/2909630/Memento+Fitoterapico/a80ec477-bb36-4ae0-b1d2-e2461217e06b>. Acesso: 03 outubro 2019.
2. TOLEDO. Prefeitura do Município. Autarquia Municipal de Saúde. Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos: Memento Fitoterápico do Município de Toledo; 1º Edição; 2018. Toledo, Paraná.
3. CALMITANE. Juliana Borges. São José do Rio Preto: Bionatus Laboratório Botânico LTDA. Bula de remédio, 24/09/2014.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Farmacopeia Brasileira, 6. Ed. Brasília, 2019. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33832/259143/Plantas+medicinais+Pronto.pdf/1b7220eb-a371-4ad4-932c-365732a9c1b8>. Acesso: 03 outubro 2019.
5. VALERIANA. Piracicaba: Floriben. Disponível em: <http://florien.com.br/wp-content/uploads/2016/06/VALERIANA.pdf>. Acesso: 03 outubro 2019.

6. Gonçalves, S; Martins, A. P. Ciências Biofarmacêuticas / Biopharmaceuticals Sciences. Rev. Lusófona de Ciências e Tecnologias da Saúde, 2005. Disponível em: http://recil.ulusofona.pt/bitstream/handle/10437/451/cbf3_06.pdf?sequence=1. Acesso: 03 outubro 2019.
7. SECCHI, P; VIRTUOSO, S. O efeito da valeriana no tratamento da insônia. Visão Acadêmica, Curitiba, v.13, n.1, Jan. - Mar./2012. Disponível em: <file:///C:/Documents%20and%20Settings/alpereira/Meus%20documentos/Downloads/30025-110176-1-PB.pdf>. Acesso: 04 outubro 2019.

IX – PARECERES DE EXCLUSÃO

FENOTEROL

Tecnologia: Fenoterol 5 mg/mL - gotas para inalação - frasco 20 mL

Fabricantes

PRINCÍPIO ATIVO	LABORATÓRIO	PRODUTO	APRESENTAÇÃO
BROMIDRATO DE FENOTEROL	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	BROMIDRATO DE FENOTEROL	5 MG/ML SOL OR CX 200 FR PLAS OPC GOT X
BROMIDRATO DE FENOTEROL	BELFAR LTDA	FENATEC	5 MG/ML SOL OR CT FR VD CGT X 20 ML
BROMIDRATO DE FENOTEROL	BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARM	BROMIFEN	5 MG/ML SOL OR CX 50 FR VD AMB X 20 ML +
BROMIDRATO DE FENOTEROL	BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARM	BROMIFEN	5 MG/ML SOL OR CT FR VD AMB X 20 ML + CC
BROMIDRATO DE FENOTEROL	BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA	BEROTEC	5 MG/ML SOL CT FR VD AMB X 20 ML
BROMIDRATO DE FENOTEROL	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	BROMIDRATO DE FENOTEROL	5 MG/ML SOL OR CX 200 FR PLAS OPC GOT X
BROMIDRATO DE FENOTEROL	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	BROMIDRATO DE FENOTEROL	5 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT X 20 M
BROMIDRATO DE FENOTEROL	LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A	BROMIDRATO DE FENOTEROL	5 MG/ML SOL OR CT FR VD AMB X 20 ML + CG

(ANVISA. Secretaria Executiva – CMED. Lista de preços de medicamentos. Publicada em 01/05/2020. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/listas-de-precos>. Acesso: 28 mai 2020)

Pergunta

O fenoterol 5mg/mL é a única alternativa farmacológica no tratamento do broncoespasmo?

Indicação

O fenoterol é um medicamento broncodilatador β -adrenérgico de efeito rápido e de curta duração, indicado no tratamento dos sintomas relacionados à asma aguda e em outras condições nas quais haja constrição reversível das vias aéreas¹.

Contextualização

O medicamento fenoterol tem uma potência broncodilatadora mais alta que o salbutamol ou a terbutalina². A seletividade β_2 e seus efeitos farmacodinâmicos, em doses orais e inalatórias normais, são semelhantes ao do salbutamol e da terbutalina².

Em meados de 2019, o fenoterol 5mg/mL, gotas para inalação, passou a exibir problemas de desabastecimento no mercado nacional. É de conhecimento que o fabricante Boehringer Ingelheim do Brasil apresentou junto à ANVISA em 30/10/2019 o pedido de descontinuação definitiva de fabricação. Os laboratórios Teuto Brasileiro e Prati Donaduzzi, solicitaram descontinuação temporária, todos alegando motivação comercial, conforme painel de descontinuação da Anvisa³.

A última compra municipal ocorreu em julho/2019, não havendo sucesso em aquisições posteriores, sendo fracassados os processos 12971/19, 14276/19 e 11539/20 e deserto 15637/19 e 11078/20. O consumo mensal estimado é de 105 frascos.

Resultado da pesquisa

Os broncodilatadores beta-agonistas de curta ação constituem o tratamento de primeira linha para a crise asmática. A administração inalatória é a via de eleição, podendo ocorrer com uso de aerossol dosimetrado (spray) ou por nebulização, com fluxo contínuo de ar comprimido^{4,5,6}.

Os medicamentos mais utilizados para o tratamento inicial da crise aguda de asma e DPOC são o fenoterol e o salbutamol^{6,7}. Destacamos que o medicamento salbutamol 5mg/mL solução para inalação consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e no Formulário Terapêutico Nacional, diferente do fenoterol^{8,9}.

O uso do beta-agonista spray acoplado ao espaçador tem sido recomendado como forma inicial de tratamento, ficando os nebulizadores de uso contínuo como segunda opção, para casos graves ou para pacientes sem coordenação motora necessária^{4,5}.

Discussão e Deliberação

O fenoterol é um medicamento indicado no tratamento do broncoespasmo agudo^{1,2}, porém na sua falta os protocolos indicam o uso do salbutamol spray oral ou solução para inalação^{4,5,6,7}, medicamento este padronizado na RENAME⁸.

Dessa forma, fica deliberada a exclusão do medicamento Fenoterol 5 mg/mL - gotas para inalação da REMUME, considerando sua indisponibilidade no mercado.

Referências

1. BEROTEC. Farm. Resp.: Ana Carolina Scandura Cardillo. Boehringer Ingelheim do Brasil Quím. e Farm. São Paulo: Itapetecica da Serra. Bula de remédio, 28/01/2019. Disponível em: https://www.boehringer-ingelheim.com.br/sites/br/files/documents/berotec_bula_paciente_e_profissional_0.pdf. Acesso: 28 mai 2020.
2. Svedmyr N. Fenoterol: A Beta₂-adrenergic Agonist for Use in Asthma; Pharmacology, Pharmacokinetics, Clinical Efficacy and Adverse Effects. First published: May-June 1985. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2991865/>. Acesso: 28 mai 2020.
3. PAINEL: (ANVISA. Painel de Descontinuação de Medicamentos. Disponível em: <https://sad.anvisa.gov.br/MicroStrategy/servlet/mstrWeb>. Acesso: 27 mai 2020).
4. DALCIN, PTR. PERIN, C. Manejo da asma aguda em adultos na sala de emergência emergência: evidências evidências atuais. Rev Assoc Med Bras. Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/ramb/v55n1/v55n1a21.pdf>. Acesso: 28 mai 2020.
5. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA. Tratamento da Crise de Asma no Pronto Socorro. Temas em Revisão. Disponível em: http://itarget.com.br/newclients/sbpt.org.br/2011/downloads/arquivos/Revisoes/REVISAO_04_TRATAMENTO_CRISE_ASMA_PRO_NTO_SOCORRO.pdf. Acesso: 28 mai 2020.

6. COELHO, F.R. Conduas no primeiro atendimento a pacientes admitidos com quadro de broncoespasmo agudo: proposta de um protocolo de atendimento na Unidade de Saúde de Torres de São Sebastião. Universidade Federal de Minas Gerais, 2014. Disponível em: <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/6294.pdf>. Acesso: 28 mai 2020.
7. ZOPPI, D. Asma: abordagem da crise aguda na emergência. Revista QualidadeHC. Ribeirão Preto, 2017. Disponível em: <http://www.hcrp.usp.br/revistaqualidade/uploads/Artigos/158/158.pdf>. Acesso: 27 mai 2020.
8. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais : Rename 2020 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – Brasília : Ministério da Saúde, 2020.
9. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Formulário terapêutico nacional 2010: Rename 2010/Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. FTN, 2010. Disponível em: http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/formulario_terapeutico_nacional_2010.pdf

MEDROXIPROGESTERONA

Tecnologia: Medroxiprogesterona 10 mg

Pergunta

Há justificativas clínicas e epidemiológicas para ser mantida a padronização do medicamento medroxiprogesterona 10 mg comprimido oral na REMUME?

Indicação

A medroxiprogesterona é um progestogênio usado por via oral em casos de amenorreia secundária e sangramento uterino anormal (FTN)¹, sendo padronizado para uso no teste de progesterona².

Contextualização

O manejo clínico do sangramento uterino aumentado crônico de padrão ovulatório pode ser feito administrando, por via oral, acetato de medroxiprogesterona 10 mg/dia do 5º ao 26 dia, esperando-se 83% de redução no sangramento³. Esta terapia é contraindicada nos casos de presença ou histórico de tromboflebite, distúrbios tromboembólicos e cerebrovasculares. Insuficiência hepática grave. Presença ou suspeita de neoplasia mamária ou de órgãos genitais³.

Na avaliação clínica inicial da amenorreia secundária sem causa evidente, devem ser dosados os hormônios prolactina e TSH, para investigação. Na ausência de alterações, é recomendado o teste de progesterona, para avaliação de sangramento pós-teste³.

O teste da progesterona consiste em administrar, por via oral, acetato de medroxiprogesterona, 5 a 10 mg/dia, durante 5 a 10 dias, por via oral³. Se houver sangramento entre 3 e 10 dias após o término da medicação, isso indica que a paciente tem secreção estrogênica adequada e não apresenta obstrução do trato genital³. De toda forma, devem ser investigados sinais de hiperandrogenismo (acne, pele oleosa, calvície de padrão masculino, hirsutismo) que podem indicar presença de síndrome de ovários policísticos³.

Na ausência de sangramento após teste de progesterona, o médico deve avaliar sangramento após teste do estrogênio mais progesterona (Etinilestradiol, 30 ug + levonorgestrel por 21 dias)³. Se não houver sangramento após o término da medicação, isso sugere fortemente obstrução do trato genital³.

Resultado da pesquisa

Atualmente, o consumo de medroxiprogesterona 10 mg é em média de 20 comprimidos mensais, não havendo padrão de dispensação conforme previsto para o exame de teste de progesterona.

Conforme avaliação da gerência do Programa Saúde da Mulher, a baixa demanda no município justifica a descontinuação da medroxiprogesterona 10 mg no momento. Assim, a gerência do programa realizará o acompanhamento e avaliação de necessidade futura. O medicamento medroxiprogesterona 10 mg apresenta dificuldades na aquisição desde 2018, sendo fracassado novamente na última licitação. O consumo mensal atual é de 20 comprimidos/mês. Embora seja padronizado para exame, avaliando as dispensações, conforme relatório de dispensação de medicamentos do sistema informatizado disponível, percebemos que não há um padrão de quantidade dispensada, conforme recomendação de dose para exame de progesterona.

Discussão e Deliberação

Diante das dificuldades na aquisição da medroxiprogesterona 10mg, comprimido, e por apresentar baixa demanda no município, fica deliberada sua exclusão da REMUME.

Referências

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Formulário Terapêutico Nacional 2010: Rename 2010/Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/formulario_terapeutico_nacional_2010.pdf. Acesso: 07 novembro 2019.
2. BRASIL. Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto. Portaria nº 13 DE 25 de junho de 2019. Procede a publicação da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos) do ano de 2019, entre outras providências correlatas. Disponível em: http://gestao.saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/arqu/legi/2019/portaria_2019-06-25_13.pdf. Acesso em: 07 novembro 2019.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica : Saúde das Mulheres / Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_atencao_basica_saude_mulheres.pdf. Acesso: 7 novembro 2019.

RANITIDINA

Tecnologia: Ranitidina 25 mg/ml, solução injetável, ampola 2 ml, IM/IV
Ranitidina 150 mg/10 ml, solução oral, frasco 120 ml

Pergunta

Devido aos problemas de segurança apresentados pela Ranitidina nas apresentações disponíveis no mercado ela deve ser mantida na REMUME?

Indicação

A Ranitidina é indicada no tratamento e prevenção de úlceras no estômago e intestino, doença do refluxo gastroesofágico, dispepsia funcional, esofagite erosiva e síndrome de Zollinger-Ellison (hipersecreção gástrica)^{1,2,3}.

Contextualização

A Ranitidina é um antihistamínico, antagonista seletivo dos receptores H₂, que tem como ação a redução da produção de ácido gástrico¹. Em setembro de 2019, a N-nitrosodimetilamina (NDMA), provável agente cancerígeno humano, foi detectada no fármaco Ranitidina importado da Índia, levando à determinação de suspensão de sua importação, uso e comercialização, pela ANVISA^{4,5,6}. Após essa suspensão, mais seis produtores receberam a proibição de importação e uso do princípio ativo cloridrato de ranitidina⁴. Medidas similares às da Anvisa foram adotadas por outras autoridades estrangeiras, como FDA, EMA e Health Canada⁴.

Conforme Painel de Descontinuação ANVISA, no período de setembro/2019 a junho/2020, 9 empresas registraram descontinuação temporária de fabricação ou importação de genérico, similar ou medicamento novo, referente ao princípio ativo cloridrato de ranitidina: Farma Industria Farmacêutica LTDA, Aché Laboratórios Farmacêuticos S/A, CIMED Indústria de Medicamentos LTDA, EMS S/A, Eurofarma Laboratórios S.A., Geolab Indústria Farmacêutica S/A, Germed Farmacêutica, Laboratório Teuto Brasileiro S/A, Legrand Pharma Indústria Farmacêutica LTDA, Nova Química Farmacêutica S/A, Sanofi Medley Farmacêutica LTDA, União química Farmacêutica Nacional S/A⁷.

Por consequência, houve o desabastecimento do medicamento Ranitidina, em suas diversas apresentações no mercado nacional, não sendo possível a aquisição.

Resultado da pesquisa

A dispepsia é um sintoma ou um conjunto de sintomas que alertam a presença de um problema gastrointestinal¹. A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é definida como sintomas ou complicações resultantes do refluxo do conteúdo gástrico no esôfago ou mais além, na cavidade oral (incluindo laringe) ou pulmão³.

Para pacientes adultos, o tratamento com Omeprazol, inibidor de bomba de prótons (IBP), é indicado para doenças gastroduodenais (úlceras gastroduodenais, gastrite erosivas, dispepsia, etc) e erradicação de *Helicobacter pylori*⁸.

Em crianças e lactantes, de acordo com pesquisa conduzida Sociedade Norte-Americana de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica e da Sociedade Europeia de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica, para o diagnóstico e tratamento da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), o omeprazol constitui a primeira linha de tratamento e a ranitidina, segunda linha⁹.

Foram identificados três estudos sobre o uso de antagonista seletivo dos receptores H2 (H2RAs), entre eles, a ranitidina⁹. Os estudos foram conduzidos em populações mistas de bebês e crianças. Em conclusão, foram apresentados os desfechos da incerteza se o uso de H2RAs reduz choro / angústia, regurgitação visível / vômito ou azia em crianças com DRGE em comparação com placebo⁹. Não se sabe se o uso de H2RAs melhora a histologia / esofagite erosiva em crianças com DRGE em comparação com o placebo⁹. Não se sabe se o uso de H2RAs leva a efeitos colaterais em bebês e crianças com DRGE em comparação com o placebo⁹.

A mesma pesquisa comparou o uso de IBPs e os H2RAs. Embora seus mecanismos farmacológicos sejam diferentes, os IBPs e os H2RAs são agentes supressores de ácido e, portanto, podem ser esperados resultados semelhantes⁹. Porém, as taxas de cicatrização da esofagite erosiva ou histológica são mais altas após 12 semanas de terapia com um IBP em contraste com o H2RA⁹. Com base em evidências da literatura adulta e na opinião de especialistas, o grupo de trabalho recomenda o Omeprazol como tratamento de primeira linha, e a Ranitidina, a segunda opção, no tratamento de Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) em crianças e bebês⁹.

Discussão e deliberação

Diante dos problemas de segurança evidenciados em estudos de Farmacovigilância fica deliberada a exclusão do medicamento Ranitidina nas apresentações solução injetável e solução oral.

Referências

1. EPOCRATES [Internet]. San Francisco (CA): Epocrates, Inc. c2020 [Monograph], Evaluation of dyspepsia. Last Updated: 2020-03-12. Disponível em: <https://online.epocrates.com/diseases/769/Evaluation-of-dyspepsia>. Acesso: 09 jun 2020. Epocrates [Internet]. San Francisco (CA): Epocrates, Inc. c2020 [Monograph], Osteoporosis; [updated 2018 Nov 20; cited 2020 Jul 16]. Acesso: 10 jun 2020.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Formulário terapêutico nacional 2010: Rename 2010/Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: http://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/formulario_terapeutico_nacional_2010.pdf. Acesso: 16 jun 2020.
3. EPOCRATES [Internet]. San Francisco (CA): Epocrates, Inc. c2020 [Monograph]. Gastroesophageal reflux disease. Last Updated: 2020-04-22. Disponível em: <https://online.epocrates.com/diseases/8221/Gastroesophageal-reflux-disease/Definition>. Acesso: 10 jun 2020.

4. ANVISA. Nota informativa nº 1/2020/sei/gimed/ggffis/dire4/anvisa. Recomenda controle de nitrosaminas por parte dos fabricantes de medicamentos. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/2857848/5680794/Nota+informativa+-+Nitrosaminas.pdf/fb31c36a-d205-4613-bef9-668eb7f19538>. Acesso: 09 jun 2020.
5. ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. Nota da fbg sobre ranitidina. 28 de janeiro de 2020. Disponível em: [https://amb.org.br/noticias/nota-da-fbg-sobre-ranitidina/#:~:text=A%20N%2Dnitrosodimetilamina%20\(NDMA\),de%20sua%20comercializa%C3%A7%C3%A3o%20pela%20ANVISA](https://amb.org.br/noticias/nota-da-fbg-sobre-ranitidina/#:~:text=A%20N%2Dnitrosodimetilamina%20(NDMA),de%20sua%20comercializa%C3%A7%C3%A3o%20pela%20ANVISA). Acesso: 09 jun 2020.
6. PEBMED. Anvisa determina recolhimento de lotes de ranitidina. Abril, 2020. Disponível em: <https://pebmed.com.br/anvisa-determina-recolhimento-de-lotes-de-cloridrato-de-ranitidina/>. Acesso: 09 jun 2020.
7. ANVISA. Painel de descontinuação. <http://portal.anvisa.gov.br/descontinuacao-de-medicamentos>. Acesso: 26 jun 2020.
8. COELHO, Luiz Gonzaga Vaz et al . IVTH BRAZILIAN CONSENSUS CONFERENCE ON HELICOBACTER PYLORI INFECTION. Arq. Gastroenterol. São Paulo, v. 55, n. 2, p. 97-121, June 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/ag/v55n2/1678-4219-ag-s0004-2803-20180000020.pdf>. Acesso: 16 jun 2020.
9. ROSEN, R et all. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (NASPGHAN) and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN). *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. Published in final edited form as: *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2018 Mar. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5958910/>. Acesso: 16 jun 2020.
10. OMEPRAZOL. Farm. Responsável José Carlos Módolo. Itapira: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. Bula de remédio. Disponível em: <https://www.eurofarma.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Omeprazol-Profissional.pdf>. Acesso: 16 jun 2020.
11. Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Quarta Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária. Resolução-RE Nº 3.089, de 18 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-re-n-3.089-de-18-de-agosto-de-2020-272978814>. Acesso: 18 ago 2020.

TENOXICAM

Tecnologia: Tenoxicam 10 mg/mL, amp 2 mL, IM/IV

Pergunta

Para o tratamento da dor nas Unidades de Pronto Atendimento o Tenoxicam é custo efetivo?

Indicação

O tenoxicam é um medicamento anti-inflamatório indicado para o tratamento inicial das seguintes doenças inflamatórias e degenerativas, dolorosas do sistema músculoesquelético: artrite reumatóide, artrose, espondilite anquilosante, afecções extra-articulares (tendinite sem outra especificação, bursite, periartrite dos ombros ou dos quadris), distensões ligamentares e entorses, gota aguda, dor pós operatória¹. Encontra-se padronizado na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) para uso restrito nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de acordo com protocolo².

Contextualização

O medicamento Tenoxicam para uso intramuscular e endovenoso foi incorporado na REMUME em atenção ao manejo dos pacientes atendidos na UPA, vinculado ao protocolo de tratamento da dor².

Resultado da pesquisa

De acordo com o novo Protocolo de Tratamento da Dor apresentado pelo Departamento de Urgência e Emergência, o único anti-inflamatório injetável utilizado será o Diclofenaco 75 mg, intramuscular³. Como alternativa ao diclofenaco, para pacientes alérgicos, será administrado ibuprofeno por via oral, medicamento seguro e eficaz no tratamento da dor⁴ e de custo inferior a outros anti-inflamatórios injetáveis, como o tenoxicam. Desta forma, sendo recomendada a exclusão do Tenoxicam, atualmente padronizado.

Tabela 1. Comparações de valores unitários de anti-inflamatórios orais e injetáveis

Medicamento	Apresentação	Valor unitário
Ibuprofeno 600 mg*	Comprimido	R\$ 0,49412
Ibuprofeno 600 mg*	Comprimido revestido	R\$ 0,690218
Ibuprofeno 600 mg*	Cápsula gelatinosa mole	R\$ 0,65938
Diclofenaco 25 mg/mL**	Ampola 3 mL IM	R\$ 0,5400
Tenoxicam 10 mg/mL**	Ampola 2mL IM/EV	R\$ 3,9000
Cetoprofeno 100mg pó liofilico **	Frasco ampola EV	R\$ 2,5000

* BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Preços máximos de medicamentos por princípio ativo, para compras públicas preço fábrica (pf) e preço máximo de venda ao governo (pmvg). Atualizada em 01/10/2019 Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/listas-de-precos>. Acesso em: 14 Novembro 2019.

** SJRP. AquisiçõesMunicipais.SICOM.

Discussão e Deliberação

Fica deliberada a exclusão do medicamento Tenoxicam 10 mg/mL ampola 2 mL.

Referências

1. TENOXICAM. Dra. Maria Benedita Pereira. São Paulo: EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. Bula de remédio aprovada em 13/07/2016. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=22856692016&pIdAnexo=3888250. Acesso: 11 novembro 2019.
2. BRASIL. Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto. Portaria nº 13 DE 25 de junho de 2019. Procede a publicação da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos) do ano de 2019, entre outras providências correlatas. Disponível em: http://gestao.saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/arqu/legi/2019/portaria_2019-06-25_13.pdf. Acesso em: 11 novembro 2019.
3. BRASIL. São Jose do Rio Preto. Protocolo Dor. Departamento de Urgência e Emergência. Revisão 01. 20 de outubro de 2019. Disponível em: Pasta de Gestão.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Formulário Terapêutico Nacional 2010: Rename 2010/Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/formulario_terapeutico_nacional_2010.pdf. Acesso: 11 novembro 2019.

TINIDAZOL

Tecnologia: Tinidazol 500 mg

Pergunta

O Tinidazol é o medicamento mais custo efetivo na tricomoníase, giardíase e amebíase?

Nome comercial e fabricante

Secretaria Executiva - CMED
LISTA DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - PREÇOS FÁBRICA E MÁXIMOS AO CONSUMIDOR
cada em: 02/03/2020

SUBSTÂNCIA	LABORATÓRIO	PRODUTO	APRESENTAÇÃO	CLASSE TERAPÊUTICA	TIPO DE PRODUTO (STATUS DO PRODUTO)
TINIDAZOL	EMS S/A	TINIDAZOL	500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 8	G01A1 - TRICOMONICIDAS SISTÊMICOS	Genérico
TINIDAZOL	EMS S/A	TINIDAZOL	500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 4	G01A1 - TRICOMONICIDAS SISTÊMICOS	Genérico
TINIDAZOL	LABORATÓRIOS PFIZER LTDA	PLETIL	500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 4	G01A1 - TRICOMONICIDAS SISTÊMICOS	Similar (Referência)
TINIDAZOL	LABORATÓRIOS PFIZER LTDA	PLETIL	500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 8	G01A1 - TRICOMONICIDAS SISTÊMICOS	Similar (Referência)
TINIDAZOL	WYETH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	PLETIL	500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 8	G01A1 - TRICOMONICIDAS SISTÊMICOS	Novo (Referência)
TINIDAZOL	WYETH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	PLETIL	500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 4	G01A1 - TRICOMONICIDAS SISTÊMICOS	Novo (Referência)
TINIDAZOL	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA.	FACYL 500	500MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 4	G01A1 - TRICOMONICIDAS SISTÊMICOS	Similar
TINIDAZOL	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA.	FACYL 500	500MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 8	G01A1 - TRICOMONICIDAS SISTÊMICOS	Similar
TINIDAZOL	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA.	TINIDAZOL	500 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 4	G01A1 - TRICOMONICIDAS SISTÊMICOS	Genérico
TINIDAZOL	SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA.	TINIDAZOL	500 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 8	G01A1 - TRICOMONICIDAS SISTÊMICOS	Genérico
TINIDAZOL	GERMED FARMACEUTICA LTDA	TINIDAZOL	500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 4	G01A1 - TRICOMONICIDAS SISTÊMICOS	Genérico
TINIDAZOL	GERMED FARMACEUTICA LTDA	TINIDAZOL	500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 8	G01A1 - TRICOMONICIDAS SISTÊMICOS	Genérico

(ANVISA. Lista de preços de medicamentos – preços fábrica e máximos de venda ao governo, 02/03/2020)

Indicação

O Tinidazol é um derivado imidazólico indicado para o tratamento de tricomoníase, amebíase e giardíase.

Contextualização

O medicamento Tinidazol 500 mg apresenta problemas de desabastecimento no mercado nacional. Dois fabricantes já registraram a descontinuação definitiva da fabricação no painel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)¹². A última aquisição municipal ocorreu em dezembro/2018, não havendo sucesso em aquisições posteriores. O consumo mensal atual é de 1.250 comprimidos.

Resultado da pesquisa (sumário das evidências)

Para o tratamento de giardíase, tricomoníase e amebíase, a Rename 2020^{RENAME} tem padronizados os seguintes medicamentos: albendazol 400 mg (giardíase)² e metronidazol 250 mg (amebíase, tricomoníase e giardíase)^{2,5}, ambos padronizados e disponíveis na rede municipal e com

custo inferior ao tinidazol.

No tratamento da amebíase, o metronidazol é o agente de escolha em todas as formas sintomáticas^{2,3}, estimando-se a eficácia entre 90%² a 95%¹, comparada ao secnidazol (95%)¹. O tinidazol apresenta eficácia de 80%¹.

No tratamento da giardíase o tinidazol apresenta eficácia de 92-95%¹ e uma dose única de tinidazol é provavelmente superior ao metronidazol na giardíase³, cuja eficácia varia entre 87-95%¹. Neste caso, o albendazol apresenta efetividade similar à do metronidazol e menos efeitos colaterais, com a vantagem de ser administrado em regime posológico mais simplificados^{8,10}. Dada a segurança, a eficácia e os baixos custos do albendazol, este medicamento pode ser potencialmente usado como uma alternativa para os protocolos de terapia com metronidazol existentes no tratamento da giardíase em humanos¹⁰. No tratamento de crianças, Tinidazol supera albendazol⁹. O secnidazol é uma opção terapêutica no tratamento da giardíase, com eficácia entre 92-95%¹.

Para o tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis, no caso a tricomoníase e a vaginose bacteriana, o Ministério da Saúde publicou novo protocolo em 2018 elegendo o metronidazol como medicamento de primeira escolha e não incluindo o medicamento tinidazol nos tratamentos¹¹.

A dificuldade com relação ao metronidazol refere-se ao regime posológico^{1,8,11} e efeitos colaterais^{1,8} que podem diminuir a adesão ao tratamento. Outra opção para giardíase e amebíase é o secnidazol 1g, não padronizado na Rename.

Custo do tratamento

Tabela 1. Comparação dos valores e média de consumo mensal de imidazólicos Remume

Medicamento	Dose	R\$ unitário	R\$ tratamento	CMM	R\$ mensal
Albendazol 400 mg	400 mg/dia 5 dias ²	R\$ 0,2850	R\$ 1,425 ^{giardia}	4.900	R\$ 1.396,50
Metronidazol 250 mg	500 mg 3x/dia 5 dias ^{ameba1,7}	R\$ 0,0940	R\$ 2,82 ^{ameba}	11.200	R\$ 1.052,80
	250 mg 2x/dia 5 dias ^{giardia1,7}		R\$ 0,94 ^{giardia}		
	500 mg 2x/dia, 7 dias ^{trichomonas11}		R\$2,632 ^{trichomonas}		
Tinidazol 500 mg	2g 1xdia 2 dias ^{ameba1,7}	R\$ 0,7000	R\$ 5,60 ^{ameba}	1.250	R\$ 875,00
	2g DU ^{giardia,trichomonas1,7}		R\$ 2,80 ^{giardia, trichomonas}		

Valores municipais registrados 2019. Gerência de Atenção Básica – Medicamentos.

O protocolo do Ministério da Saúde para tratamento de IST, em sua última revisão, não recomendou o uso do tinidazol no tratamento de tricomoníase e vaginose bacteriana¹¹.

Discussão e Deliberação

O Tinidazol quando comparado ao Metronidazol apresenta é menos eficaz e de valor mais elevado no tratamento da amebíase, tricomoníase e giardíase. Sendo assim, fica deliberada a sua exclusão da REMUME.

Referências

1. Infectologia. Parasitoses intestinais. Medgrupo Ciclo 1. Medcurso 2017. Ed. Medyklin. Volume 05. 2017. Disponível em: http://tga.blv.ifmt.edu.br/media/filer_public/ca/d3/cad3c3ff-62d6-4ecf-adad-2d27a429dc95/infecto_vol_5_parasitoses_intestinais_doencas_por_helminhos_e_protozoarios_esquistossomosepdf.pdf. Acesso: 13 fev 2020
2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Formulário terapêutico nacional 2010: Rename 2010/Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010.FTN,2010. Disponível em: http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/formulario_terapeutico_nacional_2010.pdf
3. GOODMAN E GILMAN, As bases farmacológicas da terapêutica/editores responsáveis, Laurence L. Brunton, Bruce A. Chabner, Bjorn C. Knollmann; [tradução da 12.ed.original, Augusto Langeloh...et al; revisão técnica, Almir Lourenço da Fonseca]. – Porto Alegre; AMGH, 2012.Ministério da Saúde Consultoria Jurídica/Advocacia Geral da União 1 Nota Técnica N° Nota Técnica N° 215/213 215/213 215/213 Brasília, maio Brasília, maio de 2013. Disponível em: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/julho/31/Albendazol.pdf>.
4. ANVISA. Antimicrobianos: bases teóricas e uso clínico. http://www.anvisa.gov.br/servicos/saude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo1/nitroimidazolicos.htm
5. *Richard D. Pearson. MD, University of Virginia School of Medicine. Amebíase. Last full review/revision October 2018 by Richard D. Pearson, MD. Manual MSD, 2018. Disponível em; <https://www.msdmanuals.com/pt-pt/profissional/doen%C3%A7as-infecciosas/protozo%C3%A1rios-e-microspor%C3%ADios-intestinais/ameb%C3%ADase>. Acesso: 27 fev 2020.*
6. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 8. ed. rev. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guiabolso.pdf. Acesso 27 fev 2020
7. Santana, LA et all. Atualidades sobre giardíase. JBM λ JANEIRO/FEVEREIRO, 2014 λ VOL. 102 λ N 7 o 1. Disponível em: <http://files.bvs.br/upload/S/0047-2077/2014/v102n1/a4019.pdf>. Acesso: 27 fev 2020.

8. [Escobedo AA](#) , [Ballesteros J](#) , [González-Fraile E](#) , [Almirall P](#). Uma meta-análise da eficácia do albendazol comparação com tinidazol como tratamentos para infecções Giardia em crianças. Pubmed. Revista Acta Tropica, 2016. Disponível em: https://www.epistemonikos.org/pt/documents/658e7b9b899a35ae5fbbf3c84906271ce1af15f6?doc_lang=en
9. [Sheldon R. Morris](#), MD, MPH, *University of California San Diego*. Manual MSD, 2018. *Last full review/revision March 2018 by Sheldon R. Morris, MD, MPH*. Disponível em: <https://www.msdmanuals.com/pt-pt/profissional/doen%C3%A7as-infecciosas/doen%C3%A7as-sexualmente-transmiss%C3%ADveis-dsts/tricomon%C3%ADase>. Acesso: 27 fev 2020.
10. [Solaymani-Mohammadi S](#)¹, [Genkinger JM](#), [Loffredo CA](#), [Singer SM](#). A meta-analysis of the effectiveness of albendazole compared with metronidazole as treatments for infections with Giardia duodenalis. 2010 May 11;4(5):e682. doi:10.1371/journal.pntd.0000682. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20485492>.
11. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Brasília, 2018. Disponível em: http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2019/02/pcdt_ist_para_web_-_nao_diagramado1.pdf. Acesso: 28 fev 2020.
12. PAINEL: (ANVISA. Painel de Descontinuação de Medicamentos. Disponível em: <https://sad.anvisa.gov.br/MicroStrategy/servlet/mstrWeb>. Acesso: 05 mar 2020)

X – FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS

AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO



FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ANTIBIÓTICO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO

Atenção: são condições para a dispensação do medicamento o preenchimento total e legível deste formulário e sua apresentação juntamente com a prescrição médica (em duas vias), na farmácia.

Paciente: _____
PFJ: _____ Idade: _____ Peso: _____ Kg

Medicamento requisitado:

- () Amoxicilina 50 mg + Clavulanato de Potássio 12,5 mg/ml – susp. oral
() Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 mg – comprimido.

Justificativa da indicação:

() Pneumonia Adquirida na Comunidade em pacientes com doenças associadas ou uso de antibióticos nos últimos 3 meses (adulto: associar a macrolídeo). Descrever antibiótico utilizado anteriormente:

- () Infecções do trato urinário.
() Pielonefrite.
() Infecções da cavidade oral.
() Segunda escolha para faringite e amigdalite purulenta.
() Sinusite (uso de Antimicrobiano somente com persistência dos sintomas por mais de 7 dias; dor facial e secreção nasal purulenta).
() Segunda escolha para tratamento de otite média aguda com falha de 1ª escolha. Descrever antibiótico utilizado anteriormente: _____
() Mordedura de animais conforme protocolo da Vigilância Epidemiológica.
() Antibiograma – microrganismo sensível. Relatar o resultado da cultura e antibiograma: _____

Data: ____/____/____

Assinatura e carimbo do prescritor: _____

Unidade de Origem: _____

Recomendação de dose - Crianças: 50mg/kg/dia a 90mg/kg/dia.

Recomendação de dose - Adultos:

Pneumonia adquirida na comunidade em pacientes com comorbidades (associação de betalactâmico + macrolídeo)	2cp 500/125mg de 8/8 horas por 7 a 10 dias + Azitromicina 500 mg 1cp ao dia por 5 dias	7 a 10 dias
Sinusite	1cp 500/125mg de 8/8 horas	10 a 14 dias
Otite média aguda	1cp 500/125mg de 8/8 horas;	10 dias
Faringite e amigdalite	1cp 500/125mg de 8/8 horas	10 dias
Infecção do trato urinário, gestante	1cp 500/125mg de 8/8 horas;	10 dias
Pielonefrite	1cp 500/125mg de 8/8 horas;	14 dias
Profilaxia Mordedura cão/gato	1cp 500/125mg de 8/8 horas	3 a 5 dias

Referências: REMUME 2019

AZITROMICINA



PREFEITURA DE
RIO PRETO

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ANTIBIÓTICO AZITROMICINA

Atenção: são condições para a dispensação do medicamento o preenchimento total e legível deste formulário e sua apresentação juntamente com a prescrição médica (em duas vias), na farmácia.

Paciente: _____
PFJ: _____ Idade: _____ Peso: _____ Kg

Medicamento requisitado:

- () Azitromicina 500 mg
() Azitromicina 40mg/ml – susp. oral

Justificativa da indicação

- () 1ª escolha em Pneumonia Atípica em adultos e crianças.
() 1ª escolha em Pneumonia Adquirida na Comunidade em Adultos.
() Infecção genital por *Chlamydia trachomatis*
() Tracoma.
() Quimioprofilaxia de Coqueluche em adultos e crianças.
() Pacientes alérgicos a beta-lactâmicos: amigdalite() faringite() otite () sinusite()
() Segunda escolha no tratamento de diarreia severa.
() Segunda escolha no tratamento de infecções resistentes a betalactâmicos. Relatar antibiótico usado anteriormente: _____
() Antibiograma. Relatar o resultado da Cultura: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura e carimbo do médico: _____

Unidade de Origem: _____

Recomendação de dose Criança: 10mg a 12mg /kg / dia
Pneumonia, Coqueluche, Otite, Sinusite: 10mg/kg por via oral / 5 dias
Faringite, Amigdalite: 12 mg/kg por dia via oral / 5 dias

Recomendação de dose Adulto:

Pneumonia adquirida na comunidade (leve a moderada)	500 mg por via oral / dia	5 dias
Infecção por clamídia ou caxoide	1 g por via oral dose única	
Infecção <i>N. gonorrhoeae</i>	1g dose única + ceftriaxona 500mg	
Coqueluche	500 mg por via oral / dia	5 dias

Referências: **REMUME 2019**

CEFTRIAXONA



PREFEITURA DE
RIO PRETO

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS CEFTRIAXONA

Atenção: este formulário é de uso exclusivo nas Unidades de Saúde próprias do município – Unidades de Pronto Atendimento e Unidades Básicas de Saúde.

Paciente: _____
 PFJ: _____ Idade: _____ Peso: _____ Kg

Medicamento: ceftriaxona 1g endovenoso

Justificativa da indicação:

- () Uso vinculado à Doença de Notificação Compulsória. Nº SINAN: _____
 () Cistite complicada (pacientes em leito de observação na UPA)
 () Pielonefrite aguda (pacientes em leito de observação na UPA)
 () Pneumonias em adulto com sinais de gravidade e indicação de internação (CRB-65)-
 - (pacientes em leito de observação na UPA):

Escore de avaliação CRB-65:
 Pontuação: 1 ponto para cada variável.
 () C = Confusão mental recente
 () R = Frequência respiratória > 30 ciclos/
 min
 () B = PAS < 90 mmHg ou PAD < 60 mmHg
 () 65 = mais de 65 anos

Relatar doença associada:
 Imunossupressão ()
 ICC ()
 DPOC/Astma ()
 Hepatopatia/Alcoolismo ()
 Diabetes ()

CRB 0 a 2 – leito de observação na UPA
 CRB 3 a 4 – internação hospitalar – 1ª dose no Pronto Atendimento da Unidade de Saúde ou em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e encaminhar para internação.

Data: ____/____/____ Assinatura e carimbo do médico: _____

Recomendação de dose:

IST (infecção gonocócica anogenital e faríngea não complicadas, uretrite gonocócica)	Ceftriaxona 500 mg + Azitromicina 1 mg DU
Infecção gonocócica disseminada	Ceftriaxona 1 g - injetável. Manter por 24 a 48h após melhora. Trocar para ciprofloxacina 500 mg, via oral, 2 vezes ao dia, completando ao menos 7 dias de tratamento.
Conjuntivite gonocócica	Ceftriaxona 1 g – injetável, dose única.
Cancroide e profilaxia de gonorréia	Ceftriaxona 500 mg – injetável, dose única.
DIP (doença inflamatória pélvica)	Ceftriaxona 500 mg DU + doxiciclina 100 mg VO 2 vezes ao dia, 14 dias + metronidazol 500 mg 2x/dia 14 dias.
Sífilis	Alternativa terapêutica na falta de benzilpenicilina: Ceftriaxona 1 g - injetável, uma vez ao dia, por 8 a 10 dias, gestante ou não.
Cistite complicada ou Pielonefrite	Ceftriaxona 1 a 2 g – injetável.
Pneumonia com sinais de gravidade	Ceftriaxona 2 g – injetável.

Referências:

1. REMUNE 2015. Disponível em: <http://gestao.saude.rio-preto.sp.gov.br/transparencia/>
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis. 2ª edição. Brasília, 2015. Disponível em: -file:///C:/Documents%20and%20Settings/alexandre/Mesa%20documentos/Downloads/miolo_pcdt_ist_22_06_2015_web.pdf_28486%20(2).pdf

LEVOFLOXACINO



FORMULÁRIO PARA DISPENSAÇÃO DE ANTIBIÓTICO LEVOFLOXACINO

Atenção: são condições para a dispensação do medicamento o preenchimento total e legível deste formulário e sua apresentação juntamente com a prescrição médica (em duas vias), na farmácia.

Paciente: _____
PFJ: _____ Idade: _____ Peso: _____ Kg

Medicamento requisitado:

- () Levofloxacino 500 mg
() Levofloxacino 750 mg (restrito: pneumonia grave)

Justificativa da indicação:

- () Pneumonia Adquirida na Comunidade em pacientes com **doenças associadas**.

Doenças Associadas:

- () Imossupressão
() ICC
() DPOC ou Asma
() Hepatopatia ou Alcoolismo
() Diabetes

- () Pneumonia Adquirida na Comunidade em pacientes que fizeram uso de antibióticos nos últimos 3 meses. Antibiótico utilizado anteriormente: _____

- () Pneumonia Adquirida na Comunidade - Antibiograma – microrganismo sensível. Resultado da cultura e antibiograma: _____

- () Segunda escolha para tratamento de **sinusite** (uso de antimicrobiano somente com persistência dos sintomas por mais de 7 dias ou dor facial/dentária ou febre alta com secreção nasal purulenta).

Data: ____/____/____

Assinatura e carimbo do médico: _____

Unidade de Origem: _____

Recomendação de dose - adultos:

1. Sinusite: 500 mg por via oral a cada 24 horas, por 5 a 7 dias
2. Pneumonia adquirida na comunidade: 750 mg por via oral a cada 24 horas, por 5 dias

Referências: REMUME 2019

VANCOMICINA



FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO ANTIBIÓTICO VANCOMICINA

Atenção: são condições para a dispensação do medicamento o preenchimento total e legível deste formulário e sua apresentação juntamente com a prescrição médica (em duas vias), na farmácia.

Paciente: _____ Prontuário: _____
PFJ: _____ Idade: _____ Peso: _____ Kg

Medicamento requisitado:

() Vancomicina 500 mg – pó para solução injetável.

Justificativa da Indicação:

() Continuação de tratamento osteomielite causadas por *Staphylococcus aureus* e *S. epidermidis* resistentes a meticilina.

() Antibiograma – microrganismo sensível. Relatar o resultado da cultura e antibiograma:

Data: ____/____/____

Assinatura e carimbo do médico: _____

Unidade de Origem: _____

Dose recomendada para crianças (acima de 1 mês):

10 a 15 mg/kg, por via intravenosa, a cada 8 horas¹

Dose recomendada para adultos:

500 mg, por via intravenosa, a cada 6 horas; ou 1.000 mg a cada 12 horas¹

ou

15-20 mg / kg IV a cada 8-12 horas em adultos com função renal normal^{3,4}

Dose Máxima recomendada: 2 g por dia.^{1,2,3}

Referências:

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. *Formulário terapêutico nacional 2010*. RENAME 2010/Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
2. American Society of Health System Pharmacists, Inc., DynaMed [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 233261, Vancomycin, [updated 2016 Jan 20]. [about 26 screens]. Disponível em: <<http://web.b.ebscohost.com/dynamed/detail?vid=17&sid=bd4c41b4-890e-49a4-b70b-9d007110f5289640sessionmgr101&hid=107&bdata=jmshbmc9cHQYnlmc210ZT1keWShbWVklWspdmUmc2NvcGU9c210ZQ963d%3d&AN=233261&db=dme>> Acesso: maio 2017.
3. DynaMed [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 116047, Osteomyelitis, [updated 2016 Jul 21]. [about 14 screens]. Disponível em: <<http://web.b.ebscohost.com/dynamed/detail?hid=c008d95-150b-49d4-a997-cef0d08b174f640sessionmgr104&vid=3&bdata=jmshbmc9cHQYnlmc210ZT1keWShbWVklWspdmUmc2NvcGU9c210ZQ963d%3d&AN=116047&db=dme>> Acesso: maio 2017.
4. BERBARI, E F. Native vertebral osteomyelitis in adults. Disponível em: <http://guideline.guilinescentral.com/555263-ata-vertebral-osteomyelitis>. Acesso: agosto 2017.

REMUME

2021