



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 03
DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018.**

Procede a publicação da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos) do ano de 2018, entre outras providências correlatas.

ANDRE LUCIANO BAITELLO, Secretário Municipal de Saúde - interino, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011.

DETERMINA:

Art.1º - A publicação da anexa Relação Municipal de Medicamentos – REMUME.

Art. 2º - A REMUME 2018 ora estabelecida, foi atualizada de acordo com os seguintes critérios:

I - seleção de medicamentos registrados no Brasil, em conformidade com a legislação sanitária;

II - consideração do perfil de epidemiológico do município.

III - necessidade de garantir a segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos disponibilizados a população;

IV - identificação do princípio ativo por sua Denominação Comum Brasileira - DCB ou na sua falta pela Denominação Comum Internacional - DCI;

V – disponibilidade de medicamentos no mercado;

Art. 3º - A REMUME 2018 norteia a prescrição e a dispensação de medicamentos nos serviços do SUS, em consonância com a Portaria nº 02 de 06 de fevereiro de 2018, garantindo o acesso a medicamentos e o seu uso racional.

Art. 4º - Fica revogada a Portaria nº 10 de 08 de Agosto de 2014, e demais disposições em contrário.

Art. 5º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, e, será publicada por afixação na mesma data e local de costume, e, em Diário Oficial do Município, bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, publique-se, registre-se e cumpra-se.

São José do Rio Preto, 15 de fevereiro de 2018.

ANDRE LUCIANO BAITELLO


SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE – INTERINO



PREFEITURA DE
RIO PRETO
SAÚDE

REMUME 2018

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS



São José do Rio Preto/SP

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Secretaria Municipal de Saúde

Comissão de Farmácia e Terapêutica – Portaria SMS nº 06 de 23 de fevereiro de 2017.

Adriana Érika Marques Guarnieri – enfermeira – DAB/DAE
Alcides Pinto de Souza Junior – médico urgência e Emergência - DUE
Andrea Zocal – pediatra – DAB
Ana Ligia Pereira Santos – farmacêutica – DAF
Ana Maria Carpes Pranke – dentista – DAB
Anderson José de Almeida – farmacêutico – DAF
Antonio Edir Guizilini – pediatra – DUE
Carlos Lobanco Riccardi – médico clínico geral – DAB
Carmen Lígia Firmino Marques – farmacêutica – DAF
Clodoaldo Sardilli – médico ginecologia - DAB
Fernanda Salomão Gorayeb - médico clínico geral – DAB
Marcia Wakai Catelan – infectologista pediátrica – DEVISA.
Maria Silvia Araújo Pereira – farmacêutica – DAF
Simone Secco da Rocha – médica psiquiatra – DAE

Colaboração

Alex dos Reis Recio - DAF
Gustavo Marcatto – médico – DUE
Soraya Andrade Pereira – médica – DAB
Tatiani Caroline Verssuti dos Santos Faria - DAF

Abreviaturas

AE – Prescrição Ambulatório Especializado

AMP – ampola

BIS – Bisnaga

CAR - Cartela

D – Dispensação para o paciente

EV – Endovenoso

FR – Frasco

FR AMP – frasco ampola

G - Grama

IM – Intramuscular

ML – Mililitros

SC - Subcutâneo

US – Uso na Unidade de Saúde

VO – Via oral

Sumário

I – CLASSIFICAÇÃO POR GRUPO FARMACOLÓGICO	11
A - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12
1. ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS	12
1.1. ANALGÉSICO NÃO OPIOIDE E ANTIPIRÉTICOS	12
1.2. ANALGÉSICO OPIÓIDE.....	12
2. ANESTÉSICOS	12
2.1. ANESTÉSICO LOCAL	12
2.2. ADJUVANTES DA ANESTESIA.....	13
2.3. BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR	13
3. ANTIALÉRGICO	13
4. ANTÍDOTOS USADOS EM INTOXICAÇÕES EXÓGENAS	13
4.1. NÃO ESPECÍFICO.....	13
4.2. ESPECÍFICO	14
5. ANTI-INFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA	14
5.1. ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES	14
5.2. ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES	14
5.3. MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA	15
6. ANTIMICROBIANOS	15
6.1. ANTIBACTERIANOS SISTÊMICOS.....	15
6.1.1. PENICILINAS.....	15
6.1.2. CEFALOSPORINAS	15
6.1.3. GLICOPEPTÍDEOS	16
6.1.4. SULFONAMIDAS E ANTI-SÉPTICOS URINÁRIOS.....	16
6.1.5. MACROLÍDEOS	16
6.1.6. QUINOLONAS.....	16
6.1.7. TETRACICLINAS.....	17
6.1.8. IMIDAZÓLICOS	17
6.2. ANTIBACTERIANOS TÓPICOS.....	17
6.3. OFTALMOLÓGICOS.....	17
6.4. ANTIFÚNGICOS.....	17

6.4.1. SISTÊMICOS	17
6.4.2. TÓPICOS	18
6.5. ANTIVIRAIS	18
6.6. ANTISSEPTICOS	18
6.7. ANTIPARASITÁRIOS	18
6.7.1. ESCABICIDA E PEDICULICIDA	18
6.7.2. ANTI-HELMÍNTICOS	19
6.7.3. ANTIPROTOZOÁRIOS	19
6.7.3.1. AMEBICIDA, GIARDICIDA E TRICOMONICIDA	19
6.7.3.2. MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE E ADJUVANTES	19
7. ANTIVERTIGINOSOS	19
8. VITAMINAS	19
9. CORREÇÃO DE ELETRÓLITOS	20
10. SUPLEMENTOS MINERAIS	20
10.1. REIDRATAÇÃO ORAL	20
11. SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO	20
ÁCIDO-BÁSICO	20
12. SISTEMA CARDIOVASCULAR	21
12.1. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA	21
12.2. ANTI-ARRÍTIMICO	21
12.3. ANTI-HIPERTENSIVO	22
12.3.1. DIURÉTICOS	22
12.3.2. BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS	22
12.3.3. BLOQUEADOR DE CANAIS DE CÁLCIO	22
12.3.4. VASODILATADOR	22
12.3.5. INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA	22
12.3.6. ANTAGONISTA DE RECEPTOR DE ANGIOTENSINA II	22
12.4. USADOS EM CHOQUE	23
12.5. HIPOLIPEMIANTE	23
12.6. GLICOSÍDEO CARDÍACO	23
12.7. ANTITROMBÓTICO	23
13. SISTEMA DIGESTIVO	23

13.1. ANTIÁCIDOS	23
13.2. ANTISECRETORES.....	23
13.3. ANTIEMÉTICOS E AGENTES PRÓCINÉTICOS.....	23
13.4. ANTIESPASMÓDICO	24
13.5. ANTIESPASMÓDICO ASSOCIADO COM ANALGÉSICO.....	24
13.6. LAXATIVO	24
13.7. ANTIFLATULANTE.....	24
14. SISTEMA ENDÓCRINO	25
14.1. HORMÔNIOS TIREOIDIANOS	25
14.2. INSULINAS E HIPOGLICEMIANTES ORAIS	25
15. SISTEMA REPRODUTOR - HORMÔNIOS SEXUAIS.....	25
15.1. REPOSIÇÃO HORMONAL.....	25
15.2. INIBIDOR DA PROLACTINA	25
15.3. CONTRACEPTIVOS HORMONAIS ORAIS.....	25
15.4. CONTRACEPTIVOS HORMONAIS INJETÁVEIS.....	26
15.5. CONTRACEPTIVO DE BARREIRA	26
15.6. CONTRACEPTIVO DE USO TÓPICO.....	26
15.7. DIAGNÓSTICO	26
16. TRATAMENTO/PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE	26
17. SISTEMA RESPIRATÓRIO	26
17.1. ANTIASMÁTICOS.....	26
17.2. PREPARAÇÕES NASAIS	27
17.3. INALANTES.....	27
18. SANGUE	27
18.1 ANTIANÊMICOS	27
18.2. ANTICOAGULANTES	27
18.3. ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS.....	27
18.4. ANTI-HEMORRÁGICO.....	27
19. SISTEMA NERVOSO	28
19.1. ANTICONVULSIVANTE.....	28
19.2. ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZANTES DO HUMOR.....	28
19.3. ANSIOLÍTICOS E HIPOSEDATIVOS.....	29

19.4. ESTIMULANTE SISTEMA NERVOSO CENTRAL	30
19.5. AUXILIAR DO TRATAMENTO DO ALCOOLISMO.....	30
19.6. ANTIPARKINSONIANOS	30
19.7. ANTIPSICÓTICOS	30
20. SISTEMA OCULAR.....	31
20.1. ANESTÉSICO LOCAL	31
20.2. CICATRIZANTE.....	31
20.3.MIDRIÁTRICOS E CICLOPLÉGICOS.....	31
20.4. AGENTE DIAGNÓSTICOUS	31
20.5. DESCONGESTIONANTES E ANTIALÉRGICOS	31
20.6. ANTIMICROBIANO.....	31
21. PELE E MUCOSA	32
21.1. CICATRIZANTES, EMOLIENTES E PROTETORES.....	32
21.2. ANTIMICROBIANOS.....	32
21.3. TRATAMENTO DE FERIDAS.....	32
22. SISTEMA UROGENITAL.....	32
22.1. HIPERPLASIA BENÍGNA DA PRÓSTATA	32
22.1.1. ANTAGONISTA ALFA-ADRENÉRGICO	32
23. FITOTERÁPICOS.....	32
24. HOMEOPÁTICOS	33
25. OUTROS PRODUTOS AUXILIARES NÃO TERAPÊUTICOS	33
25.1. AUTOMONITORAMENTO DE GLICEMIA.....	33
25.2. OXIGENOTERAPIA.....	33
25.3. DIAGNÓSTICO SAÚDE DA MULHER.....	33
B - COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.....	33
1. PROGRAMA DST/AIDS	33
1.1. ANTIVIRAIS.....	33
1.2.ANTIRRETROVIRAIS.....	34
1.2.1.INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA ANÁLOGA DE NUCLEOSÍDEO.....	34
1.2.2.INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA NÃO-ANÁLOGOS DE NUCLEOSÍDEO.....	34
1.2.3.INIBIDORES DE PROTEASE.....	35
1.2.4.INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA ANÁLOGA DE NUCLEOTÍDEO	35

1.2.5.INIBIDORES DE INTEGRASE.....	36
1.2.6.INIBIDORES DE FUSÃO.....	36
1.3.OUTROS ANTIRRETROVIRAIS.....	36
1.4.ANTI-INFECCIOSO/ANTI-FÚNGICO E ADJUVANTES	36
1.5.SISTEMA DIGESTIVO	36
1.5.1.ANTIDIARRÊICO SINTOMÁTICO	36
2.PROGRAMA TUBERCULOSE.....	36
3.PROGRAMA HANSENÍASE.....	37
3.1.TRATAMENTO.....	37
3.2. COADJUVANTES	38
SSIFICAÇÃO – ÓRDEM ALFABÉTICA.....	39
III – MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS	60
1. ATENÇÃO BÁSICA.....	61
1.1 CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA	61
1.2 MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	61
1.2.1 KIT PARA GLICEMIA	64
2. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.....	65
2.1 CARRINHO DE EMERGÊNCIA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.....	65
2.2 SALA DE EMERGÊNCIA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA	66
2.2.1 KIT PARA GLICEMIA.....	68
IV – USO DE ANTIMICROBIANOS EM INFECÇÕES EM ADULTOS.....	69
1. TRATAMENTO DAS INFECÇÕES REPIRATÓRIAS ALTAS	70
1.1. SINUSITE ^{1,2,3,4}	70
1.2. FARINGITE E AMIGDALITE PURULENTAS ^{3,5,6}	70
1.3. RINITE ¹⁹	70
1.4. OTITE MÉDIA AGUDA ^{1,3,7}	70
1.5. BRONQUITE AGUDA ¹	70
1.6. COQUELUCE ^{3,8,9,10}	71
1.7. PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE ^{3,11,12,13}	71
1.7.1. PACIENTES PREVIAMENTE SADIOS, TRATAMENTO EM DOMICÍLIO, SEM USO DE ANTIBIÓTICOS	71
NOS ÚLTIMOS 3 MESES: ^{11,12,13}	71
1.7.2. PACIENTES COM DOENÇAS ASSOCIADAS OU USO DE ANTIBIÓTICOS NOS ÚLTIMOS 3 MESES: ^{11,12}	71

1.7.3. PACIENTES LEITO DE OBSERVAÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ²⁴	71
1.7.4. PACIENTES GRAVES ENCAMINHADOS PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR ²⁴	72
2. TRATAMENTO DAS INFECÇÕES URINÁRIAS	72
2.1. CISTITE AGUDA EM MULHERES GRÁVIDAS ^{3,15,16}	72
2.2. CISTITE AGUDA NÃO COMPLICADA EM ADULTO ^{3,14,16}	72
2.3. UROCULTURA ³	73
2.4. CISTITE COMPLICADA – PACIENTES EM LEITO DE OBSERVAÇÃO NA UPA ²⁵	73
2.5. PIELONEFRITE AGUDA ^{3,14,16}	73
2.6. UROCULTURA ³	73
2.7. PIELONEFRITE AGUDA - PACIENTES EM LEITO DE OBSERVAÇÃO UPA ²⁵	74
3. TRATAMENTO DAS INFECÇÕES DE PELE	74
3.1. IMPETIGO ^{17,20,22}	74
3.2. ERISPELA LEVE PRECOCE ^{3,21,23}	74
3.3. ERISPELA EXTENSA	74
3.4. CELULITE LEVE ^{3,18,21,23}	75
3.5. CELULITE EXTENSA E GRAVE	75
3.6. PROFILAXIA DE MORDEDURA DE CÃO OU GATO OU ANIMAIS ^{3,8}	75
3.7. INFECÇÃO PÓS MORDEDURA DE CÃO OU GATO OU ANIMAIS (MORDEDURAS MÚLTIPLAS E EXTENSAS) ³	75
V – USO DE ANTIMICROBIANOS EM INFECÇÕES PEDIÁTRICAS	79
1. OTITE MEDIA AGUDA ¹	80
2. PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE	80
2.1. PNEUMONIA AFEBRIL DO LACTENTE (2 A 12 SEMANAS DE VIDA). ¹	80
2.2. LACTENTES E PRÉ ESCOLARES (2 MESES E < 6 ANOS) ^{1,2}	80
2.3. ESCOLARES ^{1,2}	80
3. IMPETIGO BOLHOSO, CELULITE OU ERISPELA ¹	81
4. FARINGITE ¹	81
5. INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO ¹	81
VI – USO DE ANTIMICROBIANOS EM PARASITÓSES INTESTINAIS	83
1. AMEBÍASE ^{1, 2}	84
2. ENTEROBÍASE ^{1, 2, 3}	84
3. GIARDÍASE ^{1,2}	84
4. ASCARIDÍASE ^{2,3}	85

5. TENÍASE ^{1,2,3}	85
6. ESCABIOSE ²	85
7. PEDICULOSE ²	86
8. ESTRONGILOIDÍASE ^{1, 2, 3}	86
9. LARVA MIGRANS ^{1,2,3}	87
VII – USO DE ANTIMICROBIANOS EM CORRIMENTOS VAGINAIS	88
1. USO DE ANTIMICROBIANOS EM CORRIMENTOS VAGINAIS	88
1.1. TRICOMONÍASE ^{1,2,3}	89
1.2. CANDIDÍASE VULVOVAGINAL ¹	89
1.3. VAGINOSE BACTERIANA ¹	89
1.4. INFECÇÕES MISTAS (TRICOMONÍASE / VAGINOSE BACTERIANA / CANDIDÍASE)	90
2. USO DE ANTIMICROBIANOS EM CORRIMENTOS URETRAIS	90
2.1. URETRITE GONOCÓCICA E POR CLAMÍDIA NÃO COMPLICADA (URETRITE E PROCTITE) ¹	90
2.2. URETRITE POR CLAMÍDIA ¹	90
2.3. URETRITE POR MYCOPLASMA GENITALIUM ¹	91
3. SÍFILIS	91
3.1 SÍFILIS PRIMÁRIA, SÍFILIS SECUNDÁRIA E LATENTE RECENTE (ATÉ UM ANO DE DURAÇÃO) ¹	91
3.2 SÍFILIS LATENTE TARDIA (MAIS DE UM ANO DE DURAÇÃO) OU LATENTE COM DURAÇÃO	91
IGNORADA E SÍFILIS TERCIÁRIA ¹	91

I – CLASSIFICAÇÃO POR GRUPO FARMACOLÓGICO

A - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
1. ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS			
1.1. ANALGÉSICO NÃO OPIOIDE E ANTIPIRÉTICOS			
Dipirona	solução oral 500 mg/ml, fr 10 ml		D
Dipirona	solução injetável 500 mg/ml, amp 2 ml, IM/IV		US
Paracetamol	comprimido 500 mg solução oral 200 mg/ml, fr 15 ml		D
1.2. ANALGÉSICO OPIOÍDE			
Codeína	comprimido 30 mg	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
Morfina	solução injetável 1 mg/ml, amp 2 ml, IM/IV solução injetável 10 mg/ml, amp 1 ml, IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
2. ANESTÉSICOS			
2.1. ANESTÉSICO LOCAL			
Lidocaína	gel 2% aerossol 10% solução injetável 2% - tubete 1,8 ml e frasco amp 20 ml		US
Lidocaína + epinefrina	solução injetável 20 mg + 0,005 mg/ml		US
Lidocaína + epinefrina	solução injetável 20 mg + 1/100.000/ml	Uso odontológico.	US

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Prilocaína + felipressina	solução injetável 30 mg + 0,03 UI/ml	Uso odontológico.	US
2.2. ADJUVANTES DA ANESTESIA			
Etomidato	solução injetável 2 mg/ml, amp 10 ml, IV	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
Fentanila	solução injetável 50 mcg/ml, amp 2 ml, IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Uso restrito na UPA, SAMU e Complexo Pró-Saúde. Receita branca.	US
Midazolam	solução injetável 5 mg/ml, amp 3 ml, IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
Propofol	Solução injetável 10mg/ml, amp 20ml	Uso exclusivo serviço de diagnóstico - Complexo Pró Saúde.	US
2.3. BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR			
Suxametônio	pó para solução injetável 500 mg, fr amp, IM/IV/SC		US
3. ANTIALÉRGICO			
Loratadina	comprimido 10 mg solução oral 1 mg/ml, fr 100 ml		D
Prometazina	comprimido 25 mg		D
Prometazina	solução injetável 25 mg/ml, amp 2 ml, IM		US
4. ANTÍDOTOS USADOS EM INTOXICAÇÕES EXÓGENAS			
4.1. NÃO ESPECÍFICO			
Bicarbonato de sódio	solução injetável 1 mEq/mL (8,4%), fr 250 ml, IV		US
Carvão vegetal ativado	pó para uso oral, sache 10 g		US

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
4.2. ESPECÍFICO			
Atropina	solução injetável 0,50 mg/ml, amp 1 ml, IM/IV/SC		US
Flumazenil	solução injetável 0,1 mg/ml, amp 5 ml, IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
5. ANTI-INFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA			
5.1. ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES			
Diclofenaco	comprimido 50 mg	Uso não recomendado para crianças menores 12 anos	D
Diclofenaco sódico	solução injetável 25 mg/ml, amp 3 ml, IM		US
Ibuprofeno	solução oral 50 mg/ml, gotas, fr 30 ml		D
Tenoxicam	solução injetável 10 mg/ml, ampola 2ml, IM/EV	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo.	US
5.2. ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES			
Dexametasona	creme 0,1%, bis 10 g		D
Dexametasona	solução injetável 2 mg/ml, amp 1 ml, IM/IV solução injetável 4 mg/ml, amp 2,5 ml, IM/IV		US
Hidrocortisona	pó para solução injetável 100 mg, fr amp, IM/IV pó para solução injetável 500 mg, fr amp, IM/IV		US
Prednisolona	solução oral 3 mg/ml, fr 100 ml		D
Prednisona	comprimido 5 mg comprimido 20 mg		D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona	solução injetável 3 mg + 3 mg/ml, amp 1 ml, IM	Uso restrito para gestantes em situação de risco.	D
5.3. MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA			
Alopurinol	comprimido 100 mg comprimido 300 mg		D
6. ANTIMICROBIANOS			
6.1. ANTIBACTERIANOS SISTÊMICOS			
6.1.1. PENICILINAS			
Amoxicilina	cápsula ou comprimido 500 mg suspensão oral 250 mg/5 ml, fr 60 e 150 ml		D
Amoxicilina + ácido clavulânico	comprimido 500 mg + 125 mg suspensão oral 250 mg + 62,5 mg/5 ml, fr 75 ml	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, de acordo com a legislação municipal vigente. Receita em duas vias.	D
Benzilpenicilina benzatina	pó para suspensão injetável 600.000 UI, fr amp, IM pó para suspensão injetável 1.200.000 UI, fr amp, IM	Receita em duas vias.	D
Benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina benzatina	pó para suspensão injetável 300.000 UI + 100.000 UI, fr amp, IM	Receita em duas vias.	D
6.1.2. CEFALOSPORINAS			
Cefalexina	cápsula ou comprimido 500 mg suspensão oral 250 mg/5 ml, fr 100 ml	Receita em duas vias.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Ceftriaxona	pó para solução injetável 1g, fr amp, IV	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, de acordo com a legislação municipal vigente. Nos casos de IST é necessária a notificação. Receita em duas vias.	D
6.1.3. GLICOPEPTÍDEOS			
Vancomicina	pó para solução injetável 500 mg, IV (infusão)	Uso em continuidade do tratamento de osteomielite. Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, de acordo a legislação municipal vigente. Receita em duas vias.	D
6.1.4. SULFONAMIDAS E ANTI-SÉPTICOS URINÁRIOS			
Sulfametoxazol + trimetoprima	comprimido 400 mg + 80 mg suspensão oral 200mg + 40 mg/5ml, fr 100 ml	Receita em duas vias.	D
Nitrofurantoína	comprimido 100 mg	Receita em duas vias.	D
6.1.5. MACROLÍDEOS			
Azitromicina	comprimido 500 mg	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, de acordo com legislação municipal vigente. Receita em duas vias.	D
Claritromicina	comprimido 500 mg	Uso em pacientes com diagnóstico de H. Pylori. Uso restrito para o tratamento de micobactérias atípicas. Receita em duas vias.	D
Eritromicina	suspensão oral 250 mg/5 ml, fr 60 ml	Receita em duas vias.	D
6.1.6. QUINOLONAS			
Ciprofloxacino	cápsula ou comprimido 500 mg	Receita em duas vias.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Levofloxacino	comprimido de 250 mg e 500 mg	Uso em pneumonia adquirida na comunidade. Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, de acordo com legislação municipal vigente. Receita em duas vias.	D
Clindamicina	cápsula 300 mg	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio. Uso em IST necessário a notificação. Receita em duas vias.	D
Clindamicina	solução injetável 150mg/ml, amp 4 ml, IM/EV	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo.	US
6.1.7. TETRACICLINAS			
Doxiciclina	comprimido 100 mg	Receita em duas vias.	D
6.1.8. IMIDAZÓLICOS			
Metronidazol	comprimido 250 mg suspensão oral 40 mg/ml, fr 80 ml	Receita em duas vias.	D
Metronidazol	solução injetável 5mg/ml, fr 100 ml, EV	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo.	US
6.2. ANTIBACTERIANOS TÓPICOS			
Neomicina + bacitracina	pomada 5 mg + 250 UI/g, bis 10 g		D
6.3. OFTALMOLÓGICOS			
Gentamicina	colírio 5 mg/ml, fr 5 ml	Receita em duas vias.	D
6.4. ANTIFÚNGICOS			
6.4.1. SISTÊMICOS			
Itraconazol	comprimido 100 mg	Receita em duas vias.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
6.4.2. TÓPICOS			
Nistatina	suspensão oral 100.000 UI/ml, fr 50 ml	Receita em duas vias.	D
Miconazol	creme dermatológico 20 mg/g, bis 28 g	Uso restrito para lactentes, crianças e dermatite fúngica da área das fraldas.	D
Miconazol	creme vaginal 2%, bis 80 g + 1-aplicadores	Uso restrito pela via de aplicação vaginal.	D
6.5. ANTIVIRAIS			
Aciclovir	comprimido 200 mg	Receita em duas vias.	D
Oseltamivir	comprimido 30 mg comprimido 45 mg comprimido 75 mg	Receita em duas vias.	D
6.6. ANTISSEPTICOS			
Ácido tricloroacético	solução 80%, fr 20 ml		US
Água oxigenada	solução 10 vol., fr 1000 ml		US
Álcool etílico	solução 70%, fr 1000 ml gel 70%, 500 ml	Antissepsia das mãos e da pele.	US
Hipoclorito de sódio	solução 2,5%, fr 50 ml		D
Iodopovidona – PVPI	solução aquosa 10 % (1 % iodo ativo) , fr 1000 ml		US
Iodopovidona – PVPI	degermante 10 % (1 % iodo ativo), fr 1000 ml		US
Permanganato de potássio	comprimido 100 mg		D
6.7. ANTIPARASITÁRIOS			
6.7.1. ESCABICIDA E PEDICULICIDA			
Ivermectina	comprimido 6 mg		D
Permetrina	loção 1 % e 5 %, fr 60 ml		D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
6.7.2. ANTI-HELMÍNTICOS			
Albendazol	comprimido mastigável 400 mg suspensão oral 40 mg/ml, fr 10 ml		D
Ivermectina	comprimido 6 mg		D
6.7.3. ANTIPROTOZOÁRIOS			
6.7.3.1. AMEBICIDA, GIARDICIDA E TRICOMONICIDA			
Metronidazol	comprimido 250 mg suspensão oral 40 mg/ml, fr 80 ml	Receita em duas vias.	D
Metronidazol	geleia vaginal 500 mg/5 g, bis 50 g + 10 aplicadores	Receita em duas vias.	D
Tinidazol	comprimido 500 mg		D
6.7.3.2. MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE E ADJUVANTES			
Ácido fólico	comprimido 15 mg	Crianças até um ano manipulação conforme Portaria SMS nº 02 de 26 de janeiro de 2015.	D
Clindamicina	cápsula 300 mg	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio, de acordo com legislação municipal vigente. Receita em duas vias.	D
Pirimetamina	comprimido 25 mg	Crianças até um ano manipulação conforme Portaria SMS nº 02 de 26 de janeiro de 2015.	D
Sulfadiazina	comprimido 500 mg	Crianças até um ano manipulação conforme Portaria SMS nº 02 de 26 de janeiro de 2015.	D
7. ANTIVERTIGINOSOS			
Cinarizina	comprimido 75 mg		D
8. VITAMINAS			
Tiamina	comprimido 300 mg	Prevenção e tratamento da deficiência da tiamina.	D
Tiamina	solução injetável (100 mg/ml), amp 1 ml, IM/IV	Situações de emergência em alcoolistas crônicos.	US

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Vitamina C (ácido ascórbico)	comprimido 500 mg	Pacientes em hemodiálise.	D
Vitamina do complexo B (tiamina (B1) + riboflavina (B2) + pantotenato (B5) + piridoxina (B6)	drágeas	Pacientes em hemodiálise e em tratamento da tuberculose.	D

9. CORREÇÃO DE ELETRÓLITOS

Cloreto de potássio	xarope 6%, fr 100 ml		D
---------------------	----------------------	--	---

10. SUPLEMENTOS MINERAIS

10.1. REIDRATAÇÃO ORAL

Sais para reidratação oral	Composição: cloreto sódio 3,5g glicose 20g, indicação citrato de sódio 2,9g cloreto de potássio 1,5g. Pó para o preparo de solução oral. Para uso em 1.000ml de solução pronta, segundo padrão OMS. Envelope contendo 27,9g		D
----------------------------	---	--	---

11. SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO

Água para injeção	solução injetável, amp 10 ml		US
Bicarbonato de sódio	solução injetável 1 mEq/ml (8,4%), fr 250 ml, IV		US
Cloreto de potássio	solução injetável 19,1% (2,56 mEq/ml), amp 10 ml, IV		US
Cloreto de sódio	solução injetável 20 % (3,4 Eq/ml), amp 10 ml, IV		US
Gliconato de cálcio	solução injetável 10 % (0,45 mEq/ml), amp 10 ml, IV		US

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Glicose	solução injetável 250 mg/ml (25%), amp 10 ml, IV solução injetável 500 mg/ml (50%), amp 10 ml, IV		US
Soro fisiológico – cloreto de sódio	solução injetável 0,9 % (0,154 mEq/ml), fr 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1000 ml, IV		US
Soro glicosado – glicose	solução injetável 50 mg/ml (5%), fr 250 e 500 ml, IV		US
Solução ringer + lactato	solução injetável, fr 500 ml, IV Composição por litro: cloreto 109 mEq, sódio 130 mEq, potássio 4 mEq, cálcio 2,7 mEq, lactato 27,7 mEq		US
Sulfato de magnésio	solução injetável 10 %, amp 10 ml, IV	Indicado para casos de pré-eclampsia e eclampsia.	US

12. SISTEMA CARDIOVASCULAR

12.1. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Carvedilol	comprimido 3,125 mg comprimido 12,5 mg comprimido 25 mg	Uso restrito em Insuficiência Cardíaca Congestiva.	D
Digoxina	comprimido 0,25 mg		D
Espironolactona	comprimido 25 mg comprimido 100 mg		D

12.2. ANTI-ARRÍTIMICO

Adenosina	solução injetável 3 mg/ml, amp 2 ml, IV		US
Amiodarona	comprimido 200 mg		D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Amiodarona	solução injetável 50 mg/ml, amp 3 ml, IV		US
Metoprolol	solução injetável 1 mg/ml, seringa pré-carregada 5 ml, IV		US
12.3. ANTI-HIPERTENSIVO			
12.3.1. DIURÉTICOS			
Furosemida	comprimido 40 mg		D
Furosemida	solução injetável 10 mg/ml, amp 2 ml, IM/IV		US
Hidroclorotiazida	comprimido 25mg	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D
Manitol	solução a 20%, fr 250 ml, IV e oral	Dispensação com solicitação exame médico.	D
12.3.2. BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS			
Atenolol	comprimido 25 mg comprimido 50 mg	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular a apresentação 25mg.	D
Metildopa	comprimido 250 mg		D
Propranolol	comprimido 40mg	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D
12.3.3. BLOQUEADOR DE CANAIS DE CÁLCIO			
Anlodipino	comprimido 5 mg		D
12.3.4. VASODILATADOR			
Dinitrato de isossorbida	comprimido sublingual 5 mg		US
Hidralazina 50mg	comprimido	Paciente renal crônico.	D
12.3.5. INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA			
Captopril	comprimido 25 mg	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D
Enalapril	comprimido 20mg		D
12.3.6. ANTAGONISTA DE RECEPTOR DE ANGIOTENSINA II			
Losartana	comprimido 50mg	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
12.4. USADOS EM CHOQUE			
Adrenalina	solução injetável 1 mg/mL, amp 1 ml, IM/IV/SC		US
Dopamina	solução injetável 5 mg/ml, amp 10 ml, IV		US
12.5. HIPOLIPEMIANTES			
Sinvastatina	comprimido 20 mg comprimido 40 mg		D
12.6. GLICOSÍDEO CARDÍACO			
Deslanosídeo	solução injetável 0,2 mg/ml, amp 2 ml, IM/IV		US
12.7. ANTITROMBÓTICO			
Clopidogrel	comprimido 75 mg	Uso exclusivo na admissão de pacientes com síndrome coronariana aguda.	US
13. SISTEMA DIGESTIVO			
13.1. ANTIÁCIDOS			
Hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio	suspensão oral 60 + 40 mg/ml, fr 100 ml		D
13.2. ANTISECRETORES			
Omeprazol	comprimido ou cápsula 20mg	Uso restrito de acordo com protocolo.	D
Omeprazol	solução injetável 40 mg, fr amp, IV	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo.	US
Ranitidina	solução injetável 25 mg/ml, amp 2 ml, IM/IV		US
Ranitidina	solução oral 150 mg/10 ml, fr 120 ml	Uso pediátrico. Dispensação mediante prescrição por especialistas em gastro e pneumopediatria. Dispensação na Farmácia Municipal.	AE
13.3. ANTIEMÉTICOS E AGENTES PRÓCINÉTICOS			
Bromoprida	gotas orais 4 mg/ml, fr 20 ml		D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Bromoprida	solução injetável 5 mg/mlm amp 2 ml, IM/IV		US
Dimenidrinato + piridoxina	solução injetável 50 mg + 50 mg/ml, amp 1 ml, IM		US
Domperidona	suspensão oral 1 mg/ml, fr 100 ml	Uso pediátrico. Dispensação mediante prescrição por especialistas em gastro e pneumopediatria. Dispensação na Farmácia Municipal.	AE
Metoclopramida	comprimido 10 mg		D
Metoclopramida	solução injetável 5 mg/ml, amp 2 ml, IM/IV		US
13.4. ANTIESPASMÓDICO			
Brometo de N-butilescopolamina	comprimido 10 mg		D
Brometo de N-butilescopolamina	solução injetável 20 mg/ml, amp 1 ml, IM/IV/SC		US
13.5. ANTIESPASMÓDICO ASSOCIADO COM ANALGÉSICO			
Brometo de N-butilescopolamina + dipirona	solução injetável 4 mg + 500 mg/ml, amp 5 ml, IM/IV		
13.6. LAXATIVO			
Bisacodil	comprimido 5 mg	Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.	D
Solução para clister com glicerina	solução 12%		US
Solução fosfatada	solução para enema	Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.	D
13.7. ANTIFLATULANTE			
Simeticona (dimeticona)	solução oral 75 mg/ml, fr 10 ml	Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
14. SISTEMA ENDÓCRINO			
14.1. HORMÔNIOS TIREOIDIANOS			
Levotiroxina	comprimido 25 mcg, 50 mcg e 100 mcg		D
14.2. INSULINAS E HIPOGLICEMIANTES ORAIS			
Gliclazida	comprimido de ação prolongada 60 mg		D
Insulina humana NPH	suspensão injetável 100 UI/ml, fr amp 10 ml	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D
Insulina humana regular	solução injetável 100 UI/ml, fr amp 10 ml	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D
Metformina	comprimido 500 mg comprimido 850 mg	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D
15. SISTEMA REPRODUTOR - HORMÔNIOS SEXUAIS			
15.1. REPOSIÇÃO HORMONAL			
Estriol	creme vaginal 1 mg/g, bis 50 g		D
Estradiol	comprimido 1 mg, car 28 drágeas		D
Noretisterona + estradiol	comprimido 0,5 mg + 1 mg (cartela com 28 comprimidos)		D
15.2. INIBIDOR DA PROLACTINA			
Cabergolina	comprimido 0,5 mg	Uso restrito para lactantes HIV positivas e outros casos especiais. Receita em duas vias. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
15.3. CONTRACEPTIVOS HORMONAIS ORAIS			
Etinilestradiol + gestodeno	comprimido 20 mcg + 75 mcg		D
Etinilestradiol + levonorgestrel	comprimido 30 mcg + 150 mcg		D
Levonorgestrel	ccmprimido 0,75 mg	Uso restrito para contracepção de emergência.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Noretisterona	comprimido 0,35 mg		D
Progesterona	comprimido 100mg	Uso restrito ao protocolo de atenção pré-natal – obrigatório preenchimento de formulário próprio.	D
15.4. CONTRACEPTIVOS HORMONAIS INJETÁVEIS			
Medroxiprogesterona	solução injetável 150 mg/ml, amp 1 ml, IM		D
Noretisterona, enantato + estradiol, valerato	solução injetável 50 mg + 5 mg/ml, amp 1 ml, IM		D
15.5. CONTRACEPTIVO DE BARREIRA			
Preservativo masculino	unidade 52 mm		D
15.6. CONTRACEPTIVO DE USO TÓPICO			
DIU (dispositivo intrauterino)	unidade	Procedimento realizado em Unidade de Saúde.	US
15.7. DIAGNÓSTICO			
Medroxiprogesterona	comprimido 10 mg	Uso restrito para teste de dosagem de progesterona.	D
16. TRATAMENTO/PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE			
Alendronato de sódio	comprimido 70 mg		D
Carbonato de cálcio + Vitamina D	comprimido 1250 mg (500mg de cálcio ionizável) + 200 UI		D
17. SISTEMA RESPIRATÓRIO			
17.1. ANTIASMÁTICOS			
Aminofilina	comprimido de 100 mg		D
Aminofilina	solução injetável 24 mg/ml, amp 10 ml, IV		US
Beclometasona, dipropionato de	aerossol oral, 50 mcg/dose aerossol oral, 250 mcg /dose	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular. Apresentações 200 e 250 mcg.	D
Salbutamol	aerossol, 100 mcg /dose	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Terbutalino	solução injetável 0,5 mg/ml, amp 1 ml, IV (infusão)/SC		US
17.2. PREPARAÇÕES NASAIS			
Cloreto de sódio + cloreto benzalcônio 0,01%	solução nasal 0,9%, fr 30 ml		D
17.3. INALANTES			
Fenoterol	gotas para inalação 5 mg/ml, fr 20 ml		US
Ipratrópio, brometo	gotas para inalação 0,25 mg/ml, fr 20 ml		US
18. SANGUE			
18.1 ANTIANÊMICOS			
Ácido fólico	comprimido 5 mg		D
Sulfato ferroso	comprimido 40 mg ferro elementar gotas orais 25 mg ferro elementar, fr 30 ml		D
18.2. ANTICOAGULANTES			
Enoxaparina	20 mg/0,2 ml seringa preenchida 0,2 ml, SC 60 mg/0,6 ml seringa preenchida 0,6 ml, SC	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo.	US
Heparina	solução injetável 5.000 UI/0,2ml , amp 0,25 ml, SC	Uso restrito de acordo com protocolo.	D
Varfarina sódica	comprimido 5 mg		D
18.3. ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS			
Ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg		D
18.4. ANTI-HEMORRÁGICO			
Fitomenadiona (vit. K1)	solução injetável 10 mg/ml, amp 1 aml, IM/SC		US

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
19. SISTEMA NERVOSO			
19.1. ANTICONVULSIVANTE			
Ácido valpróico ou valproato de sódio	cápsula ou comprimido 288 mg (equivalente a 250 mg ácido valpróico) solução oral ou xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg ácido valpróico/mL), fr 100 ml	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Carbamazepina	comprimido 200 mg suspensão oral 100 mg/5 ml, fr 100 ml	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Fenitoína	comprimido 100 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Fenitoína	solução injetável 50 mg/ml, amp 5 ml, IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
Fenobarbital	comprimido 100 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Fenobarbital	solução injetável 100 mg/ml, amp 2 ml, IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
19.2. ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZANTES DO HUMOR			
Ácido valpróico ou valproato de sódio	cápsula ou comprimido 288 mg (equivalente a 250 mg ácido valpróico) solução oral ou xarope 57,624 mg/ml (equivalente a 50 mg ácido valpróico/ml), fr 100 ml	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Amitriptilina	comprimido 25 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Carbamazepina	comprimido 200 mg suspensão oral 100 mg/5 ml, fr 100 ml	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Carbonato de lítio	comprimido 300 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Clomipramina	comprimido 25 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Fluoxetina	cápsula ou comprimido 20 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Imipramina	comprimido 25 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Nortriptilina	comprimido 25 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Sertralina	cápsula ou comprimido 50 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
19.3. ANSIOLÍTICOS E HIPOSEDATIVOS			
Clonazepam	comprimido 2 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Diazepam	comprimido 5 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.	D
Diazepam	solução injetável 5 mg/ml, amp 2 ml, IM/IV	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
Nitrazepam	comprimido 5 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.	D
<i>Valeriana officinalis</i>	comprimido 40mg		D
19.4. ESTIMULANTE SISTEMA NERVOSO CENTRAL			
Metilfenidato	comprimido 10 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita A (amarela) + receita de neurologista ou psiquiatra.	D
19.5. AUXILIAR DO TRATAMENTO DO ALCOOLISMO			
Naltrexona	comprimido 50 mg	Uso restrito aos pacientes do CAPS. Dispensação nas unidades de referência. Receita branca em duas vias.	AE
19.6. ANTIPARKINSONIANOS			
Biperideno	comprimido 2mg	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Levodopa + benserazida	comprimido dispersível 100 mg +25 mg comprimido liberação lenta 100 mg+25 mg		D
Levodopa + carbidopa	comprimido 250 mg + 25 mg		D
19.7. ANTIPSICÓTICOS			
Haloperidol	comprimido 5mg	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Haloperidol	solução oral – 2mg/ml frasco 20ml	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Haloperidol	solução injetável 5 mg/ml, ampola 1ml		US
Haloperidol, decanoato	solução injetável 50 mg/ml, ampola 1ml	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.	D
Risperidona	comprimido 2mg	Transtorno de conduta infante juvenil.	AE
Risperidona	Solução oral, 1mg/ml, frasco 30ml	Transtorno de conduta infante juvenil.	AE

20. SISTEMA OCULAR

20.1. ANESTÉSICO LOCAL

Tetracaína + fenilefrina	colírio 10 mg + 1 mg/ml, fr 10 ml	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.	US
--------------------------	-----------------------------------	--	----

20.2. CICATRIZANTE

Retinol, acetato + aminoácidos + metionina + cloranfenicol	pomada oftalmológica 10.000 UI + 25 mg + 5 mg + 5 mg/g, bis 3,5 g		US
--	---	--	----

20.3. MIDRIÁTRICOS E CICLOPLÉGICOS

Ciclopentolato	colírio 10 mg/ml, fr 5 ml		US
Tropicamida	colírio 1%, fr 5 ml		US

20.4. AGENTE DIAGNÓSTICO

Fluoresceína	colírio 1%, fr 5 ml		US
--------------	---------------------	--	----

20.5. DESCONGESTIONANTES E ANTIALÉRGICOS

Fenilefrina	colírio 100 mg/ml, fr 5 ml		US
-------------	----------------------------	--	----

20.6. ANTIMICROBIANO

Gentamicina	colírio 5 mg/ml, fr 5 ml	Receita em duas vias.	D
-------------	--------------------------	-----------------------	---

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
21. PELE E MUCOSA			
21.1. CICATRIZANTES, EMOLIENTES E PROTETORES			
Oxido de zinco + Vitamina A + Vitamina D3	pomada, 66mg + 5.000UI + 100UI, bisnaga 45g	Restrito a criança e idoso – 1bisnaga por mês.	D
21.2. ANTOMICROBIANOS			
Neomicina + bacitracina	pomada 5 mg + 250 UI/g, bis 10 g		D
Nistatina	suspensão oral 100.000 UI/ml, fr 50 ml	Receita em duas vias.	D
Metronidazol	geleia vaginal 500 mg/5 g, bis 50 g	Receita em duas vias.	D
Miconazol	creme dermatológico 20 mg/g	Uso restrito para lactentes, crianças e dermatite fúngica da área das fraldas.	D
Miconazol	creme vaginal 2%, bis 80 g + 10 aplicadores, bis 28 g	Uso restrito pela via de aplicação vaginal.	D
21.3. TRATAMENTO DE FERIDAS			
Papaína	gel 3% e 10%, pote 100 g		US
Sulfadiazina de prata	creme 1 %, pote 100 g		US
22. SISTEMA UROGENITAL			
22.1. HIPERPLASIA BENÍGNA DA PRÓSTATA			
22.1.1. ANTAGONISTA ALFA-ADRENÉRGICO			
Doxazosina	comprimido 4 mg		D
23. FITOTERÁPICOS			
<i>Valeriana officinalis</i>	comprimido 40mg		D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
24. HOMEOPÁTICOS			
Medicamentos homeopáticos: até 1000 CH	glóbulos ou gotas	Dispensação nas farmácias contratadas pelo município mediante prescrição de médicos cadastrados no DAF.	D

25. OUTROS PRODUTOS AUXILIARES NÃO TERAPÊUTICOS

25.1. AUTOMONITORAMENTO DE GLICEMIA

Tiras para determinação de glicose	unidade	Uso restrito aos pacientes que utilizam insulina, cadastrados no programa “Doce é a Vida”. Dispensação mediante assinatura do contrato de fornecimento dos insumos.	D
Lancetas + lancetador	unidade		
Seringa	para insulina		
Glicosímetro	unidade		

25.2. OXIGENOTERAPIA

Água para injeção	solução estéril, fr 500 ml	Oxigenoterapia.	D
-------------------	----------------------------	-----------------	---

25.3. DIAGNÓSTICO SAÚDE DA MULHER

Ácido acético	solução 2%, fr 200 ml		US
Shiller	solução 2%, fr 200 ml		US

B - COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1. PROGRAMA DST/AIDS

1.1. ANTIVIRAIS

Aciclovir	comprimido 200 mg	Receita em duas vias.	D
Ganciclovir sódico	pó para solução injetável 546 mg (equivalente a 500 mg ganciclovir), fr amp	Uso restrito para tratamento de infecções causadas por citomegalovirus. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
1.2.ANTIRRETROVIRAIS			
1.2.1.INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA ANÁLOGA DE NUCLEOSÍDEO			
Abacavir	comprimido 300 mg solução oral 20 mg/mL, fr 240 ml	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Etravirina	comprimido 100 mg e 200mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Lamivudina	comprimido 150 mg, solução oral 10 mg/mL, fr 240 ml	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Zidovudina	cápsula retard 100 mg solução oral 10 mg/mL, fr 200 ml solução injetável 10 mg/mL, fr amp 20 ml	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Zidovudina + lamivudina	comprimido 300 mg + 150 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
1.2.2.INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA NÃO-ANÁLOGOS DE NUCLEOSÍDEO			
Efavirenz	comprimido 200 mg comprimido 600 mg solução oral 30 mg/mL, fr 180 ml	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Nevirapina	comprimido 200 mg suspensão oral 10 mg/ml, fr 240 ml	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
1.2.3.INIBIDORES DE PROTEASE			
Atazanavir	cápsula 200 mg e 300 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Darunavir	comprimido 300 mg e 600mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Indinavir	comprimido 400 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Lopinavir + ritonavir	comprimido 100 mg + 25 mg comprimido 200 mg + 50 mg solução oral 80 mg + 20 mg/ ml, fr 160 ml	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Ritonavir	Comprimido revestido	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
1.2.4.INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA ANÁLOGA DE NUCLEOTÍDEO			
Tenofovir	comprimido 300 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Fumarato de tenofovir desoproxila + lamivudina	comprimido 300mg + 300mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Tenofovir disoproxil + fumarato de lamivudina + efavirenz	comprimido 300mg + 300mg + 600mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
1.2.5.INIBIDORES DE INTEGRASE			
Dolutegravir sódico	comprimido revestido 300mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Raltegravir	comprimido 400 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
1.2.6.INIBIDORES DE FUSÃO			
Enfuvirtida	frasco-ampola 90 mg/ml	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
1.3.OUTROS ANTIRRETROVIRAIS			
Maraviroque	comprimido 150 mg	Prescrição em formulário de solicitação de antiretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
1.4.ANTI-INFECCIOSO/ANTI-FÚNGICO E ADJUVANTES			
Fluconazol	comprimido 150 mg	Restrito ao programa DST/AIDS. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Pentamidina	pó para solução injetável 300 mg, fr amp 10 ml	Restrito ao programa DST/AIDS. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
1.5.SISTEMA DIGESTIVO			
1.5.1ANTIDIARRÊICO SINTOMÁTICO			
Loperamida	comprimido 2 mg	Restrito ao programa DST/AIDS. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
2.PROGRAMA TUBERCULOSE			
Clarithromicina	cápsula ou comprimido 500 mg		D
Estreptomicina	pó para injeção 1 g, fr amp		D
Etambutol	comprimido 400 mg		D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
Etionamida	comprimido 250 mg		D
Isoniazida	comprimido 100 mg		D
Isoniazida + rifampicina	comprimido 75 mg + 150 mg		D
Pirazinamida	comprimido 500 mg suspensão oral 30 mg/ml		D
Rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol	comprimido 150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg		D
Rifampicina	comprimido 300 mg solução oral 20 mg/ml		D

3.PROGRAMA HANSENÍASE

3.1.TRATAMENTO

Dapsona	comprimido 100 mg	Uso restrito no tratamento da hanseníase. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	D
Ofloxacino	comprimido 400 mg	Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis. Receita em duas vias.	D
Talidomida	comprimido 100 mg	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C3 (Portaria SVS 344/98). Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis e na Farmácia Municipal. Notificação de receita de talidomida + receita + termo de consentimento.	AE
Tratamento multibacilar – clofazimina + clofazimina + rifampicina + dapsona	comprimido 50 mg + 100 mg + 300 mg + 100 mg	Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	D
Tratamento paucibacilar – dapsona + rifampicina	comprimido 100 mg + 300 mg	Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	D

Medicamento	Forma farmacêutica, apresentação, via administração	Condição	Uso
3.2. COADJUVANTES			
Hipromelose + dextrano	colírio 3 mg + 1 mg/ml, fr 15 ml	Uso restrito no tratamento da hanseníase. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Hidratante com uréia	creme 100mg/g, pote 100 g	Uso restrito no tratamento da hanseníase. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE
Filtro protetor solar	fator proteção 45, fr 100 ml	Uso restrito no tratamento da hanseníase e lúpus. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.	AE

II – CLASSIFICAÇÃO – ORDEM ALFABÉTICA

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Abacavir 20 mg/ml	solução oral, fr 240 ml	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Abacavir, sulfato 300 mg	comprimido	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Acetato de retinol 10.000 ui/g, aminoácidos 25 mg/g, metionina 5 mg/g e cloranfenicol 5 mg/g	pomada - bis 3,5 g	US	
Aciclovir 200 mg	comprimido	D	Receita em duas vias.
Ácido acético 2%	solução tópica, fr 200 ml	US	
Ácido acetilsalicílico 100 mg	comprimido	D	
Ácido fólico 5 mg	comprimido	D	
Ácido folínico 15 mg	comprimido	D	Crianças até um ano manipulação conforme Portaria SMS nº 02 de 26 de janeiro de 2015.
Ácido tricloroacético 80%	solução tópica, fr 20 ml	US	
Ácido Valpróico ou Valproato de Sódio 288 mg (equivalente a 250 mg de ácido valpróico)	cápsula ou comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Ácido Valpróico ou Valproato de Sódio 250 mg/5 ml	xarope, fr 100 ml		
Adenosina 3 mg/ml	solução injetável 3 mg/ml, amp 2 ml, IV	US	
Adrenalina 1 mg/ml (epinefrina)	solução injetável, amp 1 ml, IM/IV/SC	US	
Água Oxigenada 10 vol.	solução, fr 1000 ml	US	
Água para injeção – n.a.	amp 10 ml	US	
Água para injeção – n.a.	fr 500 ml	D	Oxigenoterapia.
Albendazol 400 mg	comprimido mastigável	D	

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Albendazol 40 mg/ml	suspensão oral, fr 10 ml	D	
Álcool etílico 70%	solução, fr 1000 ml	US	Antissepsia das mãos e da pele.
Álcool etílico 70%	gel, fr 500 ml	US	
Alendronato de sódio 70 mg	comprimido	D	
Alopurinol 100 mg e 300 mg	comprimido	D	
Aminofilina 100 mg	comprimido	D	
Aminofilina 24 mg/ml	solução injetável, amp 10 ml, IV		
Amiodarona 200 mg	comprimido	D	
Amiodarona 50 mg/ml	solução injetável, amp 3 ml, IV		
Amitriptilina 25 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Amoxicilina 500 mg	cápsula ou comprimido	D	Receita em duas vias.
Amoxicilina 250 mg/5 ml	suspensão oral, frasco 150 ml e 60 ml	D	Receita em duas vias.
Amoxicilina 500 mg + ácido clavulânico 125 mg	comprimido	D	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio de acordo com legislação municipal vigente. Receita em duas vias.
Amoxicilina 250 mg + ácido clavulânico 62,5 mg	pó para suspensão oral, frasco 75 ml	D	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio de acordo com legislação municipal vigente. Receita em duas vias.
Anlodipino 5 mg	comprimido	D	
Atazanavir 200 mg e 300 mg	cápsula	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Atenolol 25mg e 50mg	comprimido	D	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular, apresentação 25mg.
Atropina 0,50 mg/ml	solução injetável, ampola 1 ml, IM/IV/SC	US	
Azitromicina 500 mg	comprimido	D	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio conforme legislação municipal vigente. Nos casos de IST é necessária a notificação. Prescrição em duas vias.
Beclometasona, dipropionato 50 mcg /dose e 250 mcg/dose	aerossol, frasco 200 doses		Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular. Apresentações 200 e 250 mcg.
Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI e 1.200.000 UI	pó para suspensão injetável frasco ampola, IM	US	Receita em duas vias.
Benzilpenicilina procaína 300.000UI + potássica 100.000 UI	pó para suspensão injetável frasco ampola, IM	US	Receita em duas vias.
Bicarbonato de sódio 1 mEq/ml (8,4%)	solução injetável, frasco 250 ml, IV	US	
Betametasona , acetato 3 mg + betametasona, fosfato dissódico 3 mg/ml	solução injetável, amp 1 ml, IM	D	Uso restrito para gestantes em situação de risco.
Biperideno 2 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Bisacodil 5 mg	comprimido	D	Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.
Brometo de n-butilescopolamina 10 mg	comprimido	D	
Brometo de n-butilescopolamina 20 mg/ml	solução injetável, amp 1 ml, IM/IV/SC	US	
Brometo de n-b-escopolamina 4 mg + dipirona 500 mg	solução injetável, amp 5 ml, IM/IV	US	
Bromoprida 4 mg/ml	gotas orais, fr 20 ml, IM/IV	D	
Bromoprida 10 mg/2 ml	solução injetável, ampola 2 ml	US	

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Cabergolina 0,5 mg	comprimido	AE	Uso restrito para lactantes HIV positivas e outros casos especiais. Receita em duas vias. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Captopril 25 mg	comprimido	D	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.
Carbamazepina 100 mg/5 ml	suspensão oral, frasco 100 ml	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Carbamazepina 200 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Carbonato de cálcio 1250mg (equivalente a 500mg de cálcio ionizável) + Vitamina D 200 UI	comprimido	D	
Carbonato de lítio 300 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Carvão vegetal ativado	pó para uso oral, sachê 10 g	US	
Carvedilol 3,125 mg, 12,5 mg e 25 mg	comprimido	D	Uso restrito em Insuficiência Cardíaca Congestiva. Receita em duas vias.
Cefalexina 500 mg	cápsula ou comprimido	D	Receita em duas vias.
Cefalexina 250 mg/5 ml	suspensão oral, frasco 100 ml	D	Receita em duas vias
Ceftriaxona 1g	pó para solução injetável, frasco ampola, IV	US	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio. Casos de IST: necessária a notificação. Prescrição em duas vias.
Ciclopentolato 10 mg/ml	colírio, fr 5 ml	US	
Cinarizina 75 mg	comprimido	D	
Ciprofloxacino 500 mg	cápsula ou comprimido	D	Receita em duas vias

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Claritromicina 500 mg	cápsula ou comprimido	D	Uso restrito para tratamento de micobactérias atípicas. Uso no tratamento do <i>H. pilory</i> , receita em duas vias.
Clindamicina 300 mg	cápsula	D	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio conforme legislação municipal vigente. Uso em IST é necessária à notificação. Prescrição em duas vias.
Clindamicina 150mg/ml	solução injetável 150mg/ml, amp 4ml, IM/IV	US	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo.
Clomipramina 25 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Clonazepam 2 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.
Clopidogrel 75 mg	comprimido	US	Uso exclusivo na admissão de pacientes com síndrome coronariana aguda.
Cloreto de potássio 6%	xarope, fr 100 ml	D	
Cloreto de potássio 19,1%	solução injetável, amp 10 ml, IV	US	
Cloreto de sódio 20 % (3,4 mEq/ml)	solução injetável, amp 10 ml, IV	US	
Clorpromazina 25 mg, 100 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Codeína 30 mg	comprimido	US	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Crema hidratante - Uréia 100 mg/g	creme, pote 100 g	D	Uso restrito no tratamento da hanseníase. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Dapsona 100 mg	comprimido	D	Uso restrito no tratamento da hanseníase. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Darunavir 300 mg e 600 mg	comprimido	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Deslanosídeo 0,2 mg/ml	solução injetável, amp 2 ml, IM/IV	US	
Dexametasona 0,1%	creme, bis 10 g	D	
Dexametasona 2 mg/ml	solução injetável 2 mg/ml, amp 1 ml, IM/IV	US	
Dexametasona 4 mg/ml	solução injetável 4 mg/ml, amp 2,5 ml, M/IV	US	
Diazepam 5 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.
Diazepam 5 mg/ml	solução injetável, amp 2 ml, IM/IV	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.
Diclofenaco 50 mg	comprimido	D	Uso não recomendado para crianças menores 12 anos.
Diclofenaco 25 mg/ml	solução injetável, ampola 3 ml, IM	US	
Didanosina 10 mg/ml (DDI)	pó para solução oral, frasco 4 g		Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Digoxina 0,25 mg	comprimido	D	
Dimenidrinato 50 mg + piridoxina 50 mg/ml	solução injetável, amp 1 ml, IM	US	
Dinitrato de Isossorbida 5 mg	comprimido sublingual	US	
Dipirona 500 mg/ml	gotas orais, frasco 10 ml	D	

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Dipirona 500 mg/ml	solução injetável 500 mg/ml, ampola 2 ml, IM/IV	US	
DIU (dispositivo intra-uterino)	unidade	US	Procedimento realizado em Unidade de Saúde.
Dolutegravir ódico 50 mg	comprimido	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Domperidona 1 mg/ml	suspensão oral, fr 100 ml	D	Uso pediátrico. Dispensação mediante prescrição por especialistas em gastro e pneumopediatria. Dispensação na Farmácia Municipal.
Dopamina 5 mg/ml	solução injetável, amp 10 ml, IV	US	
Doxazosina 4 mg	comprimido	D	
Doxiciclina 100 mg	comprimido	D	Receita em duas vias.
Efavirenz 200 mg, 600 mg	comprimido	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Efavirenz 30 mg/ml	solução oral, fr 180 ml	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Enfuvirtida 90 mg/ml	frasco ampola	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Enalapril 20mg	comprimido	D	
Enoxaparina 20mg/0,2ml	seringa preenchida 0,2 ml, SC	US	Restrito a protocolos específicos das UPAs.
Enoxaparina 40mg/0,4ml	seringa preenchida 0,4 ml, SC	US	Restrito a protocolos específicos das UPAs.
Eritromicina 250 mg/5 ml	suspensão oral, frasco 60 ml	D	Prescrição em duas vias.
Espironolactona 25 mg, 100 mg	comprimido	D	
Estradiol 1 mg	cartela com 28 comprimidos	D	

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Estreptomicina 1g	pó para injeção, fr amp	AE	
Estriol 1mg/g	creme vaginal, bis 50 g	D	
Etambutol 400 mg	comprimido	D	
Etravirina	comprimido 100 mg e 200 mg		
Etinilestradiol 20 mcg + gestodeno 75 mcg	cartela com 21 comprimidos	D	
Etinilestradiol 30 mcg + levonorgestrel 150 mcg	cartela com 21 comprimidos	D	
Etionamida 250 mg	comprimido	D	Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Etomidato 2 mg/ml	solução injetável 2 mg/ml, amp 10 ml, V	US	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Etravirina 100 mg, 200mg	comprimido	D	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Fenilefrina 100 mg/ml	colírio, fr 5 ml	US	
Fenitoína 50 mg/ml	solução injetável, amp 5 ml, IM/IV	US	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.
Fenitoína 100 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Fenobarbital 100 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Fenobarbital 100 mg/ml	solução injetável, amp 2 ml, IM/IV	US	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Fenobarbital 40 mg/ml	gotas orais, frasco 20 ml	D	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Fenoterol 5 mg/ml	gotas para inalação, fr 20 ml	US	
Fentanila 0,05 mg/ml , citrato	solução injetável, amp 2 ml, IM/IV	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Uso restrito na UPA, SAMU e Complexo Pró Saúde. Receita branca.
Filtro protetor solar Fator 45	loção ou gel, fr 100 ml	D	Uso restrito no tratamento da hanseníase e lúpus. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Fitomenadiona (vit. K1) 10 mg/ml	solução injetável IM, amp 1 ml, IM/SC	US	
Fluconazol 150 mg	comprimido	AE	Restrito ao programa DST/AIDS. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Flumazenil 0,1 mg/ml	solução injetável 0,1 mg/ml, amp 5 ml, IV	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98).
Fluoresceína 10 mg/ml	colírio, fr 3 ml	US	
Fluoxetina 20 mg, cloridrato	cápsula ou comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Furosemida 10 mg/ml	solução injetável, amp 2 ml, IM/IV	US	
Furosemida 40 mg	comprimido	D	
Ganciclovir sódico 546 mg (equivalente a 500 mg ganciclovir)	pó para solução injetável, frasco ampola	AE	Uso restrito para tratamento de infecções causadas por citomegalovírus. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Gentamicina 5 mg/ml	colírio, fr 5 ml	D	Receita em duas vias.
Gliclazida 60 mg	comprimido ação prolongada	D	
Gliconato de cálcio 10 % (0,45 mEq/ml)	solução injetável , amp 10 ml, IV	US	

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Glicose 25% e 50%	solução injetável, amp 10 ml, IV	US	
Glicosímetro	unidade	D	Uso restrito aos pacientes que utilizam insulina, cadastrados no programa “Doce é a Vida”. Dispensação mediante assinatura do contrato de fornecimento dos insumos.
Haloperidol, decanoato 50 mg/ml	solução injetável, ampola 1 ml	D	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Haloperidol 5 mg/ml	solução injetável, ampola 1 ml	US	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita braca em duas vias.
Haloperidol 5 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Haloperidol 2 mg/ml	solução oral, frasco 20 ml	D	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Heparina 5.000 ui/0,25ml	ampola 0,2 ml, SC	D	Uso restrito de acordo com protocolo.
Hidralazina 50mg	comprimido	D	Uso restrito paciente renal crônico
Hidroclorotiazida 25 mg	comprimido	D	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.
Hidrocortisona 100 mg e 500 mg	pó para solução injetável, frasco ampola, IM/IV	US	
Hidróxido de alumínio 60 mg + hidróxido de magnésio 40 mg/ml	suspensão oral , fr 150 ml	D	
Hipoclorito de sódio 2,5%	solução, fr 50 ml	D	
Hipromelose 3 mg + dextrano 1 mg/ml	colírio, fr 15 ml	AE	Uso restrito no tratamento da hanseníase. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Ibuprofeno 50 mg/ml	solução oral, frasco 30 ml	D	

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Imipramina 25 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial – Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Indinavir 400 mg	comprimido		Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Insulina humana NPH 100 UI/ml	suspensão injetável, fr 10 ml	D	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.
Insulina humana regular 100 UI/ml	solução injetável, fr 10 ml	D	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.
Iodopovidona - PVPI 10 % (1 % iodo ativo)	solução aquosa, fr 1000 ml	US	
Iodopovidona - PVPI 10 % (1 % iodo ativo)	degermante, frasco fr 1000 ml	US	
Ipratrópio, brometo 0,25 mg/ml	gotas para inalação, fr 20 ml	US	
Isoniazida 100 mg	comprimido	D	
Isoniazida 75 mg + rifampicina 150 mg	comprimido	D	
Itraconazol 100 mg	cápsula	D	Receita em duas vias.
Ivermectina 6 mg	comprimido	D	
Lamivudina 10 mg/ml	solução oral (3TC), fr 240 ml	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Lamivudina 150 mg + zidovudina 300 mg	comprimido	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Lamivudina 150 mg	comprimido	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Lancetas + lancetador	unidade	D	Uso restrito aos pacientes que utilizam insulina, cadastrados no programa “Doce é a Vida”. Dispensação mediante assinatura do contrato de fornecimento dos insumos.
Levodopa 100 mg + benserazida 25 mg	comprimido dispersível	D	
Levodopa 100 mg + benserazida 25 mg - (HBS) liberação lenta	cápsula retard	D	
Levodopa 250 mg + carbidopa 25 mg	comprimido	D	
Levofloxacino 250 mg e 500 mg	comprimido	D	Uso em pneumonia adquirida na comunidade dispensação mediante prescrição em formulário próprio + receita em duas vias.
Levomepromazina 40 mg/ml	gotas orais, frasco 20 ml	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Levonorgestrel 0,75 mg	cartela com 2 comprimidos	D	Uso restrito para contracepção de emergência.
Levotiroxina 25 mcg, 50mcg, 100 mcg	comprimido	D	
Lidocaína 10%	spray, frasco 50 ml	US	Uso restrito ao Hospital DIA.
Lidocaína 2%	gel, bisnaga 30 g	US/D	Seguir protocolo de cateterismo vesical intermitente.
Lidocaina 2%	solução injetável, tubete 1.8 ml	US	
Lidocaina 2%	solução injetável, frasco 20 ml	US	
Lidocaína 20 mg + epinefrina 0,005 mg/ml	solução injetável, frasco 20 ml	US	
Lidocaína 20 mg + epinefrina 1/100.000/ml	solução injetável, tubete 1,8 ml	US	Uso odontológico.
Loperamida 2 mg	comprimido	AE	Restrito ao programa DST/AIDS. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Lopinavir 80 mg + ritonavir 20 mg/ml	solução oral, fr 160 ml	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Lopinavir 200 mg + ritonavir 50 mg	comprimido	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Lopinavir 100 mg + ritonavir 25 mg	comprimido	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Loratadina 1mg/ml	xarope, fr 100 ml	D	
Loratadina 10 mg	comprimido	D	
Losartana 50mg	comprimido	D	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.
Manitol 20%	solução, fr 250 ml, IV e oral	US/D	Dispensação com solicitação exame médico.
Maraviroque 150 mg	comprimido	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Medicamentos homeopáticos até 1000 CH	glóbulos ou gotas, fr 20 ml	D	Dispensação nas farmácias contratadas pelo município mediante prescrição de médicos cadastrados na DAF.
Medroxiprogesterona 150 mg/ml	injetável, amp 1ml, IM	D	
Medroxiprogesterona 10 mg	comprimido	D	Uso restrito para teste de dosagem de progesterona.
Metformina 500 mg e 850 mg	comprimido	D	Também disponível no Aqui Tem Farmácia Popular.
Metildopa 250 mg	comprimido	D	
Metilfenidato 10 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita A (amarela) + receita de neurologista ou psiquiatra.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Metoclopramida 5 mg/ml	solução injetável, amp 2 ml, IM/IV	US	
Metoclopramida 10 mg	comprimido	D	
Metoprolol 1mg/ml	solução injetável, amp 5 ml, IV	US	
Metronidazol 40 mg/ml	suspensão oral, frasco 80 ml	D	Receita em duas vias.
Metronidazol 250 mg	comprimido	D	Receita em duas vias.
Metronidazol 500 mg/5 g	geléia, bis 50 g (com 10 aplicadores)	D	Receita em duas vias.
Metronidazol 5mg/ml	solução injetável 5mg/ml, fr 100ml, IV	US	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo.
Miconazol 20 mg/g	creme dermatológico, bis 28g	D	Uso restrito para lactentes, crianças e dermatite fúngica da área das fraldas.
Miconazol 2%	creme vaginal, bis 80 g (com 10 aplicadores)	D	Uso restrito pela via de aplicação vaginal.
Midazolam 5mg/ml	solução injetável 5 mg/ml, amp 3 ml, uso IM/IV	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.
Morfina 1 mg/ml	solução injetável 1 mg/ml, amp 2 ml, IM/IV	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.
Morfina 10 mg/ml	solução injetável 10 mg/ml, amp 1 ml, IM/IV	US	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca.
Naltrexona 50 mg	comprimido	D	Uso restrito aos pacientes do CAPS. Dispensação nas unidades de referência.
Neomicina 5 mg + bacitracina 250 UI/g	Pomada, bis 10 g	D	
Nevirapina 10 mg/ml	solução oral, fr 240 ml	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Nevirapina 200 mg	comprimido	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Nistatina 100.000 UI/ml	suspensão oral, fr 50 ml	D	Receita em duas vias.
Nitrazepam 5 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). Notificação de Receita B (azul) + receita.
Nitrofurantoína 100 mg	cápsula	D	Receita em duas vias.
Noretisterona 0,35 mg	cartela com 35 comprimidos	D	
Noretisterona 0,5 mg + estradiol 1 mg	cartela com 28 comprimidos	D	
Noretisterona 50 mg + estradiol 5 mg	solução injetável, seringa preenchida 1 ml, IM	D	
Nortriptilina 25 mg	comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Ofloxacino 400 mg	comprimido	AE	Receita em duas vias.
Omeprazol 20mg	comprimido ou cápsula	D	Uso restrito de acordo com protocolo
Omeprazol 40mg	pó liófilo, fr amp, IV	US	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo.
Oseltamivir 30 mg, 45 mg e 75 mg	comprimido	D	Receita em duas vias.
Oxido de zinco 66 mg + Vitamina A 5.000 UI + Vitamina D3 100 UI	bisnaga 45g	D	Restrito crianças e do idosos – 1 tubo por mês.
Papaína 3% e 10%	gel, pote 100 g	US	
Paracetamol 200 mg/ml	gotas orais, frasco 15 ml	D	
Paracetamol 500 mg	Comprimido	D	
Pentamidina 300 mg/ml	pó para solução injetável, fr amp 10 ml	AE	Restrito ao programa DST/AIDS. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Permanganato de potássio 100 mg	Comprimido	D	
Permetrina 1%	loção, frasco 60 ml	D	

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Permetrina 5%	loção, frasco 60 ml	D	
Pirazinamida 30 mg/ml	suspensão oral, fr 150 ml	US	
Pirazinamida 500 mg	Comprimido	D	
Pirimetamina 25 mg	Comprimido	AE	
Prednisolona 3 mg/ml	solução oral , frasco 100 ml	D	Uso restrito crianças e pessoas com dificuldade de deglutição.
Prednisona 5 mg e 20 mg	Comprimido	D	
Preservativo masculino 52 mm	Unidade	D	
Prilocaína 30 mg + felipressina 0,03 UI/ml	solução injetável, tubete 1,8 ml	US	Uso odontológico.
Progesterona 100mg	Comprimido	D	Uso restrito ao protocolo de atenção pré-natal – obrigatório preenchimento de formulário próprio
Prometazina 25 mg	Comprimido	D	
Prometazina 25 mg/ml	solução injetável 25 mg/ml, amp 2 ml, IM	US	
Propofol 10mg/ml	Ampola 20ml	US	Uso exclusivo – Serviço de Diagnóstico - Complexo Pró Saúde
Propranolol 40mg	Comprimido	D	Também disponível no Programa Farmácia Popular
Raltegravir 400 mg	comprimido	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Ranitidina 150 mg/10 ml	solução oral, fr 120 ml	D	Uso pediátrico. Dispensação mediante prescrição por especialistas em gastro e pneumopediatria. Dispensação na Farmácia Municipal.
Ranitidina 25 mg/ml	solução injetável, amp 2 ml, IM/IV	US	
Rifampicina 20 mg/ml	suspensão oral, frasco 50 ml	D	
Rifampicina 300 mg	comprimido	D	Receita em duas vias.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Rifampicina 150 mg + isoniazida 75 mg + pirazinamida 400 mg + etambutol 275 mg	comprimido	D	
Risperidona 2 mg	comprimido	AE	Transtorno de conduta infanto juvenil
Risperidona 1mg/ml, solução oral	frasco 30ml	AE	Transtorno de conduta infanto juvenil
Ritonavir 100 mg	comprimido revestido	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Sais para reidratação oral - cloreto sódio 3,5g, glicose 20g citrato de sódio 2,9g cloreto de potássio 1,5g.	pó para preparo de solução oral, envelope 27.9 g	D	
Salbutamol 100 mcg/dose	Aerossol, frasco 50 doses	D	Também disponível no Programa Farmácia Popular
Seringa para insulina	unidade	D	Uso restrito aos pacientes que utilizam insulina, cadastrados no programa “Doce é a Vida”. Dispensação mediante assinatura do contrato de fornecimento dos insumos.
Sertralina 50 mg	cápsula ou comprimido	D	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Simeticona 75 mg/ml (dimeticona)	gotas orais, fr 10 ml	D	Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.
Shiller a 2%	solução, fr 200 ml	US	
Sinvastatina 20 mg e 40 mg	comprimido	D	
Solução fisiológica nasal (cloreto de sódio 0,9% + cloreto benzalcônio 0,01%)	fr 30 ml	D	
Solução fosfatada para enema	fr 130 ml	D	Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.
Solução para clister com glicerina 12%	fr 500 ml	US	

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Solução ringer + lactato - cloreto 109 mEq, sódio 130 mEq, potássio 4 mEq, cálcio 2,7 mEq, lactato 27,7 mEq/L	solução injetável, fr 500 ml, IV	US	
Soro Fisiológico – cloreto de sódio 0,9%	solução injetável, fr 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1.000 ml, IV	US	
Soro Glicosado – glicose 5%	solução injetável, fr 250 ml e 500 ml, IV	US	
Sulfadiazina 500 mg	comprimido	D	Receita em duas vias.
Sulfadiazina de prata 1%	creme, pote 100 g	US	
Sulfametoxazol + trimetoprima 40 mg/5 ml	suspensão oral, fr 100 ml	D	
Sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg	comprimido	D	Receita em duas vias.
Sulfato de magnésio 10%	solução injetável, amp 10 ml, IV	US	Também é indicado para casos de pré-eclampsia e eclampsia.
Sulfato ferroso 25 mg ferro elementar	gotas orais, fr 30 ml	D	
Sulfato ferroso 40 mg	comprimido	D	
Suxametônio 500 mg (succinilcolina)	pó para solução injetável, frasco ampola, IM/IV/SC	US	
Talidomida 100 mg	comprimido	AE	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C3 (Portaria SVS 344/98). Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis. Notificação de receita de talidomida + receita em duas vias + termo consentimento.
Tenoxicam 20mg	solução injetável 10 mg/ml, amp 2 ml, IM/IV	US	Uso restrito nas UPAs de acordo com protocolo.
Tenofovir 300 mg	comprimido	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Tenofovir disoproxil, fumarato 300 mg + lamivudina 300 mg + efavirenz 600 mg	comprimido	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Tenofovir desoproxila, fumarato 300 mg + Lamivudina 300 mg	comprimido	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Terbutalino 0,5 mg/ml	solução injetável, amp 1 ml, IV (infusão)/SC	US	
Tetracaína 10 mg + fenilefrina 1 mg/ml	colírio, fr 10 ml	US	Medicamento sujeito a controle especial - Lista C1 (Portaria SVS 344/98). Receita branca em duas vias.
Tiamina 100 mg	solução injetável (100 mg/ml), amp 1 ml, IM/IV	US	Situações de emergência em alcoolistas crônicos.
Tiamina 300 mg	comprimido	D	Prevenção e tratamento da deficiência da tiamina.
Tinidazol 500 mg	comprimido	D	
Tiras para determinação de glicose	unidade	D	Uso restrito aos pacientes que utilizam insulina, cadastrados no programa “Doce é a Vida”. Dispensação mediante assinatura do contrato de fornecimento dos insumos.
Tratamento multibacilar adulto – clofazimina 50 mg + clofazimina 100 mg + rifampicina 300 mg + dapsona 100 mg	comprimido	AE	
Tratamento paucibacilar adulto - dapsona 100 mg + rifampicina 300 mg	comprimido	AE	
Tropicamida 1%	colírio	US	
Valeriana officinalis 40mg	Comprimido	D	

Medicamento	Apresentação	Uso	Condição
Vancomicina 500 mg	pó para solução injetável, IV (infusão)	US	Uso para continuação de tratamento de osteomielite. Dispensação mediante prescrição em formulário próprio conforme legislação municipal vigente. Receita em duas vias.
Varfarina sódica 5 mg	comprimido	D	
Vaselina Sólida	pasta, pote 500 g	US	Programa de Saúde do Homem.
Vaselina líquida	líquido, fr 1.000 ml	US	
Vitamina C (ácido ascórbico) 500 mg	comprimido	D	Pacientes em hemodiálise.
Vitaminas do complexo B (tiamina (B1) + riboflavina (B2) + pantotenato (B5) + piridoxina (B6))	drágeas	D	Pacientes em hemodiálise e em tratamento da tuberculose.
Zidovudina 10 mg/ml	solução oral, fr 200 ml e solução injetável	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Zidovudina 100 mg	cápsula retard	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.
Zidovudina 300 mg + lamivudina 150 mg	comprimido	AE	Prescrição médica em formulário de solicitações de antirretrovirais. Dispensação no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.

III – MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

1. ATENÇÃO BÁSICA

1.1 CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA

Descrição	Apresentação	Quantidade
Ácido acetilsalicílico 100mg	Comprimido	1 cartela
Epinefrina (adrenalina) 1 mg - sol.inj.	Ampola 1 ml	30
Água para injeção	Ampola 10ml	5
Aminofilina 24 mg/ml - sol.inj.	Ampola 10ml	2
Amiodarona 50 mg/ml - sol.inj.	Ampola 3ml	4
Atropina 0,25 mg - sol.inj.	Ampola 1 ml	8
Diazepam 5 mg/ml - sol.inj.	Ampola 2ml	3
Fenitoína 50 mg/ml - sol.inj.	Ampola 5ml	4
Furosemida 10 mg/ml - sol.inj.	Ampola 2ml	2
Glicose 50% - sol.inj	Ampola 10ml	6
Haloperidol 5 mg/ml - sol. inj.	Ampola 1 ml	2
Hidrocortisona 500 mg - inj.	Frasco ampola	2
Isossorbida 5mg	Cp sublingual	1 cartela
Lidocaina 2% (100mg/5g) - gel	Bisnaga 30g	1
Lidocaína 2% - sol. inj.	Frasco ampola	1
Midazolam 5 mg/ml - sol. Inj.	Ampola 3ml	2
Morfina 10 mg/ml	Ampola 1 ml	2
Terbutalino 0,5 mg/ml - sol.inj.	Ampola 1 ml	2

1.2 MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Acetato de retinol 10.000 ui/g, aminoácidos 25 mg/g, metionina 5mg/g e cloranfenicol 5mg/g	Bisnaga 3,5g	
Epinefrina (adrenalina) 1 mg - sol.inj.	Ampola 1 ml	Carrinho de emergência
Ácido acetilsalicílico 100 mg	Comprimido	
Água para injeção	Frasco 500ml	

Descrição	Apresentação	Quantidade
Água para injeção	Ampola 10ml	
Água oxigenada 10vol. (3% de peróxido de hidrogênio)	Frasco 1L	
Alcool etílico 70% inpm - correspondente a 77° gl - indicação: uso institucional	Frasco 1L	
Alcool etílico 70% inpm, forma farmacêutica gel - correspondente a 77° gl - indicação : uso institucional - apresentação em gel	Frasco 500ml	
Aminofilina 24 mg/ml - sol.inj.	Ampola 10ml	
Amiodarona 50 mg/ml - sol.inj.	Ampola 3ml	
Atropina 0,25 mg - sol.inj.	Ampola 1ml	
Bicarbonato de sódio 8,4%	Frasco 250 ml	
Bromoprida 10mg/2ml	Ampola 2 ml	
Brometo de Escopolamina 20 mg - sol.inj.	Ampola 1 ml	
Captopril 25 mg	Comprimido	
Colagenase 0,6 ui + clorafenicol 0,01 g/g - pomada	Bisnaga 30g	
Dexametasona 2mg/ml - sol. inj.	Ampola 1ml	
Dexametasona 4mg/ml – sol. inj	Ampola 2,5ml	
Diazepam 5mg/ml	Ampola 2ml	
Diclofenaco 25mg/ml – sol.inj..	Ampola 3 ml	
Dimenidrinato 50 mg + piridoxina 50 mg - sol.inj.	Ampola 1 ml	
Dipirona 500 mg/ml – sol.inj.	Ampola 2 ml	
Dipirona 500 mg/ml - gotas orais	Frasco	
Fenitoina 50mg/ml – sol. inj.	Ampola 5ml	
Fenoterol 5 mg/ml	Frasco 20 ml	
Furosemida 10 mg/ml - sol.inj.	Ampola 2ml	
Glicose 25% e 50 % - sol.inj.	Ampola 10ml	
Haloperidol 5mg/ml – sol, inj.	Ampola 1ml	Carrinho de emergência

Descrição	Apresentação	Quantidade
Hidrocortisona 100 mg - sol. inj.	Frasco ampola	
Hidrocortisona 500 mg - inj.	Frasco ampola	
Insulina NPH	frasco	Multidose
Insulina regular	frasco	Multidose
Ipratropio 0,25 mg/ml – gotas para inalação	Frasco 20 ml	Multidose
Isossorbida 5mg - sublingual	Comprimido	
Lidocaína 2% s/v	Fr amp 20 ml	Multidose
Lidocaína 2% gel	Bisnaga 30 g	Multidose
Metildopa 250mg	Comprimido	
Metoclopramida 5 mg/ml - sol.inj.	Ampola 2ml	
Midazolam 5mg/ml – sol. inj.	Ampola 3ml	Carrinho de emergência
Morfina 10mg/ml – sol. inj.	Ampola 1ml	Carrinho de emergência
Oleo rosa mosqueta 10% e/ou ésteres dos ácidos graxos + vitamina a mín. 2% + vitamina e mín. 2% + oleo de girassol - qsp.	Frasco 200ml	Multidose
Papaína gel 3%; 10%	Pote 100g	Multidose
Paracetamol 200mg/ml	frasco	Multidose
Prometazina 25 mg/ml - sol.inj.	Ampola 2ml	Carrinho de emergência
PVPI degermante (10g/100ml)	Frasco 1L	Multidose
PVPI solução aquosa (10g/100ml)	Frasco 1L	Multidose
PVPI tintura (10g/100ml)	Frasco 1L	Multidose
Ranitidina 25mg/ml	Ampola 2ml	
Solucao para clister com glicerina 12%	Frasco 500ml	
Solução ringer com lactato	Frasco 500ml	
Soro fisiológico 0,9% - sol.inj.	Frasco 1L	Multidose
Soro fisiológico 0,9% - sol.inj.	Frasco 250ml	Multidose

Descrição	Apresentação	Quantidade
Soro fisiológico 0,9% - sol.inj.	Frasco 500ml	
Soro fisiológico 0,9% sol. Inj.	Frasco 100ml	
Soro glicosado 5% - sol.inj.	Frasco 250ml	
Soro glicosado 5% - sol.inj.	Frasco 500ml	
Sulfadiazina de prata 1%	Pote 100 gramas	
Terbutalina 0,5mg/ml	Ampola 1ml	Carrinho de emergência
Tetracaina 10mg + fenilefrina 1mg/ml - colírio	Frasco 10ml	
Vaselina líquida – grau farmacêutico	Frasco 1L	
1.2.1 KIT PARA GLICEMIA		
Aparelho para doseamento de glicose	Unidade	1
Lancetas	Unidade	01 caixa
Tiras para determinação de glicose	Unidade	01 caixa

2. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

2.1 CARRINHO DE EMERGÊNCIA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

Descrição	Apresentação	Quantidade
Adenosina 3 mg/ml, sol. Injet.	Ampola 2ml	5
Epinefrina (adrenalina) 1 mg - sol.inj.	Ampola 1 ml	30
Água para injeção	Ampola 10ml	5
Amiodarona 50 mg/ml - sol.inj.	Ampola 3ml	6
Atropina 0,50 mg - sol.inj.	Ampola 1 ml	30
Clopidogrel 75 mg	Comprimido	8
Deslanosideo 0,2 mg/ml	Ampola 2ml	5
Diazepam 5 mg/ml - sol.inj.	Ampola 2ml	3
Dopamina 5 mg/ml, cloridrato	Ampola 10ml	10
Etomidato 2 mg/ml	Ampola 10ml	5
Fenitoina 50 mg/ml - sol.inj.	Ampola 5ml	6
Fentanila 0,05 mg/ml, citrato	Ampola 2ml	5
Fenobarbital 100 mg/ml - sol inj.	Ampola 2ml	3
Flumazenil 0,5mg/5ml - sol.inj	Ampola 5ml	2
Furosemida 10mg/ml – sol. Inj.	Ampola 2ml	5
Gliconato de cálcio 10%	Ampola 10ml	5
Glicose 50% - sol. Inj.	Ampola 10ml	10
Haloperidol 5 mg/ml - sol. Inj.	Ampola 1 ml	5
Hidrocortisona 500mg – inj,	Frasco ampola	3
Lidocaina 2% (20mg/ml) – sol. Inj. - sem vasoconstritor	Frasco ampola 20ml	1
Lidocaína 2% (100mg/5g) – gel	Bisnaga 30g	1
Metoprolol 1 mg/ml sol. Injetável	Ampola 5ml	10
Midazolam 5 mg/ml - sol. Inj.	Ampola 3ml	10
Morfina 10mg/ml – sol. Inj.	Ampola 1ml	5

Descrição	Apresentação	Quantidade
Succinilcolina (suxametônio), cloreto 100 mg	Frasco ampola 5ml	5
Sulfato de magnésio 10% sol. Injet.	Ampola 10ml	5
2.2 SALA DE EMERGÊNCIA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA		
Ácido acetilsalicílico 100 mg	Comprimido	1 cartela
Água para injeção - solução injetável	Ampola 10 ml	30
Água para injeção - solução injetável	Frasco 500 ml	5
Aminofilina 24 mg/ml - solução injetável	Ampola 10 ml	10
Bicarbonato de sódio 1 meq/ml (8,4%)	Solução injetável frasco 250 ml	2
Bromoprida 10 mg/2 ml	Ampola 2 ml	10
Brometo de n-butilscopolamina 20 mg/ml - solução injetável	Ampola 1ml	20
Captopril 25 mg	Comprimido	1 cartela
Carvão vegetal ativado	Pó para uso oral, envelope 10 g	10
Cloreto de potássio 19,1%	Solução injetável, ampola 10 ml	5
Cloreto de sódio 20 % (3,4 meq/ml)	Solução injetável, ampola 10 ml	5
Dexametasona 2 mg/ml	Solução injetável, frasco ampola	10
Dexametasona 4 mg/ml - solução injetável	Ampola 2,5ml	10
Diclofenaco 25 mg/ml – solução injetável	Ampola 3 ml	30
Dimenidrinato 50 mg + piridoxina 50 mg - solução injetável	Ampola 1 ml	10
Dipirona 500 mg/ml – solução injetável	Ampola 2 ml	30
Fenoterol 5 mg/ml – gotas para inalação	Frasco 20 ml	1
Fitomenadiona 10 mg/ml - solução injetável IM	Ampola 1ml	2
Furosemida 10 mg/ml - solução injetável	Ampola 2 ml	20
Gliconato de cálcio 10%- solução injetável	Ampola 10 ml	5

Descrição	Apresentação	Quantidade
Glicose 25% - solução injetável	Ampola 10ml	10
Glicose 50% - solução injetável	Ampola 10ml	30
Hidrocortisona 100 mg - pó para injeção	Frasco ampola	10
Hidrocortisona 500 mg – pó para injeção	Frasco ampola	10
Ipratrópio, brometo 0,25 mg/ml - gotas para inalação	Frasco 20 ml	1
Isossorbida 5 mg	Comprimido sublingual	1 cartela
Lidocaína injetável 2 % - solução injetável	Frasco ampola 20 ml	1
Lidocaína injetável 2 % - gel	Bisnaga 30 g	1
Manitol 20% - solução	Frasco 250 ml	4
Metildopa 250 mg	Comprimido	1 cartela
Metoclopramida 5 mg/ml - solução injetável	Ampola 2 ml	10
Prometazina 25 mg/ml - solução injetável	Ampola 2 ml	20
Ranitidina 25 mg/ml - solução injetável	Ampola 2 ml	10
Solução ringer com lactato	Frasco 500 ml	12
Soro fisiológico 0,9% - solução injetável	Frasco 1l	10
Soro fisiológico 0,9% - solução injetável	Frasco 250 ml	20
Soro fisiológico 0,9% - solução injetável	Frasco 500 ml	20
Soro fisiológico 0,9% - solução injetável	Frasco 100 ml	20
Soro glicosado 5% - solução injetável	Frasco 250 ml	5
Soro glicosado 5% - solução injetável	Frasco 500 ml	5
Sulfadiazina de prata 1%	Pote 100 g	1
Sulfato de magnésio 10% - solução injetável	Ampola 10 ml	5
Terbutalino 05 mg/ml - solução injetável	Ampola 1 ml	5

Descrição	Apresentação	Quantidade
2.2.1 KIT PARA GLICEMIA		
Aparelho para doseamento de glicose	Unidade	1
Lancetas	Unidade	01 caixa
Tiras para determinação de glicose	Unidade	01 caixa

IV – USO DE ANTIMICROBIANOS EM INFECÇÕES EM ADULTOS

1. TRATAMENTO DAS INFECÇÕES REPIRATÓRIAS ALTAS	
1.1. SINUSITE^{1,2,3,4}	
Uso de Antimicrobiano somente com persistência dos sintomas por mais de 7 dias ou dor facial/dentária ou febre alta com secreção nasal purulenta.	
1ª Escolha	Amoxicilina + Ácido Clavulânico (500/125 mg) 1 comprimido de 8/8 horas por 10 a 14 dias (prescrição em formulário próprio)
2ª Escolha	Levofloxacino 500 mg 1 vez ao dia por 5 a 7 dias (prescrição em formulário próprio)
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Doxiciclina 100 mg 1 comprimido de 12/12 horas por 10 dias
1.2. FARINGITE E AMIGDALITE PURULENTAS^{3,5,6}	
1ª Escolha	Amoxicilina 500 mg 1cp de 8/8 horas por 10 dias
2ª Escolha	Amoxicilina + Ácido Clavulânico (500/125 mg) 1 cp de 8/8 horas por 10 dias (prescrição em formulário próprio)
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Azitromicina 500 mg por 5 dias (prescrição em formulário próprio)
1.3. RINITE¹⁹	
Não se recomenda o uso de Antimicrobiano sistêmico em adultos como tratamento sintomático, evitando-se seu uso indiscriminado e aumento da resistência bacteriana.	
1.4. OTITE MÉDIA AGUDA^{1,3,7}	
1ª Escolha	Amoxicilina 500 mg 1cp de 8/8 horas por 7 a 10 dias
2ª Escolha	Amoxicilina + Ácido Clavulânico (500/125 mg) 1 cp de 8/8 horas, por 10 dias (prescrição em formulário próprio)
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Azitromicina 500 mg por 5 dias (prescrição em formulário próprio)
1.5. BRONQUITE AGUDA¹	
Não se recomenda o uso de Antimicrobiano.	

1.6. COQUELUCHE^{3,8,9,10}	
Adulto	Azitromicina 500 mg 1 ao dia por 5 dias (prescrição em formulário próprio)
Criança > 1 mês	Eritromicina 40 mg/kg/dia de 6/6 horas por 14 dias
2ª escolha	Claritromicina 500mg de 12/12 horas por 7 dias
Se intolerância a macrolídeo	Sulfametoxazol + trimetoprima 400/80mg 2cp de 12/12 horas 7 dias
1.7. PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE^{3,11,12,13}	
Considerar associação com Oseltamivir 75 mg 12/12 horas por 5 dias durante epidemia de influenza (idealmente iniciar em até 48 horas do início dos sintomas). Se persistência dos sintomas, usar à critério médico.	
1.7.1. PACIENTES PREVIAMENTE SADIOS, TRATAMENTO EM DOMICÍLIO, SEM USO DE ANTIBIÓTICOS NOS ÚLTIMOS 3 MESES:^{11,12,13}	
1ª Escolha	Azitromicina 500 mg 1cp ao dia por 5 dias (prescrição em formulário próprio)
2ª Escolha	Amoxicilina + Ácido Clavulânico 500/125 mg 1cp de 8/8 horas por 7 a 10 dias (prescrição em formulário próprio)
1.7.2. PACIENTES COM DOENÇAS ASSOCIADAS OU USO DE ANTIBIÓTICOS NOS ÚLTIMOS 3 MESES:^{11,12}	
Doenças Associadas: DM, ICC, IMUNODEPRIMIDO, HEPATOPATIA, INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, DPOC, ASMA e ALCOOLISMO	
1ª Escolha	Levofloxacino 750 mg, 1cp ao dia por 5 dias (prescrição em formulário próprio)
1.7.3. PACIENTES LEITO DE OBSERVAÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO²⁴	
CRB 65: 0 A 1	Amoxicilina + Ácido Clavulânico 500/125 mg 1cp de 8/8 horas por 7 a 10 dias (prescrição em formulário próprio) OU Azitromicina 500mg 1cp ao dia 5 dias (prescrição em formulário próprio)

	OU Levofloxacin 750mg 1cp ao dia 5 dias (prescriç�o em formul�rio pr�prio) OU Ceftriaxon 2 g EV por dia, 2 doses e ap�s 6 doses (prescriç�o em formul�rio pr�prio. Obrigat�rio apresentar resumo de alta da UPA)
CRB 65: 2	Ceftriaxon 2 g EV – por dia, encaminhar para acompanhamento na Atenç�o B�sica – unidade de refer�ncia (prescriç�o em formul�rio pr�prio. Obrigat�rio apresentar resumo de alta da UPA)
1.7.4. PACIENTES GRAVES ENCAMINHADOS PARA INTERNAÇ�O HOSPITALAR²⁴	
CRB 65: 3 A 4	Ceftriaxon 2 g EV – 1� dose na Unidade de Sa�de (prescriç�o em formul�rio pr�prio)

2. TRATAMENTO DAS INFEC  ES URIN RIAS

2.1. CISTITE AGUDA EM MULHERES GR VIDAS^{3,15,16}

Solicitar Urocultura e iniciar tratamento emp rico. N o usar nitrofuranto na no  ltimo trimestre da gesta  o.

Cefalexina 500 mg 1cp de 6/6 horas 5 a 7 dias
OU
Amoxicilina +  cido Clavul nico (500/125 mg) 1cp de 8/8 horas por at  10 dias (prescriç o em formul rio pr prio)
OU
Nitrofuranto na 100 mg 6/6 horas por 3 A 7 dias

2.2. CISTITE AGUDA N O COMPLICADA EM ADULTO^{3,14,16}

Nitrofuranto na 100 mg 12/12 horas por 5 dias
OU
Sulfametoxazol/Trimetoprim (400/80 mg) 2 cpr 12/12 horas por 3 dias
OU
Ciprofloxacina 500 mg de 12/12 horas por 3 dias

2.3. UROCULTURA³

Ceftriaxona 1 a 2 g IV (prescrição em formulário próprio e resultado do antibiograma)

2.4. CISTITE COMPLICADA – PACIENTES EM LEITO DE OBSERVAÇÃO NA UPA²⁵

*** cistite complicada: Toda infecção urinária alta ou baixa associada a doença de base, aumentando o risco de falha terapêutica inclui os seguintes: Diabetes insulina dependente, Gravidez, Mais de 7 dias de sintomas antes do atendimento, ITU adquirida no hospital, Falência Renal, Obstrução do trato urinário, Presença de SVD, stent e tubo de nefrostomia, Instrumentação urinária recente, Anormalidade friccional ou automática do trato urinário. Antecedentes ou ITU na infância, Transplante renal, Imunossupressão – Neoplasia em atividade.²⁴

Ceftriaxona 1g IV por dia 5 dias (obrigatório apresentar resumo de alta da UPA)

2.5. PIELONEFRITE AGUDA^{3,14,16}

Gestante: hospitalizar.²⁶ Se em leito de observação na UPA, realizar primeira dose de ceftriaxona antes da internação.²⁵

Adulto: solicitar urocultura e iniciar tratamento empírico. Após resultado, rever terapia.¹⁶

Ciprofloxacino 500mg 12/12 horas por 7 dias

OU

Sulfametoxazol/Trimetoprim (400/80 mg) 2 cp 12/12 horas por 14 dias

OU

Amoxicilina + Ácido Clavulânico (500/125 mg) 1cp de 8/8 horas por até 14 dias

2.6. UROCULTURA³

Ceftriaxona 1 a 2 g IV (prescrição em formulário próprio e resultado do antibiograma)

2.7. PIELONEFRITE AGUDA - PACIENTES EM LEITO DE OBSERVAÇÃO UPA²⁵

Ciprofloxacino 500mg 12/12 horas por 7 a 14 dias
OU
Ceftriaxona 2g IV por 14 dias (prescrição em formulário próprio)

3. TRATAMENTO DAS INFECÇÕES DE PELE

3.1. IMPETIGO^{17,20,22}

1ª Escolha	Cefalexina 500 mg VO 6/6 horas por 7 dias
2ª Escolha ou Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Doxiciclina 100mg , 2 vezes dia, 7 dias OU Clindamicina 300 mg, por via oral, a cada 6 horas 7 dias.

3.2. ERISPELA LEVE PRECOCE^{3,21,23}

1ª Escolha	Amoxicilina 500mg 1cp de 8/8 horas por 10 dias OU Cefalexina 500 mg VO 6/6 horas por 10 dias OU Penicilina Procaína 400.000 UI IM 12/12 horas por 10 dias
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Clindamicina 300 mg 1 cp 4 vezes ao dia a 600 mg VO de 8/8 horas por 7 dias. Max 1800 mg. (prescrição em formulário próprio)

3.3. ERISPELA EXTENSA

Hospitalizar ou observação na UPA

3.4. CELULITE LEVE^{3,18,21,23}

1ª Escolha	Amoxicilina 500mg 1cp de 8/8 horas por 10 dias
	OU
	Cefalexina 500 mg VO 6/6 horas por 10 dias
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	OU
	Penicilina Procaína 400.000 UI IM 12/12 horas por 10 dias
	Clindamicina 300 a 600 mg VO de 8/8 horas por 7 dias

3.5. CELULITE EXTENSA E GRAVE

Hospitalizar ou UPA

3.6. PROFILAXIA DE MORDEDURA DE CÃO OU GATO OU ANIMAIS^{3,8}

Amoxicilina + Ácido Clavulânico 1cp 500/125mg de 8/8 horas, de 3 a 5 dias

3.7. INFECÇÃO PÓS MORDEDURA DE CÃO OU GATO OU ANIMAIS (MORDEDURAS MÚLTIPLAS E EXTENSAS)³

Hospitalizar ou observação na UPA.

Ciprofloxacina 500mg VO de 12/12 horas até melhorar a lesão + Clindamicina 600mg IV de 8/8 h

REFERÊNCIAS:

1. LEVIN, A.S.S. (org.). Guia de utilização de anti-infecciosos e recomendações para a prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. São Paulo: Hospital das Clínicas, 2011. 5ª edição. Disponível em: <http://www.sbp.com.br/pdfs/anti-infecciosos_infec_hospitalar.pdf> Acesso em 18 maio 2017
2. CHOW, A. W. et al. IDSA Clinical practice guideline for acute bacterial rhinosinusitis in children and adults. Clinical Infectious Diseases 2012. Dept. of Medicine. University of British Columbia & Vancouver Hospital. Disponível em: <<http://guideline.guidelinecentral.com/i/71828-rhinosinusitis>> Acesso em 12 junho 2017.
3. GILBERT, D. N. et al. (org.). The Sanford Guide, To Antimicrobial Therapy, 47 ed. 2017.
4. Zara M Patel, MD Peter H Hwang, MD. Uncomplicated acute sinusitis and rhinosinusitis in adults: Treatment. UpToDate. 2017. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/uncomplicated-acute-sinusitis-and-rhinosinusitis-in-adults-treatment?source=search_result&search=sinusitis&selectedTitle=1~150#references> Acesso em: 21/08/2017.
5. SHULMAN, S. T. et al. Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis: 2012 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases 2012. Disponível em: <<http://guideline.guidelinecentral.com/i/100171-streptococcal-pharyngitis>> Acesso: agosto 2017
6. DynaMed [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 115782, Streptococcal pharyngitis; [updated 2016 Jul 20, cited place cited date here]; [about 18 screens]. Disponível em: < <http://web.b.ebscohost.com/dynamed/detail?sid=6239fa55-3dea-43d9-beaa-143ce2ffd685%40sessionmgr104&vid=6&bdata=Jmxhbm9cHQYnImc2l0ZT1keW5hbWVhWVxpdmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=dme&AN=115782&anchor=References>> Acesso: agosto 2017
7. LIMB, C.J.; LUSTIG, L. R.; KLEIN, J.O. Acute otitis media in adults. UpToDate. 2017. Disponível em:< https://www.uptodate.com/contents/acute-otitis-media-in-adults?source=search_result&search=Acute%20otitis%20media&selectedTitle=2~150#H17> Acesso em: 21/08/2017.
8. TAVARES, W. Antibióticos e quimioterápicos para o clínico/Walter Tavares. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Atheneu, 2014.
9. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009.Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf> Acesso em: julho 2017.
10. DIVE/SUV/SES. Nota técnica Nº 007/2014 Revisão das recomendações disponíveis no Guia de Vigilância epidemiológica (7ª edição/2009) quanto às definições de caso suspeito, confirmado, tratamento e profilaxia da coqueluche para o país. 12 de junho de 2014. Disponível em: <http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/imunizacao/notas-tecnicas/Nota_Tecnica_007_Coqueluche_2014.pdf> Acesso em: julho 2017.

11. FILE, T. M. Jr, .Treatment of community-acquired pneumonia in adults in the outpatient setting. UpToDate. 2017. Disponível em:< https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-community-acquired-pneumonia-in-adults-in-the-outpatient-setting?source=search_result&search=Community-acquired%20pneumonia&selectedTitle=3~150> Acesso em: 21/08/2017.
12. MANDELL, A. L. et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society Consensus Guidelines on the Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults. Clinical Infectious Diseases 2007. Disponível em: <<http://eguideline.guidelinecentral.com/i/53989-community-acquired-pneumonia>> Acesso: agosto 2017
13. DynaMed [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 115170, Community-acquired pneumonia in adults; [2017 Jul 31]; [about 34 screens]. Disponível em: < <http://web.a.ebscohost.com/dynamed/detail?vid=2&sid=0b7a9672-a472-42fe-9031-ebb03abbb10d%40sessionmgr4008&bdata=Jmxhbm9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVhLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=115170&db=dme>> Acesso: agosto 2017.
14. DynaMed [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 116894, Uncomplicated urinary tract infection (UTI) (pyelonephritis and cystitis); [updated 2017 Mar 15]; [about 23 screens]. Disponível em:< <http://web.a.ebscohost.com/dynamed/detail?sid=0b7a9672-a472-42fe-9031-ebb03abbb10d%40sessionmgr4008&vid=4&bdata=Jmxhbm9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVhLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#d=b=dme&AN=116894>> Acesso: agosto 2017.
15. DynaMed [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 904750, Urinary tract infection (UTI) in pregnancy; [updated 2016 Jul 08]; [about 14 screens]. Disponível em: < <http://web.a.ebscohost.com/dynamed/detail?sid=0b7a9672-a472-42fe-9031-ebb03abbb10d%40sessionmgr4008&vid=5&bdata=Jmxhbm9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVhLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=904750&db=dme>> Acesso: agosto 2017.
16. GUPTA, K. et al. International Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Acute Uncomplicated Cystitis and Pyelonephritis in Women: A 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases. Clinical Infectious Diseases 2011. Disponível em: <<http://eguideline.guidelinecentral.com/i/58207-uncomplicated-uti>> Acesso: agosto 2017
17. STEVENS D.L. et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases 2014. Disponível em: <<http://eguideline.guidelinecentral.com/i/442091-skin-and-soft-tissue-infections>> Acesso: agosto 2017.
18. LIU C. et al. Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America for the Treatment of MethicillinResistant Staphylococcus aureus Infections in Adults and Children. Clinical Infectious Diseases 2011. Disponível em: < <http://eguideline.guidelinecentral.com/i/53996-mrsa> > Acesso: agosto 2017
19. Anselmo-Lima, W T; Sakano, E. SBO Rinossinusites: evidências e experiências. J Otorhinolaryngol, São Paulo, 2015. Disponível em: <<http://www.aborlccf.org.br/imageBank/CONSENSO-RINOSSINUSITES-EVIDENCIAS-E-EXPERIENCIAS.PDF>> Acesso: agosto 2017.
20. DynaMed [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 115810, Impetigo; [updated 2016 Jun 15]; [about 9 screens]. Disponível em: <http://web.b.ebscohost.com/dynamed/detail?sid=44408b2e-21cf-4391-9bb4->

- 91b93395161e%40sessionmgr102&vid=4&bdata=Jmxhbmc9cHQYnImc2l0ZT1keW5hbWVhWVpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=115810&db=dme. Acesso agosto 2017.
21. DynaMed [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 900862, Treatment of MRSA skin and soft tissue infections; [updated 2015 Sep 17]; [about 17 screens]. Disponível em:
<http://web.b.ebscohost.com/dynamed/detail?vid=2&sid=44408b2e-21cf-4391-9bb4-91b93395161e%40sessionmgr102&bdata=Jmxhbmc9cHQYnImc2l0ZT1keW5hbWVhWVpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=900862&db=dme> Acesso: agosto 2017.
 22. BADDOUR, M L. Impetigo. UpToDate. 2017. Disponível em:
www.uptodate.com/contents/impetigo/print?source=machineLearning&search=impetigo&selectedTitle=1~113§ionRank=1&anchor=H11 Acesso: setembro 2017.
 23. SPELMAN, D.; BADDOUR, L M. Cellulitis and skin abscess in adults: Treatment. UpToDate. 2017. Disponível em:
www.uptodate.com/contents/cellulitis-and-skin-abscess-in-adults-treatment?source=search_result&search=erisipela&selectedTitle=2~42 Acesso: setembro 2017.
 24. MARCATTO, G. Fluxo para observação clínica para pacientes com pneumonia. São Jose do Rio Preto, 2017.
 25. MARCATTO, G. Fluxo para observação prolongada de pacientes com infecção de trato urinário. São Jose do rio Preto, 2017.
 26. SÃO JOSE DO RIO PRETO, Protocolo de Assistência Pré-Natal, 2017.

V – USO DE ANTIMICROBIANOS EM INFECÇÕES PEDIÁTRICAS

1. OTITE MEDIA AGUDA ¹	
1ª Escolha	Amoxicilina 50 mg /kg/dia 8/8 horas ou 12/12 horas por 10 dias
2ª Escolha	Amoxicilina 90 mg/Kg/dia 8/8 horas ou 12/12 horas por 10 dias OU Amoxicilina + Ácido Clavulânico 50mg/ml, 50 mg a 90mg/kg/dia 8/8 horas ou 12/12 horas por 10 dias (prescrição em formulário próprio)
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Eritromicina 50 mg/kg/dia 6/6 horas por 10 dias (eficácia reduzida devido à resistência micorbiana)

2. PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE	
Avaliar possibilidade de infecção viral por Influenza ou vírus em sincicial respiratório.	
2.1. PNEUMONIA AFEBRIL DO LACTENTE (2 A 12 SEMANAS DE VIDA). ¹	
Eritromicina 30 a 50 mg/kg/dia 6/6 horas por 14 dias (<i>Chlamydia trachomatis</i>) OU Amoxicilina + Ácido Clavulânico 50 a 90 mg/kg/dia 8/8 horas por 10 dias (prescrição em formulário próprio)	
2.2. LACTENTES E PRÉ ESCOLARES (2 MESES E < 6 ANOS) ^{1,2}	
1ª Escolha	Amoxicilina 50 mg/kg/dia 8/8 horas por 10 dias OU Penicilina procaína 50.000 UI IM de 24/24 horas por 7 dias ¹¹ OU Eritromicina 40 a 50 mg/kg/dia dividido em 4 doses de 6/6 horas em caso de alergia
Em caso de falência de tratamento	Amoxicilina + Ácido Clavulânico 50 a 90 mg/kg/dia 8/8 horas por 10 dias (prescrição em formulário próprio)
2.3. ESCOLARES ^{1,2}	
1ª Escolha	Amoxicilina - 50 mg/kg/dia 8/8 horas por 10 dias. OU Penicilina Procaina IM 50.000 UI/kg/dia por 7 dias

Em caso de falência de tratamento	Amoxicilina + Ácido Clavulânico 50mg/ml 50 a 90 mg/kg/dia 8/8 horas por 10 dias (prescrição em formulário próprio) OU Eritromicina – 50 mg/kg/dia 6/6 horas por 14 dias em caso de alergia
-----------------------------------	---

3. IMPETIGO BOLHOSO, CELULITE OU ERISPELA¹

1ª Escolha	Cefalexina 50 mg/kg/dia 6/6 horas por 10 dias. Em caso de impetigo: Penicilina benzatina 600 000 UI – Intramuscular – para pacientes menores de 25 kg e Penicilina benzatina 1 200 000 UI – Intramuscular – para pacientes maiores de 25 kg.
2ª Escolha	Amoxicilina + Ácido Clavulânico 50 mg/kg/dia 8/8 horas por 10 dias (prescrição em formulário próprio)
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Eritromicina 50 mg/kg/dia 6/6 horas por 10 dias

4. FARINGITE¹

1ª Escolha	Penicilina benzatina 600 000 UI – Intramuscular para pacientes menores de 25 kg e Penicilina benzatina 1 200 000 UI – Intramuscular para pacientes maiores de 25 kg.
2ª Escolha	Amoxicilina 50 mg/kg/dia 8/8 horas ou 12/12 horas por 10 dias OU Cefalexina 50 mg/kg/dia de 6/6 horas por 10 dias OU Amoxicilina + Ácido Clavulânico 50 mg/ml , 50 mg/kg/dia 8/8 horas por 10 dias (prescrição em formulário próprio)
Alérgicos a Beta-Lactâmicos	Eritromicina 50 mg/kg/dia 6/6 horas por 10 dias

5. INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO¹

Sulfametoxazol + Trimetropim 40 mg/kg/dia 12/12 horas por 10 dias. OU Cefalexina 50 a 100 mg/kg/dia 6/6 horas por 10 dias. OU
--

Amoxicilina + Clavulanato 50 mg/kg/dia de 8/8 horas por 10 dias.

* Ideal basear-se no antibiograma

REFERÊNCIAS

1. GILBERT, D. N. et al. (org.). The Sanford Guide, To Antimicrobial Therapy, 47 ed. 2017.
2. BRADLEY, J S; BYINGTON, L C; SHAH, S S. The Management of Community-Acquired Pneumonia in Infants and Children Older Than 3 Months of Age: Clinical Practice Guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases 2011. Disponível em: <<http://eguideline.guidelinecentral.com/i/63099-pediatric-community-acquired-pneumonia>> Acesso: agosto 2017.

VI – USO DE ANTIMICROBIANOS EM PARASITOSES INTESTINAIS

1. AMEBÍASE ^{1, 2}	
Adulto	
1ª Escolha - Metronidazol	Formas leves: Metronidazol, 500mg por via oral, de 8/8 horas 7 a 10 dias. Formas graves (amebíase intestinal sintomática ou amebíase extraintestinal): 750mg de 8/8 horas 10 dias. Dose máxima: 4g.
2ª Escolha - Tinidazol	Formas leves: Tinidazol, 2g, por via oral, após uma das refeições, durante 3 dias. Em formas graves, utilizar a mesma dosagem das formas leves, por 5 dias.
Criança	
1ª Escolha – Metronidazol	Metronidazol, 30mg/kg/dia, por via oral, divididos em 3 tomadas por 5 dias. Formas graves: 40mg/kg/dia, por via oral, divididos em 3 tomadas por 10 dias.

2. ENTEROBÍASE ^{1, 2, 3}	
Adulto	
Albendazol	400 mg, por via oral, em dose única. O tratamento pode ser repetido após 2 semanas.
Criança	
Albendazol	Até 2 anos: 200 mg, por via oral, em dose única. O tratamento pode ser repetido após 2 semanas.

3. GIARDÍASE ^{1,2}	
Adulto	
1ª Escolha - Metronidazol	250 mg, por via oral 8/8 horas, durante 5 a 7 dias. Pode-se repetir o ciclo com intervalo de 1 semana.
2ª Escolha - Tinidazol	2g por via oral em dose única.

Criança	
1ª Escolha - Metronidazol	10 mg/kg, por via oral 8/8 horas, durante 7 a 10 dias. Dose máxima diária: 750 mg.

4. ASCARIDÍASE ^{2,3}	
Adulto	
Albendazol	400 mg, por via oral, em dose única; o tratamento pode ser repetido após 2 a 3 semanas.
Criança	
Albendazol	Até 2 anos: 200 mg, por via oral, em dose única; o tratamento pode ser repetido após 3 semanas.

5. TENÍASE ^{1,2,3}	
Adulto	
Albendazol	400 mg, por via oral, a cada 24 horas, durante 3 dias.
Criança	
Albendazol	Até 2 anos: 200 mg, por via oral, a cada 24 horas, durante 3 dias.

6. ESCABIOSE ²	
Adulto / Criança	
Ivermectina	Ivermectina, dose única, por via oral, obedecendo a escala de peso corporal: 15 a 24kg: 1/2 comprimido; 25 a 35kg: 1 comprimido; 36 a 50kg: 1 1/2 comprimido; 51 a 65kg: 2 comprimidos; 65 a 79kg: 2 1/2 comprimidos; 80 kg ou mais: 3 comprimidos
Adulto / Criança	

Permetrina 5% loção	Aplicar na pele acometida mantendo sem enxágue por 6 a 8 horas, por 6 noites. Recomenda-se lavar a roupa pessoal e de cama em água quente.
----------------------------	--

7. PEDICULOSE²

O tratamento medicamentoso não substitui a necessidade de remoção das lêndeas.

Adulto / Criança

Ivermectina	Ivermectina, dose única, por via oral, obedecendo a escala de peso corporal: 15 a 24kg: 1/2 comprimido; 25 a 35kg: 1 comprimido; 36 a 50kg: 1 1/2 comprimido; 51 a 65kg: 2 comprimidos; 65 a 79kg: 2 1/2 comprimidos; 80 kg ou mais: 3 comprimidos.
--------------------	--

8. ESTRONGILOIDÍASE^{1, 2, 3}

Adulto / Criança

1ª Escolha – Ivermectina	Ivermectina, dose única, por via oral, obedecendo a escala de peso corporal (15 a 24kg: 1/2 comprimido; 25 a 35kg: 1 comprimido; 36 a 50kg: 1 ½ comprimidos; 51 a 65kg: 2 comprimidos; 65 a 79kg: 2 1/2 comprimidos; 80kg: 3 comprimidos ou 200mcg/kg) 1x/dia por 2 dias. Se ainda existirem larvas após 3 meses, repetir o tratamento. Em pacientes imunodeprimidos a terapia pode ser repetida após duas semanas.
Adulto	
2ª Escolha – Albendazol	400 mg, por via oral, 12/12h 7 dias.
Criança	
2ª Escolha – Albendazol	Menor de 2 anos: 200 mg, por via oral, a cada 24 horas, durante 3 dias.

9. LARVA MIGRANS ^{1,2,3}	
Adulto e Criança maior de 5 anos (acima de 15kg)	
1ª Escolha - Ivermectina	Ivermectina, dose única, por via oral, obedecendo a escala de peso corporal (15 a 24kg: 1/2 comprimido; 25 a 35kg: 1 comprimido; 36 a 50kg: 1 ½ comprimidos; 51 a 65kg: 2 comprimidos; 65 a 79kg: 2 1/2 comprimidos; 80kg: 3 comprimidos ou 200mcg/kg) 1x/dia por 2 dias.
Adulto	
2ª Escolha - Albendazol	400 mg, por via oral, de 12/12 horas, por 3 dias (cutânea) ou 7 dias (visceral).
Criança	
Albendazol	Acima de 2 anos: 400 mg, por via oral, de 12/12 horas, por 3 dias (cutânea) ou 5 dias (visceral).

REFERÊNCIAS

1. GILBERT, D. N. et al. (org.). The Sanford Guide, To Antimicrobial Therapy, 47 ed. 2017.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias : guia de bolso / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 8. ed. rev. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010.< http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf> Acesso em 22 junho 2017
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. *Formulário terapêutico nacional 2010*: RENAME 2010/Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/formulario_terapeutico_nacional_2010.pdf> Acesso em 23 junho 2017.

VII– USO DE ANTIMICROBIANOS EM CORRIMENTOS VAGINAIS

1.1. TRICOMONÍASE^{1,2,3}

As parcerias sexuais devem ser tratadas com o mesmo esquema terapêutico. Evitar o consumo de álcool durante o tratamento e durante 24 horas após a conclusão do metronidazol e 72 horas após a conclusão do tinidazol.

1ª Escolha	Metronidazol 2g por via oral, dose única OU Metronidazol 250 mg, 2 comprimidos, por via oral, 2 x dia por 7 dias. OU Tinidazol 2g por via oral, dose única.
Gestantes e Puérperas (independentemente da idade gestacional)	Metronidazol 2 g por via oral, dose única. OU Metronidazol 250 mg por via oral, de 8/8 horas por 7 dias.

1.2. CANDIDÍASE VULVOVAGINAL¹

Não tratar parceria, exceto se sintomas.

1ª Escolha	Miconazol creme a 2%, via vaginal, um aplicador cheio, à noite ao deitar-se, por 7 dias.
2ª Escolha	Itraconazol 100 mg, 2 cp, por via oral, 2xdia, por 1 dia.
Casos Recorrentes	Miconazol creme a 2%, via vaginal, um aplicador cheio, à noite ao deitar-se, por 14 dias.
Gestantes e Lactentes	Miconazol creme a 2%, via vaginal, um aplicador cheio, à noite ao deitar-se, por 7 dias.

1.3. VAGINOSE BACTERIANA¹

1ª Escolha	Metronidazol 250 mg, 2 cp por via oral, 2xdia, por 7 dias OU Metronidazol gel vaginal 100 mg/g, um aplicador cheio via vaginal, à noite ao deitar-se, por 5 dias
2ª Escolha	Clindamicina 300 mg, por via oral, 2 x dia, por 7 dias
Casos Recorrentes	Metronidazol 250 mg, 2 comprimidos por via oral, 2xdia, por 10 a 14 dias OU Metronidazol gel vaginal 100 mg/g, um aplicador cheio, via intravaginal, 1xdia por 10 dias, seguido de

	tratamento supressivo com duas aplicações semanais, por 4 a 6 meses
Gestantes	Primeiro trimestre: Clindamicina 300 mg, por via oral, 2xdia, por 7 dias Após primeiro trimestre: Metronidazol 250 mg, 1 comprimido por via oral, 3xdia, por 7 dias
1.4. INFECÇÕES MISTAS (TRICOMONÍASE / VAGINOSE BACTERIANA / CANDIDÍASE)	
Antimicrobiano	
INFECÇÕES DO TRATO REPRODUTIVO (ITR) MÚLTIPLOS AGENTES: VAGINOSE BACTERIANA	
Tinidazol 2g VO, dose única + Miconazol, creme a 2%, via vaginal, uma aplicação à noite, por 10 a 14 dias	

2. USO DE ANTIMICROBIANOS EM CORRIMENTOS URETRAIS

2.1. URETRITE GONOCÓCICA E POR CLAMÍDIA NÃO COMPLICADA (URETRITE E PROCTITE)¹

1ª Escolha	Ciprofloxacina 500 mg, 1 cp, por via oral + Azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, via oral, dose única * OU Ceftriaxona 500 mg, IM, dose única + Azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, via oral, dose única
Menores de 18 anos e gestantes	A ciprofloxacina é contraindicada, sendo a ceftriaxona o medicamento de escolha
Pacientes alérgicos a cefalosporinas	Azitromicina 500mg 4cp por via oral dose única

* O uso da ciprofloxacina estaria contra indicado nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, considerando estudos realizados nos últimos anos que demonstraram a circulação de cepas de gonococos com taxas de resistência antimicrobiana igual ou maior que 5%. Essa alteração no tratamento ainda encontra-se em processo de avaliação no Ministério da Saúde. A recomendação é que nesses Estados não mais utilizem a ciprofloxacina e substituam o tratamento pela ceftriaxona.¹

2.2. URETRITE POR CLAMÍDIA¹

1ª Escolha	Azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, por via oral, dose única OU Amoxicilina 500 mg, por via oral, 3x dia, por 7 dias
------------	--

2.3. URETRITE POR MYCOPLASMA GENITALIUM ¹	
1ª Escolha	Azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, por via oral, dose única


3. SÍFILIS	
3.1 SÍFILIS PRIMÁRIA, SÍFILIS SECUNDÁRIA E LATENTE RECENTE (ATÉ UM ANO DE DURAÇÃO) ¹	
1ª Escolha	Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo)
2ª Escolha	Doxiciclina 100 mg, por via oral, 2xdia, por 15 dias (exceto para gestantes); OU Ceftriaxona 1g, IV ou IM, 1xdia, por 8 a 10 dias para gestantes e não gestantes.
3.2 SÍFILIS LATENTE TARDIA (MAIS DE UM ANO DE DURAÇÃO) OU LATENTE COM DURAÇÃO IGNORADA E SÍFILIS TERCIÁRIA ¹	
1ª Escolha	Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, (1,2 milhão UI em cada glúteo), semanal, por três semanas. Dose total de 7,2 milhões UI.
2ª Escolha	Doxiciclina 100 mg, por via oral, 2xdia, por 30 dias (exceto para gestantes) OU Ceftriaxona 1g, IV ou IM, 1xdia, por 8 a 10 dias para gestantes e não gestantes.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis. 2ª edição. Brasília, 2015. Disponível em: <file:///C:/Documents%20and%20Settings/alperea/Meus%20documentos/Downloads/miolo_pcdt_ist_22_06_2016_web_pdf_28406%20(2).pdf > Acessado em agosto 2017.
- DynaMed [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 116226, Trichomoniasis; [updated 2017 Jul 19]. Disponível em: <http://web.b.ebscohost.com/dynamed/detail?vid=2&sid=c8b3bf-da4f-4f46-abdc-

24f3ca11d9bc%40sessionmgr104&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1keW5hbWVhLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=116226&db=dme> Acesso: agosto 2017

3. GILBERT, D. N. et al. (org.). The Sanford Guide, To Antimicrobial Therapy, 47 ed. 2017.



REMUME 2018