



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Anexo III**

**TRATAMENTO DOS CASOS DE SÍNDROME GRIPAL COM INDICAÇÃO – DOENÇA RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (DRAG), SÍNDROME GRIPAL COM QUADRO DE SINTOMAS PERSISTENTE OU COM FATORES DE RISCO.**

Conforme orientações do fabricante e da Organização Mundial da Saúde, o tratamento deve ser iniciado o mais breve possível dentro das primeiras **48 horas** após o início dos sintomas dos casos com indicação médica criteriosa segundo o protocolo do Ministério da Saúde. Como em toda prescrição terapêutica, atentar para as interações medicamentosas, as contra-indicações formais e os efeitos colaterais descritos na bula do medicamento. Este medicamento pode ainda induzir resistência dos vírus influenza, se utilizado de forma indiscriminada. Segundo a orientação do fabricante, o Oseltamivir deve ser usado durante a gravidez somente se o benefício justificar o risco potencial para o feto.

A dose recomendada do antiviral Oseltamivir é de 75mg duas vezes ao dia, por cinco dias, para adultos.

Para crianças deve-se seguir a tabela abaixo:

**Tabela de dosagem por peso e frequência diária**

Peso	Dose	Frequência
Menores de 6kg (Orientação CVE)*	2m/Kg/dose	Duas vezes ao dia (12/12 h) por 5 dias
Menores de 1 ano		
< 3 meses	12 mg	Duas vezes ao dia (12/12 h) por 5 dias
3 a 5 meses	20 mg	Duas vezes ao dia (12/12 h) por 5 dias
6 a 11 meses	25 mg	Duas vezes ao dia (12/12 h) por 5 dias
Crianças de 1 a 12 anos		
Menos de 15 kg	30mg	Duas vezes ao dia (12/12 h) por 5 dias
De 15 a 23 kg	45mg	Duas vezes ao dia (12/12 h) por 5 dias
De 23 a 40 kg	60mg	Duas vezes ao dia (12/12 h) por 5 dias
Acima de 40 kg	75mg	Duas vezes ao dia (12/12 h) por 5 dias

\*Dosagem recomenda por indicação do centro de Vigilância Epidemiológica do Estado.

Deve-se ajustar a dosagem do medicamento nas seguintes situações:

- Em pacientes sondados e em pacientes que apresentam obesidade mórbida (IMC>40): dobrar a dose.